

ALTACEF® FILM COATED TABLETS

Cefuroxime Axetil USP (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ALTACEF®
2. Bagaimana ALTACEF® berfungsi
3. Sebelum menggunakan ALTACEF®
4. Cara menggunakan ALTACEF®
5. Semasa menggunakan ALTACEF®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ALTACEF®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan ALTACEF®

ALTACEF® ialah sejenis antibiotic digunakan di kalangan orang dewasa dan kanak-kanak untuk rawatan jangkitan pada:

- Telinga, hidung dan tekak
- Paru-paru atau dada
- Saluran kencing
- Kulit dan tisu lembut

ALTACEF® juga digunakan untuk merawat:

- Jangkitan seksual

Doktor anda perlu menguji jenis bakteria yang menyebabkan jangkitan dan memantau sama ada bakteria sensitive kepada ALTACEF® semasa rawatan anda.

Bagaimana ALTACEF berfungsi

ALTACEF® tergolong dalam kumpulan antibiotic yang dikenali sebagai cephalosporins. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan ALTACEF®

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ALTACEF®:

- jika anda alah (hipersensitif) terhadap cefuroxime atau cephalosporin antibiotik atau, terhadap mana-mana bahan lain di dalam ALTACEF®.

ALTACEF® tidak disyorkan untuk kanak-kanak berumur bawah 3 tahun bulan, kerana ia tidak pernah berlaku dipelajari secukupnya pada zaman ini kumpulan.

- Sebelum mula menggunakan ALTACEF®

Sila maklumkan doktor jika anda mengalami sebarang alergi terhadap penicillin atau betalactams yang lain penicillins, monobactams dan carbapenems)

Maklumat mengenai keselamatan ALTACEF® di kalangan wanita hamil adalah terhad. Jika anda hamil, doktor anda akan berbincang dengan anda sama ada manfaat pengambilan ALTACEF® melebihi risiko kepada bayi.

Bahan kandungan ALTACEF® boleh meresap ke dalam susu ibu. Jika anda sedang menyusukan bayi, anda harus memaklumkan doktor anda sebelum mengambil ALTACEF®.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat lain, atau mula mengambil ubat yang baru. Ini termasuk ubatubatan yang dibeli tanpa preskripsi.

Ubat yang digunakan untuk mengurangkan asid gastrik perut anda (contohnya antasid untuk merawat kepedihan ulu hati) boleh mempengaruhi cara

ALTACEF® berfungsi.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat-ubatan seperti ini.

ALTACEF® boleh mengurangkan keberkesanan pil perancang. Jika anda mengambil pil perancang sewaktu rawatan ALTACEF®, anda dinasihatkan untuk menggunakan kaedah halangan (seperti kondom). Maklumkan doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

Cara menggunakan ALTACEF®

- Berapa banyak harus digunakan

Sila ambil ALTACEF® seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, doktor akan mengurangkan kekerapan anda.

Orang dewasa:

Dos biasa ALTACEF® adalah 250mg ke 500mg dua kali sehari bergantung kepada tahap dan jenis jangkitan.

Dos untuk jangkitan seksual yang tidak rumit adalah dos tunggal 1g.

Kanak-kanak:

Dos permulaan biasa ALTACEF® adalah 125mg ke 250mg dua kali sehari bergantung kepada tahap dan jenis jangkitan. Dos permulaan boleh diubah bergantung kepada penyakit atau tindak balas anda atau anak anda terhadap rawatan. Lebih daripada satu rawatan mungkin diperlukan.

- Bila perlu digunakan

Ambil pil ALTACEF® selepas makan. Ini boleh memberi

ALTACEF® FILM COATED TABLETS

Cefuroxime Axetil USP (250mg, 500mg)

rawatan yang lebih berkesan.

- Berapa lama perlu digunakan

Tempoh terapi biasa adalah tujuh hari (dari 5 hingga 10 hari). Adalah penting rawatan ALTACEF® dihabiskan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

Jangan berhenti walaupun anda berasa lebih sihat melainkan jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jika anda tidak menghabiskan rawatan, jangkitan boleh kembali.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Ambil dos seterusnya pada masa yang telah ditentukan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terambil ALTACEF® yang berlebihan, anda mungkin lebih muda mengalami sawan. Jangan berlengah. Hubungi doktor anda atau unit kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Jika boleh, tunjukkan pek ALTACEF kepada doktor.

Semasa menggunakan ALTACEF®

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumat pada label akan memberitahu anda kuantiti dan kekerapan ubat yang perlu diambil. Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Telan tablet ALTACEF® keseluruhan dengan air. Jangan mengunyah, menghancurkan atau memecahkan tablet – Ini boleh menyebabkan rawatan yang kurang berkesan.

Ubat ini telah dipreskripsikan untuk anda. Jangan berikannya

kepada orang lain - ia boleh membahayakan mereka walaupun gejala-gejala mereka seolah-olah sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda memerlukan ujian darah:

ALTACEF® boleh mempengaruhi keputusan ujian untuk tahap gula dalam darah, atau ujian darah yang dikenali sebagai ujian Coombs. Jika anda memerlukan ujian darah:

- Beritahu sesiapa yang mengambil sampel bahawa anda telah mengambil ALTACEF®.

ALTACEF® boleh menyebabkan pening kepala dan kesan sampingan lain yang boleh menyebabkan anda kurang berwaspada kepada sekeliling.

- Jangan memandu atau mengendalikan mesin melainkan jika anda rasa sihat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan lain, ALTACEF® boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi bukan semua orang mengalaminya.

Hubungi doktor dengan segera jika anda mendapat sebarang gejala ini.

Reaksi alahan yang teruk
Kesan ini sangat jarang berlaku untuk orang yang mengambil ALTACEF®. Tanda-tanda termasuk:

- ruam kulit yang gatal dan menebal
- bengkak, kadang-kadang pada muka atau mulut, menyebabkan kesukaran bernafas
- pengsan

Tindak balas kulit yang serius

- ruam kulit melepuh dan kelihatan seperti sasaran kecil

(tompok-tompok gelap di tengah yang dikelilingi oleh kawasan lebih cerah, dengan lingkaran gelap di sekitarnya) *erythema multiforme*

- ruam meluas dengan lepuh dan kulit mengelupas pada permukaan badan (*toxic epidermal necrolysis*), terutamanya di sekitar mulut, hidung, mata dan kemaluan (sindrom Stevens-Johnson).

Jangkitan kulat

Biasanya, ubat seperti ALTACEF® boleh menyebabkan penumbuhan yis berlebihan (*candida*) dalam badan dan menyebabkan jangkitan kulat (seperti seriawan). Kesan sampingan ini lebih kemungkinan berlaku sekiranya anda mengambil ALTACEF® untuk masa yang panjang.

Kadang-kala, ubat seperti ALTACEF® boleh menyebabkan radang (usus besar), dengan kesan seperti cirit-birit, biasanya dengan darah dan lendir, sakit perut, demam.

Kesan sampingan yang biasa
Ini mungkin mempengaruhi sehingga 1 dalam 10 orang:

- Sakit kepala
- Pening
- Cirit-birit
- Loya
- Sakit perut

Kesan-kesan sampingan biasa yang boleh didapati daripada ujian darah:

- Peningkatan sejenis sel darah putih (*eosinophilia*)
- Peningkatan beberapa bahan (enzim) yang dihasilkan oleh Hati

Kesan sampingan yang tidak biasa yang mungkin muncul pada ujian darah:

- Pengurangan bilangan platelet darah

ALTACEF® FILM COATED TABLETS

Cefuroxime Axetil USP (250mg, 500mg)

- Pengurangan bilangan sel-sel darah putih

Jika anda mendapat kesan sampingan

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika apa-apa kesan sampingan yang disenaraikan menjadi teruk atau menyusahkan, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan ALTACEF®

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C.

Simpan dalam pek asal untuk melindungi daripada kelembapan.

Jangan guna ubat anda selepas tarikh luput yang dinyatakan pada pek selepas 'EXP'. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet putih, berbentuk kapsul, bersalut filem

250mg:

Ukiran '250' disebelah dan tanpa ukiran di sebelah yang lain

500mg:

Ukiran '500' disebelah dan tanpa ukiran di sebelah yang lain

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Cefuroxime axetil USP (amorphous) equivalent to Cefuroxime.

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline Cellulose,
Colloidal Silicon Dioxide
Hydrogenated Castor Oil
Croscarmellose sodium,
Sodium lauryl sulphate
Hypromellose, 3cps
Hypromellose, 15cps
Purified Talc
Titanium Dioxide
Propylene glycol
Isopropyl Alcohol
Dichloromethane

- Nombor MAL:

Pengilang

Zeiss Pharma Limited
Unit II IGC, SIDCO, Phase II
Samba, J & K -184121 India.

Pemegang Pendaftaran

Produk

Glenmark Pharmaceuticals
(Malaysia) Sdn Bhd (660397-W)
D-31-02, Menara Suezcap 1,
No. 2, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

- 08/03/2022

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/091