

VOTARIDE 500MG/5ML POTASSIUM CHLORIDE ORAL SOLUTION

Kalium Klorida (100mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Votaride Oral Solution
2. Bagaimana Votaride Oral Solution berfungsi
3. Sebelum menggunakan Votaride Oral Solution
4. Cara menggunakan Votaride Oral Solution
5. Semasa menggunakan Votaride Oral Solution
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Votaride Oral Solution
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Votaride Oral Solution

Votaride Oral Solution digunakan untuk mencegah atau merawat paras kalium yang rendah dalam darah (hipokalemia).

Paras kalium boleh menjadi rendah disebabkan penyakit atau pengambilan ubat-ubatan tertentu, atau selepas cirit-birit atau muntah yang berpanjangan.

Bagaimana Votaride Oral Solution berfungsi

Votaride Oral Solution berfungsi dengan menggantikan kalium yang hilang dan mencegah kekurangan kalium dalam badan.

Kalium adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh anda untuk memastikan jantung, otot, buah pinggang, saraf, dan sistem pencernaan dapat berfungsi dengan baik.

Sebelum menggunakan Votaride Oral Solution

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan terhadap Kalium Klorida atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut);
- anda berasa sangat dahaga dan mulut berasa kering (anda mungkin mengalami dehidrasi);
- anda pernah didiagnosis dengan asidosis metabolik, keadaan di

mana terdapat peningkatan tahap asid dalam darah;

- anda mengalami kegagalan buah pinggang;
 - anda mempunyai Sindrom Addison yang tidak dirawat (kelenjar adrenal tidak aktif);
 - anda mempunyai paras kalium yang tinggi dalam darah (hiperkalemia);
 - anda mempunyai paras klorida yang tinggi dalam darah (hiperkloremia); atau
 - anda mengambil diuretik penjimatan kalium (pil air) seperti amiloride, spironolactone, eplerenone atau triamterene.
- Sebelum menggunakan Votaride Oral Solution
- Untuk memastikan ubat ini selamat untuk anda, beritahu doktor anda jika anda pernah mengalami:
- penyakit buah pinggang;
 - sirosis atau penyakit hati;
 - gangguan kelenjar adrenal;
 - kecederaan tisu yang banyak, misalnya, kelecuman teruk;
 - dehidrasi teruk;
 - kencing manis;
 - penyakit jantung atau tekanan darah tinggi;
 - pendarahan perut atau usus; atau
 - cirit-birit kronik (seperti kolitis ulseratif, penyakit Crohn).

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda tentang semua ubat-ubatan yang sedang digunakan dan sebarang ubat yang telah anda mulakan atau hentikan penggunaannya, terutamanya:

- diuretik atau "pil air";
- ubat jantung atau tekanan darah tinggi; atau
- ubat untuk keradangan atau kesakitan seperti "Ubat Anti-Inflamasi Bukan Steroid NSAIDs."

Senarai ini tidak lengkap. Ubat lain mungkin berinteraksi dengan kalium klorida, termasuk ubat yang dibeli

tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Votaride Oral Solution

Goncang dengan baik sebelum digunakan.

- Berapa banyak harus digunakan

Rawatan hipokalemia:

Dewasa: Dos harian antara 40 hingga 100 mEq/hari terbahagi kepada 2 hingga 5 dos; hadkan kepada 40 mEq setiap dos. Jumlah dos harian tidak boleh melebihi 200 mEq.

Kanak-kanak (sehingga 16 tahun): Dos permulaan adalah 2 hingga 4 mEq/kg/hari dalam dos terbahagi; tidak melebihi 1 mEq/kg untuk setiap dos atau 40 mEq, yang mana lebih rendah; Jumlah dos harian tidak boleh melebihi 100 mEq.

Pengurusan atau pencegahan hipokalemia:

Dewasa: Dos biasa adalah 20 mEq/hari.

Kanak-kanak (sehingga 16 tahun): Dos biasa adalah 1 mEq/kg/hari. Jangan melebihi 3 mEq/kg/hari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan

VOTARIDE 500MG/5ML POTASSIUM CHLORIDE ORAL SOLUTION

Kalium Klorida (100mg/ml)

ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan yang terlalu banyak boleh menyebabkan anda mengalami sensasi kepanasan atau tercucuk-cucuk pada tangan dan kaki, kekeliruan mental, kulit pucat & sejuk, kelemahan kaki, atau gangguan irama jantung.

Semasa menggunakan Votaride Oral Solution

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Votaride Oral Solution.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Votaride Oral Solution kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ia boleh menyebabkan ketidakselesaan perut. Produk ini mesti dicairkan dalam sekurang-kurangnya segelas air atau jus sebelum diminum. Ambil produk ini sejurus selepas makan atau bersama makanan untuk mengurangkan kesan tersebut.

Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Votaride Oral Solution terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Votaride Oral Solution boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Beberapa kesan sampingan termasuk ketidakselesaan perut, cirit-birit, loya atau muntah. Anda boleh mengurangkan ketidakselesaan perut dengan mengambil ubat dengan makanan atau selepas makan. Maklumkan kepada profesional penjagaan kesihatan anda jika tiada penambahbaikan atau jika kesan sampingan ini bertambah buruk.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut selepas menggunakan ubat ini.

- tindak balas alahan seperti ruam kulit, gatal-gatal, bengkak pada muka, bibir atau lidah
- najis berwarna hitam
- masalah pernafasan
- kekeliruan
- degupan jantung yang cepat dan tidak sekata
- berasa pitam atau pening
- tekanan darah rendah
- kebas atau kesemutan pada tangan atau kaki
- lemah atau letih yang luar biasa
- kelemahan kaki

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web np.ra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Votaride Oral Solution

- Penyimpanan

- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- Simpan di bawah suhu 30°C.
- Lindungi daripada cahaya.
- Pastikan penutup tertutup rapat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak

diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan lutsinar berwarna putih pudar hingga kuning dan berperisa oren.

- Bahan-bahan kandungan

- **Bahan aktif**
Setiap 15 ml mengandungi Kalium Klorida 1.5 g (membekalkan kalium 20 mEq dan klorida 20 mEq).
- **Bahan tidak aktif**
Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Sucralose, Sodium Carboxymethylcellulose, Propylene Glycol, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid Anhydrous, Orange Flavour, Purified Water.

- Nombor MAL

MAL*****XC

Pengilang

Winwa Medical Sdn. Bhd.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharm-D Sdn. Bhd.
No. 8B, Jalan 1/137C,
Bedford Business Park,
Off Jalan Kelang Lama,
58000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

18/12/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/159