

# Puroxan<sup>®</sup> Tablet

*Doxofylline 400mg Tablet*

---

## Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan PUROXAN tablet
2. Bagaimana PUROXAN tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan PUROXAN tablet
4. Cara menggunakan PUROXAN
5. Semasa menggunakan PUROXAN tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan PUROXAN Tablet dan fungsinya

Tablet PUROXAN mengandungi Doxofylline sebagai bahan aktif. Tablet PUROXAN adalah untuk rawatan *bronchial asthma* dan *Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) associated with bronchospasm*.

Doxofylline adalah bronkodilator yang diklasifikasikan sebagai derivatif xanthine. Doxofylline melegakan otot licin saluran pernafasan bronkial dan saluran darah paru-paru, oleh itu bertindak terutamanya sebagai bronchodilator dan relaxant otot licin. Pada kepekatan tinggi, doxofylline juga dapat menghalang pelepasan sel histamin

## Sebelum menggunakan PUROXAN Tablet

### Bila tidak boleh digunakan:

- jika anda alergi atau hipersensitif kepada bahan aktif atau bahan-bahan lain PUROXAN Tablet
- Jika anda menyusu bayi

## Sebelum menggunakan PUROXAN Tablet

Sentiasa beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperoleh tanpa preskripsi.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Doxofylline tidak boleh diberikan bersama dengan derivatif xanthine lain, termasuk minuman dan makanan yang mengandungi kafein berlebihan. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil ubat lain seperti erythromycin, troleandomycin, lincomycin dan antibiotik lain kumpulan yang sama, allopurinol, cimetidine, propanolol, ephedrine dan vaksin anti-selesema. Dalam kes ini anda mungkin memerlukan dos yang lebih rendah dari Doxofylline. Begitu juga jika anda mengambil phenytoin atau anticonvulsants lain dan jika anda merokok, anda mungkin memerlukan dos yang lebih tinggi daripada Doxofylline.

## Cara menggunakan PUROXAN Tablet

Sentiasa ambil PUROXAN Tablet sama seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti. Dos biasa adalah seperti di bawah

### Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa:
- 1 tablet (400 mg) 2 kali sehari.
- Dos boleh ditingkatkan kepada 1 tablet 3 kali sehari mengikut doktor anda.

PUROXAN Tablet sebaik-baiknya perlu diambil pada selang 12 jam apabila digunakan dua kali sehari, atau pada lat tempoh 8 jam apabila digunakan tiga kali setiap hari. Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### Berapa lama perlu digunakan

Teruskan menggunakan PUROXAN Tablet selama yang dicadangkan oleh doktor anda.

### Jika terlupa menggunakan

Ambil sebaik sahaja anda ingat. Jika telah hampir masa untuk dos seterusnya, jangan ambil dos yang telah terlepas, hanya ambil dos seterusnya pada masa yang betul. **Jangan ambil dos berganda.**

### Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Hubungi doktor atau ahli farmasi anda dan ikut arahnya.
- Tanda-tanda awal mengenai overdosis oral yang mungkin berlaku adalah sawan.

## Semasa menggunakan PUROXAN Tablet

### Perkara yang perlu dilakukan

**Selalu ikuti arahan yang diberikan oleh doktor anda.**

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

**Jangan makan makanan atau minuman yang mengandungi kafein berlebihan**

- Ubat-ubatan untuk merawat penyakit jantung boleh menyebabkan penurunan tahap kalium darah anda. Perkara ini boleh meningkatkan kemungkinan ritma denyutan jantung menjadi tidak normal.
- Ubat-ubatan lain yang digunakan untuk merawat asma dan diuretik boleh menyebabkan penurunan tahap kalium anda.
- Beberapa ubat anestetik boleh meningkatkan risiko denyutan jantung yang tidak normal.

**Jangan memberi ubat ini kepada kanak-kanak in bawah umur 18 belas tahun**

**Mengandung dan menyusukan anak**

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat. PUROXAN Tablet tidak boleh diambil semasa menyusui.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat, PUROXAN Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Mual, muntah, sakit, sakit kepala, kerengsaan, insomnia, dan deyutan jantung yang cepat, mungkin berlaku. Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda melihat apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Kesan sampingan ini boleh menyebabkan pengeluaran daripada rawatan; dos yang lebih rendah dari PUROXAN Tablet harus dimulakan hanya selepas nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan seperti di atas anda perlu menghubungi doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesansampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) [Public Reporting Side Effects to

Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

**Cara penyimpanan dan Pelupusan PUROXAN Tablet**

Penyimpanan

Jauhkan ubat dari kanak-kanak  
Simpan ubat dibawah suhu 30°C

Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda cara-cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan.

**Maklumat lanjut**

Rupa dan warna produk

Tablet PUROXAN adalah tablet bulat putih, menjaringkan dengan permukaan licin

Bahan-bahan kandungan

**Bahan-bahan aktif:**

*Doxofylline*

**Bahan-bahan tidak aktif:**

*microcrystalline cellulose and sodium carboxymethylcellulose, pre-gelatinised maize starch, lactose monohydrate, talc, povidone, colloidal silica hydrated, magnesium stearate, colloidal silica anhydrous*

Nombor MAL

MAL21066005ACZ

**Pengilang**

Dikilangkan oleh r:

ABC Farmaceutici S.p.A., Italy  
untuk  
Eurodrug Laboratories B.V. (the Netherlands)

**Pemegang pendaftaran produk:**

Eurodrug Laboratories (M) Sdn Bhd

T2-21-10, The Square, One City,  
Jalan USJ 25/1C, 47650 Subang Jaya  
Selangor Darul Ehsan Malaysia

**Tarikh kemaskini:**

26/05/2022

**Serial nombor:**

NPRA (R1) 20/016