

COMOZOL CREAM 2%w/w

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Ketoconazole (20mg per gram)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Comozol cream*
2. Bagaimana *Comozol cream* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Comozol cream*
4. Cara menggunakan *Comozol cream*
5. Semasa menggunakan *Comozol cream*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Comozol cream*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan *Comozol cream*

Comozol Cream digunakan untuk jangkitan kulat dan yis pada kulit orang dewasa.

Jangkitan mungkin muncul pada:

- Tubuh badan, dada atau belakang badan
- Tangan atau kaki
- Kulit kepala atau muka
- Pangkal paha atau genital

Bagaimana *Comozol cream* berfungsi

Comozol cream berfungsi dengan membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan *Comozol cream*

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda mempunyai alahan terhadap bahan-bahan kandungan dalam *Comozol cream*.
- Untuk jangkitan mata.

Jangan menggunakan ubat ini jika keadaan di atas berkaitan dengan anda. Sekiranya anda tidak pasti, beritahu doktor anda atau ahli farmasi sebelum menggunakan *Comozol cream*.

Tiada risiko yang diketahui dengan penggunaan *Comozol Cream* pada kehamilan atau penyusuan.

- Sebelum mula menggunakan *Comozol Cream*

- Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini
- Sekiranya anda menggunakan krim, salap atau losyen yang mengandungi steroid kebelakangan ini, anda harus teruskan penggunaan krim, salap atau losyen steroid ringan (seperti hidrokortison) pada waktu pagi dan menggunakan *Comozol Cream* pada waktu malam. Rawatan steroid ini boleh diberhentikan secara beransur-ansur dalam jangka masa 2-3 minggu.
- Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang menghentikan krim, salap, atau losyen steroid, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda

Menyediakan kulit anda

- Cuci kulit yang dijangkiti dan keringkan kulit.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Comozol cream biasanya tidak bertindak balas dengan ubat lain. Walau bagaimanapun, sila maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan atau menggunakan ubat-ubat lain yang baru-baru ini. Ini termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dan ubat-ubatan herba.

Cara menggunakan *Comozol Cream*

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu sapukan *Comozol Cream* sekali atau dua kali sehari seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Bergantung kepada jenis jangkitan, rawatan boleh bertahan selama 2 hingga 6 minggu. Biasanya anda akan melihat tanda penambahbaikan selepas 4 minggu.

Jika ini tidak berlaku, berbincang dengan doktor anda.

Bagi jangkitan kulit pada badan, lipatan paha, kaki dan tangan, sapukan *Comozol Cream* sekali sehari. Bagi jangkitan kulit yang biasanya berlaku pada muka dan di dada dengan tompok coklat kemerahan dan bersisik kuning atau putih (dermatitis seborrea), sapukan *Comozol Cream* sekali atau dua kali sehari. Jangkitan kulit biasanya akan menjadi lebih baik selepas 2 hingga 4 minggu dan selepas itu anda boleh terus menggunakan *Comozol Cream* sekali atau dua kali seminggu.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan *Comozol cream* lebih kerap daripada yang anda perlukan, anda mungkin mengalami kepedihan atau rasa terbakar, kemerahan atau bengkak. Jika ini berlaku, berhenti menggunakan *Comozol cream* dengan segera.

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang penggunaan produk ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Comozol cream tidak boleh ditelan. Sekiranya tertelan, hubungi doktor anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Semasa menggunakan Comozol Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil *Comozol cream*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan sapu *Comozol cream* pada mata.

Jangan berikan *Comozol cream* kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Comozol cream tidak akan mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera atau mana-mana mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Comozol cream* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

- Kerengsaan yang teruk atau kemerahan kulit di kawasan krim telah digunakan, atau tanda-tanda alahan lain semasa permulaan rawatan.
- Kulit mengelupas atau melepuh.

Maklumkan doktor atau ahli farmasi jika anda memperhatikan atau mengesyaki sebarang kesan sampingan yang berikut:

Kesan sampingan yang lazim berlaku

- Kepedihan atau rasa terbakar

Kesan sampingan yang luar biasa

- Perdarahan
- Rasa tidak selesa
- Kekeringan
- Keradangan
- Dermatitis
- Kesemutan
- Ruam, gatal-gatal (juga dikenali sebagai *nettle rash* atau urtikaria)
- Kulit berasa melekit

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel.; atau laman web npa.moh.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Comozol cream*

- Penyimpanan

Simpan dalam bekas yang tertutup, di bawah suhu 30 °C.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk Putih dan krim homogen

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Ketoconazole

- Bahan tidak aktif
Propylene glycol
Stearyl alcohol
Cetanol
Sorbitan monostearate
Isopropyl myristate
Polysorbate 60
Butylated hydroxytoluene
Purified water

- Nombor MAL MAL

Pengilang

DAE HWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

495 Hanu-ro, Hoenseong-eup, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea

Pemegang Pendaftaran Produk

Eucogen Sdn. Bhd.
No 6A, Jalan Sungai Burung U32/U, Bukit Rimau, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP February 2021

Nombor Siri

NPRA(R2) 20/092