

Betasone Actavis Cream 0.1%w/w

Betamethasone [as 17-Valerate] (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Betasone
2. Bagaimana Betasone berfungsi
3. Sebelum menggunakan Betasone
4. Cara menggunakan Betasone
5. Semasa menggunakan Betasone
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Betasone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Betasone

Betasone digunakan untuk membantu mengurangkan kemerahan dan kegatalan masalah kulit tertentu seperti *psoriasis*, ekzema dan *dermatitis*.

Bagaimana Betasone berfungsi

Betasone mengandungi ubat yang dipanggil *Betamethasone* (sebagai *17-Valerate*). Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai steroid. Ia membantu untuk mengurangkan bengkak dan kerengsaan.

Sebelum menggunakan Betasone

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Betasone jika:

- jika anda alah (hipersensitif) kepada *betamethasone*
- jika kanak-kanak di bawah 1 tahun
- untuk merawat masalah-masalah kulit yang berikut, ia boleh menjadikan mereka lebih teruk:
 - Jerawat
 - Curahan yang teruk pada kulit dan di sekitar hidung anda (*rosacea*)
 - Bintik-bintik ruam merah sekitar mulut (*perioral dermatitis*)
 - Gatal sekitar laluan belakang anda atau bahagian kemaluan - kecuali doktor anda memberitahu anda untuk berbuat demikian

- Jangkitan virus, seperti kudis herpes, sejuk atau cacar air

- Jangkitan kulit seperti kurap, atlet kaki atau seriawan

- Kulit melecet atau luka yang disebabkan oleh jangkitan bakteria seperti *impetigo*

Jangan gunakan jika mana-mana di atas dialami oleh anda. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Betasone.

-Sebelum menggunakan Betasone

Semak dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat anda jika:

- anda memakai krim di bawah berpakaian kedap udara, termasuk lampin kanak-kanak. Balutan ini memudahkan bahan aktif untuk melalui kulit. Ia adalah mungkin menyebabkan tidak sengaja menggunakan terlalu banyak.
- anda mengalami *psoriasis*, doktor anda akan mahu periksa anda lebih kerap.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru pernah mengambil sebarang ubat-ubatan, termasuk ubat-ubat tanpa preskripsi dan ubat herba.

Cara menggunakan Betasone

-Berapa banyak harus diambil

Guna dengan berhati-hati 2 - 3 kali sehari, mengurangkan kekerapan apabila keadaan beransur pulih.

-Bila perlu diambil

Rawatan patut bermula seawal mungkin.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan rawatan untuk 5 hari.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa menggunakan Betasone, gunakan sebaik saja anda mengingatinya. Walaubagaimanapun, jika ia berhampiran masa untuk sapu

dos seterusnya, lepaskan dos yang terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika, dengan tidak sengaja beberapa kali anda menggunakan lebih daripada yang anda perlu, jangan bimbang. Jika anda memakai banyak atau tidak sengaja tertelan, ia boleh membuat anda sakit. Berbincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan Betasone

-Perkara yang perlu dilakukan

Selalu bersih tangan anda sebelum dan selepas menggunakan krim.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Krim tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari, kerana ia boleh membuat kulit pada muka anda menipis dengan mudah. Jangan biarkan krim masuk ke dalam mata anda.

Jangangunakannya pada kanak-kanak atau bayi melainkan jika diarahkan oleh doktor.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hanya gunakan pada tempat berkenaan.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, Betasone boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Hentikan penggunaan Betasone dan beritahu doktor anda secepat mungkin jika.:

- anda mendapati bahawa keadaan kulit anda menjadi lebih teruk atau menjadi bengkak semasa rawatan. Anda mungkin alah kepada Betasone, mempunyai jangkitan atau memerlukan rawatan lain.
- anda mempunyai *psoriasis*, anda mungkin mengalami lebam yang muncul dengan nanah di bawah kulit. Ini

jarang sekali berlaku semasa atau selepas rawatan dan dikenali sebagai *psoriasis* berjerawat.

Kesan sampingan yang lain anda boleh memerhati apabila menggunakan Betasone termasuk:

Biasa

- rasa membakar kerengsaan, atau gatal di mana krim digunakan. Kesan sampingan jika anda menggunakan Betasone untuk masa yang lama, anda menggunakan banyak setiap kali anda menggunakannya, atau anda memohon di bawah berpakaian kedap udara.

Sangat jarang

- kesan parut boleh muncul
- urat di bawah permukaan kulit anda mungkin menjadi lebih ketara
- pertumbuhan rambut meningkat dan perubahan dalam warna kulit
- penipisan kulit dan ia lebih mudah rosak
- berat badan, pembundaran muka dan tekanan darah tinggi. Ini lebih cenderung berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Betasone

- Penyimpanan

Simpan ubat jauh daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya, Jangan membeku.

- Pelupusan

Jangan guna ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Pulang krim yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan krim jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang krim tersebut bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih dan tidak berminyak.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Betamethasone [as 17-Valerate] BP 0.1% w/w.

Bahan tidak aktif

White soft paraffin, Light liquid paraffin, Cetostearyl alcohol, Cetomacrogol 1000, Propylene glycol, Citric acid monohydrate, Sodium phosphate di-basic, Purified water, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate.

- Nombor MAL

MAL19890643AZ

Pengilang

Manufacturer

PT Actavis Indonesia
Jl. Raya Bogor Km. 28,
Kelurahan Pekayon, Kecamatan
Pasar Rebo
Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta, Indonesia

Pemegang Pendaftaran Produk

DCH Auriga (Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 6, Persiaran Perusahaan
Seksyen 23, 40300 Shah Alam
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16/05/2023

Nombor siri

NPRA(R2/2)190123/25