

ROWATINEX® CAPSULE

Pinene ($\alpha + \beta$)/ Camphene/ Cineol/ Fenchone/ Borneol/ Anethol (31 mg/ 15 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 10 mg/ 4 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rowatinex®
2. Bagaimana Rowatinex® berfungsi
3. Sebelum menggunakan Rowatinex®
4. Cara menggunakan Rowatinex®
5. Semasa menggunakan Rowatinex®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rowatinex®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Rowatinex®

Rowatinex® digunakan untuk merawat kekejangan saluran kencing dan keradangan yang berkaitan dengan urolithiasis. Rowatinex® juga membantu pembubaran dan pengusiran batu pada sistem ginjal.

Bagaimana Rowatinex® berfungsi

Rowatinex® menggalakkan penghasilan air kencing dan melegakan kekejangan saluran kencing, dengan itu dapat membantu laluan batu. Kesan terapeutik gabungan terpena yang seimbang mengurangkan keradangan saluran kencing yang merangsang aliran darah buah pinggang melalui buah pinggang dan meningkatkan pengeluaran air kencing yang kurang pekat.

Sebelum menggunakan Rowatinex®

- Bila tidak boleh menggunakannya

Jangan ambil Rowatinex®: - jika anda alah kepada α -pinene, β -pinene, camphene, borneol, anethol, fenchone, cineole atau mana-mana bahan

kandungan lain ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut produk).

- Sebelum mula menggunakan Rowatinex®

Pengambilan cecair perlu ditingkatkan semasa terapi. Produk ini hanya perlu digunakan dengan berhati-hati pada pesakit yang menerima anti-pembekuan atau ubat-ubatan yang bergantung kepada hati untuk metabolisme dan perkumuhan.

Kehamilan dan menyusukan bayi

Walaupun tiada kesan terhadap kelahiran yang dilaporkan, adalah dinasihatkan bahawa wanita hamil agar tidak mengambil Rowatinex® semasa trimester pertama kehamilan.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Rowatinex® sekiranya anda ada mengambil ubat-ubatan untuk mencairkan darah atau ubat yang dipecahkan oleh hati.

Cara menggunakan Rowatinex®

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Dos yang biasa adalah 1-2 kapsul tiga kali sehari sebelum makan, melainkan jika dinasihatkan oleh doctor. Dalam kes kolik 2-3 kapsul empat-lima kali sehari.

Kanak-kanak 6-14 tahun: Dos yang biasa adalah 1 kapsul 2 kali sehari sebelum makan.

- Bila perlu digunakan

Anda perlu mengambil Rowatinex® sebelum makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Anda perlu menggunakan Rowatinex® seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas. Ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Kemudian ambil dos yang seterusnya seperti biasa.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika anda telah mengambil dos berlebihan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Rowatinex®

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang dinasihatkan oleh doktor.

Maklumkan doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Rowatinex®.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan memberi Rowatinex® kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

ROWATINEX® CAPSULE

Pinene ($\alpha + \beta$)/ Camphene/ Cineol/ Fenchone/ Borneol/ Anethol (31 mg/ 15 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 10 mg/ 4 mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan mengendalikan mesin

Rowatinex® tidak seharusnya memberi kesan pada pemanduan atau keupayaan anda untuk mengendalikan mesin. Jika kapsul membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau kendalikan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Tiada kesan sampingan yang tidak diingini dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan buruk ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Rowatinex®

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Jangan lupuskan ubat melalui sistem kumbahan air atau melalui sistem pembuangan isi rumah. Rujuk ahli farmasi anda bagaimana melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini boleh membantu memelihara alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Kuning, sfera, kapsul bersalut gelatin lembut yang mengandungi minyak berwarna kuning pucat atau kuning kehijauan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Pinene ($\alpha + \beta$), Camphene, Cineol, Fenchone, Borneol, Anethol.

- Bahan tidak aktif

glycerol 85%, sodium ethyl hydroxybenzoate, sodium propyl hydroxybenzoate, sunset yellow (E110), quinoline yellow E104, Olive oil, Gelatin NF, Water.

- Nombor MAL:

MAL19913019X

Pengilang

Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Bantry,
Co. Cork,
Ireland.

Pemegang Pendaftaran Produk

DCH Auriga (Malaysia) Sdn. Bhd.,
Lot 6, Persiaran Perusahaan,
Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

- 27/05/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210802/723