

DHAMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dhamol
2. Bagaimana Dhamol berfungsi
3. Sebelum mengambil Dhamol
4. Cara menggunakan Dhamol
5. Semasa menggunakan Dhamol
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dhamol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dhamol

Dhamol digunakan untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana, contohnya sakit haid, sakit gigi atau sakit kepala. Ia juga digunakan untuk menurunkan suhu badan yang meningkat.

Bagaimana Dhamol berfungsi

Dhamol mengandungi *paracetamol* yang berasal dari kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai *analgesics* atau ubat penahan sakit.

Sebelum mengambil Dhamol

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Dhamol jika:

- anda alah (hipersensitif) kepada *paracetamol*, atau bahan-bahan lain dalam ubat.

- anda mempunyai kegagalan buah pinggang atau hati
- anda sedang mengambil ubat lain yang mengandungi *paracetamol* pada masa yang sama.

-Sebelum mula mengambil

Anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Dhamol jika:

- anda hamil atau sedang menyusukan anak.
- anda mengalami masalah buah pinggang atau masalah hati

Jika anda tidak pasti mana di atas berkenaan dengan anda, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Dhamol.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Ini termasuk:

- *metoclopramide*, digunakan untuk merawat rasa loya dan muntah.
- *probenecid*, digunakan untuk merawat gout

Cara menggunakan Dhamol

-Berapa banyak harus diambil

Goncang suspensi sebelum guna.

Kanak-kanak di bawah 3 bulan:

5 -10 mg/kg berat badan atau atas nasihat doktor,

Kanak-kanak 3 bulan - 1 tahun:

1.25 - 2.5ml

Kanak-kanak 1 - 6 tahun:

2.5-5 ml

Kanak-kanak 6 - 12 tahun:

5 - 10 ml.

Dos-dos boleh diberikan setiap 4-6 jam apabila perlu. Maksimum: Jangan melebihi daripada 4 dos sehari.

-Bila perlu diambil

Ambil Dhamol pada masa yang sama setiap hari. Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

-Berapa lama perlu diambil

Sentiasa mengambil Dhamol tepat seperti yang doktor anda telah beritahu anda. Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa untuk mengambil dos anda, ambilkannya secepat mungkin apabila anda ingat. Ambil dos seterusnya pada masa yang tepat. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Jika anda (atau orang lain) telah mengambil banyak Dhamol pada masa yang sama, atau anda

mensyaki kanak-kanak mungkin menelannya, hubungi jabatan kecemasan hospital yang terdekat atau beritahu doktor anda dengan segera.

Semasa menggunakan Dhamol

-Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mengambil Dhamol tepat seperti yang doktor anda telah beritahu anda. Jika simptom masih berterusan atau tidak reda selepas beberapa hari, sila berjumpa dengan doktor.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil lebih daripada 4 dos sehari.

Jangan ambil ubat lain yang mengandungi *paracetamol* pada waktu yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Mengambil terlalu banyak *paracetamol* boleh menyebabkan kerosakan hati. Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali diberitahu oleh ahli farmasi atau doktor anda.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Dhamol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Ini termasuk:

-reaksi alahan, contohnya ruam kulit

Amaran alergi: *Paracetamol* boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kulit merah, lepuh atau ruam kulit. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami simptom-simptom lain yang membimbangkan anda.

DHAMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dhamol

-Penyimpanan

Simpan ubat jauh daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

-Pelupusan

Jangan makan ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Sila pulangkan sirap yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan sirap jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam air atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Suspensi *homogenous* merah jambu dengan perisa strawberi dan rasa manis.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Setiap 5ml mengandungi 250mg paracetamol BP (*fine powder*).

Bahan bukan aktif

Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Sodium saccharin, Xanthan gum, Tragacanth powder, Granulated fine white sugar, Sorbitol liquid, citric acid monohydrate, Sodium citrate dehydrate, strawberry flavour, Tutti Frutti flavour, carmoisine water soluble, Purified water.

-Nombor MAL

MAL19912425XZ

Pengilang

PT Actavis Indonesia

Jl. Raya Bogor Km. 28,
Kelurahan Pekayon, Kecamatan
Pasar Rebo
Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta, Indonesia

Pemegang

Pendaftaran

Produk

DCH Auriga (Malaysia) Sdn.
Bhd.

Lot 6, Persiaran Perusahaan
Seksyen 23, 40300 Shah Alam
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16/05/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)220511/882