

# DEZAL ORAL SOLUTION 0.5MG/ML

Desloratadine (0.5 mg/ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dezal
2. Bagaimana Dezal berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dezal
4. Cara menggunakan Dezal
5. Semasa menggunakan Dezal
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dezal
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Dezal

Dezal melegakan simptom rinitis alergi (radang laluan udara dalam hidung yang disebabkan oleh alergi [alahan], misalnya, demam alergi atau alergi terhadap tungau habuk). Antara simptom ini ialah bersin, hidung berhingus atau terasa gatal, lelangit mulut terasa gatal, dan mata yang gatal, merah-merah atau berair.

Dezal juga digunakan untuk melegakan simptom urtikaria (masalah kulit yang disebabkan oleh alergi). Antara simptomnya ialah gatal-gatal dan gegata.

Simptom-simpptom ini dapat dilegakan sepanjang hari untuk membantu anda tidur dan meneruskan kegiatan seharian anda seperti biasa.

## Bagaimana Dezal berfungsi

Dezal ialah sejenis ubat antialergi yang tidak membuatkan anda mengantuk. Ubat ini dapat mengawal tindak balas alergi dan simptomnya.

## Sebelum menggunakan Dezal

### -Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Dezal jika anda alah (hipersensitif) terhadap *desloratadine* dan mana-mana bahan lain di dalam Dezal atau terhadap *loratadine*.

Dezal *oral solution* boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 11 tahun, remaja (12 tahun ke atas), dan orang dewasa, termasuklah warga emas.

### -Sebelum mula menggunakan

Berhati-hati apabila menggunakan Dezal jika fungsi ginjal (buah pinggang) anda kurang baik.

Jika anda berkeadaan begini, atau jika anda kurang pasti, tanya doktor sebelum anda menggunakan Dezal.

### Kehamilan dan menyusukan anak dengan susu badan

Mintalah nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum memakan apa-apa ubat semasa anda hamil dan semasa anda sedang menyusukan anak dengan susu badan.

Jika anda hamil atau sedang menyusukan anak dengan susu badan, Dezal tidak disyorkan.

### Maklumat penting tentang beberapa bahan kandungan di dalam Dezal

Dezal *oral solution* mengandungi sorbitol. Jika doktor memberitahu anda bahawa anda tidak dapat bertoleransi terhadap sesetengah jenis gula, hubungi doktor anda sebelum mula menggunakan produk perubatan ini.

### -Jika mengambil ubat-ubat lain

Tidak ada saling tindak balas yang diketahui berlaku antara Dezal dengan ubat-ubat lain.

### Mengambil Dezal dengan makanan dan minuman

Dezal boleh diambil sebelum ataupun selepas makan.

## Cara menggunakan Dezal

### -Berapa banyak harus diambil

Kanak-kanak antara usia 1 hingga 5 tahun: ambil 2.5 ml ( $\frac{1}{2}$  sudu 5 ml) sekali sehari.

Kanak-kanak antara usia 6 hingga 11 tahun: ambil 5 ml (satu sudu 5 ml) sekali sehari.

Orang dewasa dan remaja (12 tahun ke atas): ambil 10 ml (dua sudu 5 ml) sekali sehari.

Jika picagari penyukat dibekalkan bersama dengan botol ini, anda boleh menggunakannya untuk menyukat isi padu yang betul.

Telan dos ubat, kemudian minum sedikit air.

### -Bila perlu diambil

Anda boleh mengambil ubat ini sebelum ataupun selepas makan.

### -Berapa lama perlu diambil

Doktor akan menentukan jenis rinitis alergi yang anda hidapi dan kemudiannya menentukan tempoh anda harus menggunakan Dezal.

Jika rinitis alergi anda itu jenis bermusim (mengalami simptom kurang daripada 4 hari seminggu ataupun kurang daripada 4 minggu keseluruhannya), doktor akan mengesyorkan jadual rawatan mengikuti penilaian sejarah penyakit anda.

Jika rinitis alergi anda itu jenis berlarutan (mengalami simptom melebihi 4 hari seminggu dan melebihi 4 minggu keseluruhannya), doktor mungkin mengesyorkan tempoh rawatan yang lebih panjang.

Bagi urtikaria, tempoh rawatan mungkin berbeza bagi setiap pesakit dan oleh itu, anda harus mengikut arahan doktor.

### -Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa megambil ubat ini pada waktu yang sepatutnya, ambil secepat mungkin, kemudian teruskan dengan jadual waktu dos anda yang biasa. Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa itu.

### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Ambil Dezal tepat-tepat seperti yang diarahkan. Masalah serius tidak dijangka akan berlaku jika dos berlebihan diambil. Walau bagaimanapun, jika anda terambil lebih banyak ubat daripada yang diarahkan, hubungilah doktor atau ahli farmasi.

## Semasa menggunakan Dezal

### -Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

# DEZAL ORAL SOLUTION 0.5MG/ML

Desloratadine (0.5 mg/ml)

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

## -Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Dezal dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

## -Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan mengendalikan jentera

Pada dos yang disyorkan, Dezal tidak dijangka akan membuatkan anda mengantuk atau kurang berwaspada.

Walau bagaimanapun, sesetengah orang berasa mengantuk dan ini boleh menjejaskan kemampuan mereka memandu atau mengendalikan jentera. Namun begitu, ini jarang-jarang sekali berlaku.

## **Kesan-kesan sampingan**

Sama seperti semua ubat lain, Dezal boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan yang kerap yang mungkin dialami ialah:

- sakit kepala
- insomnia (tidak dapat tidur)
- mulut kering
- cirit-birit
- letih
- demam

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## **Cara penyimpanan dan pelupusan Dezal**

### -Penyimpanan

Simpan dalam pakej asal di bawah suhu 30°C.

### -Pelupusan

Jangan makan ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Pulangkan ubat yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan ubat jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam air buangan atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

## **Maklumat lanjut**

### -Rupa dan warna produk

Cecair jelas, tidak berwarna dan bebas daripada bahan asing.

### -Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Setiap ml mengandungi desloratadine 5mg.

Bahan tidak aktif

Sorbitol, propylene glycol, citric monohydrate, sodium citrate, hypromellose, sucralose, disodium edetate, tutti frutti flavour

### -Nombor MAL

MAL18016027ACZ

## **Pengilang**

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str.

Troyan 5600

BULGARIA

## **Pemegang**

## **Pendaftaran**

### **Produk**

DCH Auriga (Malaysia) Sdn. Bhd.

Lot 6, Persiaran Perusahaan

Seksyen 23, 40300 Shah Alam

Selangor, Malaysia

## **Tarikh kemaskini RiMUP**

13/12/2024

## **Nombor Siri**

NPRA(R2/1)190321/87