

BRIEKA CAPSULES

Pregabalin (50mg, 75mg, 150mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Brieka
2. Bagaimana Brieka berfungsi
3. Sebelum mengambil Brieka
4. Cara menggunakan Brieka
5. Semasa menggunakan Brieka
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Brieka
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Brieka

Pregabalin digunakan untuk merawat kesakitan sistem saraf periferi dan pusat dalam pesakit dewasa.

Pregabalin digunakan untuk terapi adjung dalam rawatan sawan separa dengan/tanpa generalisasi sekunder dalam pesakit dewasa.

Pregabalin digunakan untuk rawatan gangguan keresahan umum dalam pesakit dewasa.

Pregabalin digunakan untuk pengurusan fibromyalgia.

Bagaimana Brieka berfungsi

Pregabalin mengurangkan bilangan isyarat saraf dan membantu untuk menenangkan sel-sel saraf yang terlalu sensitif.

Sebelum mengambil Brieka

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mula mengambil Brieka sekiranya anda alah terhadap *pregabalin* atau apa-apa bahan yang terkandung dalam Brieka.

Gejala-gejala reaksi alahan terhadap *pregabalin* mungkin termasuk pembengkakan muka, bibir, lidah, dan tekak, sesak nafas, pernafasan berbunyi serta ruam kulit.

-Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum anda mengambil Brieka:

- mengalami atau pernah mengalami masalah perasaan atau pemikiran atau kelakuan membunuh diri

- mempunyai masalah buah pinggang atau mendapat dialisis buah pinggang

- mempunyai masalah jantung termasuk kegagalan jantung

- mempunyai masalah pendarahan atau bilangan platelet darah yang rendah

- pernah menyalahgunakan ubat preskripsi, dadah jalanan, atau alkohol sebelum ini

- pernah mengalami bengkak di bahagian muka, mulut, lidah, bibir, gusi, leher atau tekak anda (*angioedema*)

- mempunyai masalah mata. *Pregabalin* boleh menyebabkan keaburan atau kehilangan penglihatan, atau perubahan lain dalam penglihatan, yang kebanyakannya bersifat sementara. Anda harus segera memberitahu doktor jika mengalami perubahan dalam visi anda.

- anda hamil atau merancang untuk mengandung. Tidak diketahui sama ada *pregabalin* akan membahayakan bayi dalam kandungan anda.

Anda dan doktor anda perlu membuat keputusan sama ada anda harus mengambil *pregabalin* semasa mengandung.

- *pregabalin* boleh menyerap ke dalam susu ibu dan oleh itu, tidak boleh diambil semasa menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Hanya ambil ubat-ubatan lain semasa anda mengambil Brieka jika diberitahu oleh doktor bahawa anda boleh.

Apabila ubat-ubatan lain tertentu diambil bersama, Brieka mungkin akan meningkatkan kesan sampingan yang dilihat dengan ubat-ubatan tersebut, termasuk kegagalan pernafasan dan koma; contohnya seperti:

- ubat depressan sistem saraf pusat yang lain

Kesan rasa kepeningan, rasa mengantuk dan kurang penumpuan perhatian mungkin bertambah jika Brieka diambil bersama dengan ubat-ubatan yang mengandungi:

-*Oxycodone*; digunakan untuk menahan kesakitan

-*Lorazepam*; digunakan untuk mengubati kebimbangan

-Alkohol

Kenali ubat-ubat yang anda ambil. Simpan satu senarai ubat-ubat ini bersama anda untuk ditunjukkan kepada doktor dan ahli farmasi anda setiap kali anda mendapatkan ubat baru. Jangan mulakan ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Cara menggunakan Brieka

-Berapa banyak harus diambil

Mengambil Brieka tepat sebagaimana yang ditetapkan. Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak Brieka yang perlu untuk diambil.

- Brieka boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Doktor anda mungkin menukar dos anda. Jangan menukar dos anda tanpa berbincang dengan doktor anda.

-Bila perlu diambil

Mengambil Brieka tepat sebagaimana yang ditetapkan.

Doktor anda akan memberitahu anda bila untuk mengambil Brieka. Ia adalah dinasihatkan untuk mengambil Brieka pada masa yang sama setiap hari.

-Berapa lama perlu diambil

Sentiasa ambil ubat seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika anda berhenti mengambil Brieka secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami masalah sakit kepala, loya, cirit-birit atau masalah tidur. Sekiranya anda mempunyai epilepsi dan berhenti mengambil Brieka secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami sawan yang lebih kerap. Berbincang dengan doktor anda tentang bagaimana untuk menghentikan Brieka secara perlahan.

-Jika terlupa mengambil

Jika anda tertinggal satu dos, ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya ia hampir masa untuk dos seterusnya, hanya melangkau

BRIEKA CAPSULES

Pregabalin (50mg, 75mg, 150mg)

dos yang tertinggal. Ambil dos yang seterusnya mengikut masa yang ditetapkan. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil Brieka yang berlebihan, hubungi doktor anda atau pergi ke bilik kecemasan terdekat dengan segera.

Gejala mengambil berlebihan termasuk: gangguan kelakuan seperti kemurungan, keadaan bingung, kegelisahan, rasa mengantuk, dan keresahan.

Semasa menggunakan Brieka

-Perkara yang perlu dilakukan

Berhenti mengambil Brieka dan hubungi doktor anda dengan segera sekiranya anda mempunyai sebarang tanda reaksi alahan yang serius:

- Bengkak pada muka, mulut, bibir, gusi, lidah, tekak atau leher anda
 - Masalah pernafasan
 - Ruam, gatal-gatal (bengkak timbul) atau lepuh
- Hubungi doktor anda dengan segera sekiranya anda mempunyai mana-mana gejala berikut, terutamanya jika ia adalah baru, lebih teruk atau membimbangkan anda:
- Pemikiran bunuh diri atau mati
 - Masalah tidur (insomnia)
 - Percubaan untuk membunuh diri
 - Kerengsaan baru atau lebih teruk
 - Kemurungan yang baru atau lebih teruk
 - Bertindak agresif, marah atau ganas
 - Kebimbangan yang baru atau lebih teruk
 - Bertindak atas impuls berbahaya
 - Rasa resah atau gelisah
 - Peningkatan melampau dari segi kegiatan dan pertuturan (mania)
 - Serangan panik

- Perubahan-perubahan tingkah laku dan perasaan yang luar biasa

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan memandu, mengendalikan mesin, atau melakukan aktiviti-aktiviti lain yang boleh membahayakan anda sehingga anda mengetahui kesan-kesan Brieka terhadap anda.

Tanya doktor anda tentang masa yang sesuai bagi anda untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, jangan berhenti mengambil Brieka tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu.

- Berhenti mengambil Brieka secara tiba-tiba boleh mengakibatkan masalah yang serius.

- Pemikiran atau tindakan membunuh diri mungkin disebabkan oleh perkara-perkara lain daripada ubat-ubat.

Jika anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, doktor anda mungkin akan memeriksa sebab-sebab lain.

Memberi perhatian terhadap sebarang perubahan, terutamanya perubahan secara tiba-tiba, dari segi modus, tingkah laku, pemikiran atau perasaan.

Pastikan semua lawatan susulan dengan doktor anda dibuat seperti yang dijadualkan. Hubungi doktor anda antara masa lawatan seperti yang diperlukan, terutamanya jika anda risau tentang simptom-simptom ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan Brieka boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang dialami termasuk:

Sangat biasa:

- pening
- rasa mengantuk
- sakit kepala

Biasa

- inflamasi tekak
- selera makan meningkat.
- perasaan kegembiraan, kekeliruan, disorientasi, penurunan minat seksual, kerengsaan.
- masalah perhatian, kelenturan, gangguan ingatan, kehilangan ingatan, gegaran, kesukaran bertutur, rasa kesemutan, kebas, sedasi, kelesuan, insomnia, rasa letih, rasa tidak normal.
- penglihatan kabur, penglihatan dua visi.
- Vertigo (masalah dengan keseimbangan)
- mulut kering, sembelit, muntah, kembung perut, cirit-birit, mual, abdomen bengkak.
- masalah ereksi.
- rasa mabuk, gaya berjalan yang tidak normal.
- berat badan meningkat

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Brieka

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

-Pelupusan

Jangan makan ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Pulang kapsul yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan kapsul jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam air buangan atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

BRIEKA CAPSULES

Pregabalin (50mg, 75mg, 150mg)

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

50mg: Kapsul topi putih dan badan putih, kapsul gelatin keras saiz 3. Tanda pada badan: "PGB 50" dengan gelang hitam.

75mg: Kapsul topi oren dan badan putih, kapsul gelatin keras saiz 4. Tanda pada badan: "PGB 75"

150mg: Kapsul topi putih dan badan putih, kapsul gelatin keras saiz 2. Tanda pada badan: "PGB 75"

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

50mg: Setiap kapsul mengandungi 50mg *pregabalin*.

75mg: Setiap kapsul mengandungi 75mg *pregabalin*.

150mg: Setiap kapsul mengandungi 150mg *pregabalin*.

Bahan-bahan tidak aktif:

Mannitol, corn starch, pregelatinised corn starch, talc

Kapsul keras

75mg: mengandungi *titanium dioxide, gelatin, iron oxide red, water*

50mg dan 150mg: mengandungi *titanium dioxide, gelatin, water*

-Nombor MAL

Brieka capsules 50mg:
MAL18066054AZ

Brieka capsules 75mg:
MAL18046172AZ

Brieka capsules 150mg:
MAL18046171AZ

Pengilang.

Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.,
Dupnitsa 2600, Bulgaria

Pemegang Pendaftaran Produk

DCH Auriga (Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 6, Persiaran Perusahaan
Seksyen 23, 40300 Shah Alam
Selangor, Malaysia