

CAP SEEN SHEI MINYAK ANGIN ZHUI FONG YEW

Metil Salisilat 57%w/v, Mentol 8%w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Zhui Fong Yew
2. Bagaimana Zhui Fong Yew berfungsi
3. Sebelum menggunakan Zhui Fong Yew
4. Cara menggunakan Zhui Fong Yew
5. Semasa menggunakan Zhui Fong Yew
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Zhui Fong Yew
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Zhui Fong Yew

Ia digunakan untuk melegakan kesakitan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit reumatik.

Bagaimana Zhui Fong Yew berfungsi

Ia mengandungi mentol dan metil salisilat. Mentol memuai salur darah dan bagi sensasi kesejukan, diikuti dengan kesan analgesic. Ia boleh meningkatkan penembusan ubat-ubatan apabila diaplikasi pada kulit dan memberi permulaan tindakan yang lebih cepat. Metil salisilat digunakan secara topikal sebagai pembalas perengsa. Selepas aplikasi, ia diserap melalui kulit dan boleh melegakan kesakitan reumatik atau kesakitan otot dan sendi.

Sebelum menggunakan Zhui Fong Yew

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

- Sebelum menggunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko pendarahan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Cara menggunakan Zhui Fong Yew

- Berapa banyak harus digunakan

Gosok di tempat yang sakit 3 hingga 4 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda

tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Zhui Fong Yew

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat yang anda sedang ambil.

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memerhati sama ada ketidakselesaan atau gatal berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang lebih besar. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti gunakannya.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tidak boleh sapu pada bahagian mata, permukaan mukus, luka terbuka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Zhui Fong Yew dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Kesan-kesan sampingan

Iritasi kulit, kemerahan, bengkak, rasa pedih berlaku. Reaksi buruk jarang berlaku, simptom pening, loya boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78018464/ 8470, atau laman web npra.moh.gov.my (Orange Awam →Lapor

Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Zhui Fong Yew

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan daripada kanak- kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Product Description

- Rupa dan warna produk

Minyak berwarna coklat dengan bau yang tersendiri.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Mentol, metil salisilat

- Bahan tidak aktif

Chlorophyll, Red 17, liquid paraffin

- Nombor MAL

MALXXXXXXXXXX

Pengilang

Wellmetech Pharmaceutical Industries Sdn Bhd

Lot 8058, Kota Samarahan Industrial Park, 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Kian Feng Trading

No. 81, Lalan Rokam 13, Pekan Razaki, 31350 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

9/3/2018