

BIOSONE[®] 100 mcg/dose HFA Inhalation Aerosol

Beclometasone dipropionate 100 mcg/dose

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apa kegunaan Biosone[®]
2. Bagaimana Biosone[®] berfungsi
3. Sebelum mengambil Biosone[®]
4. Cara menggunakan Biosone[®]
5. Semasa menggunakan Biosone[®]
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Biosone[®]
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Biosone[®]

Komponen aktif Biosone[®] adalah Beclometasone Dipropionate, yang merupakan corticosteroid anti-radang. Ia membantu mencegah asma pada orang yang memerlukan rawatan biasa. Kerana itulah ia kadang-kadang dipanggil 'pencegah'.

Bagaimana Biosone[®] berfungsi

Biosone[®] berfungsi dengan mengurangkan bengkak dan kerengsaan dalam paru-paru. Ia adalah tekanan bermeter dos aerosol bertujuan untuk penyedutan oral sahaja. Ia adalah satu alat sedut mesra alam.

Sebelum menggunakan Biosone[®]

Sesetengah ubat boleh meningkatkan kesan Biosone[®] dan doktor anda mungkin ingin memantau anda dengan teliti jika anda mengambil ubat ini (termasuk beberapa ubat untuk rawatan HIV seperti cobicistat).

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan Biosone[®] jika anda alah (hipersensitif) kepada:

- Beclometasone Dipropionate
- Laktosa atau susu protein
- Mana-mana bahan lain Biosone[®]
- Sila jangan gunakan Biosone[®] jika mana-mana keadaan di atas berkaitan kepada anda. Jika anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Biosone[®]

Kehamilan dan penyusuan

Jangan ambil Biosone[®] jika anda hamil, mencuba untuk hamil atau berfikir anda mungkin hamil.

Jangan ambil Biosone[®] jika anda sedang menyusukan bayi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum mula menggunakannya:

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai keadaan berikut:

- Anda pernah dirawat kerana batuk kering (TB)
- Anda menggunakan beclometasone pada masa yang sama mengambil pil steroid atau jika anda baru sahaja selesai mengambil tablet steroid.

Jika anda tidak pasti sama ada mana-mana di atas berkaitan dengan anda, berbincang dengan doktor, jururawat atau ahli farmasi sebelum menggunakan Biosone[®]

- Jika mengambil ubat-ubat lain:

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Biosone[®]

-Berapa banyak harus digunakan:

Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Maklumat mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

-Bila perlu digunakan:

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan:

Teruskan mengambil Biosone[®] selama tempoh yang dicadangkan oleh doktor.

-Jika anda terlupa menggunakan:

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik saja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos):

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja telah mengambil ubat ini terlalu banyak.


Bertindak segera walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Biosone[®]


-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang disarankan oleh doktor.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Biosone[®]
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda baru hamil semasa sedang mengambil ubat ini.

Arahan penggunaan:



Jika anda menggunakan alat sedut untuk kali pertama atau jika alat sedut tidak digunakan untuk sekurang-kurangnya sepuluh hari, lakukan "semburan ujian" untuk alat sedut anda.




Keluarkan penutup dari pelekap mulut.

BIOSONE[®] 100 mcg/dose HFA Inhalation Aerosol

Beclometasone dipropionate 100 mcg/dose

Periksa pelepasan mulut jika terdapat objek asing setiap kali sebelum digunakan.




Sebelum setiap sedutan, semburkan alat sedut 2 kali ke udara selepas menggoncang alat sedut. Pastikan kanister dimasukkan ke dalam penggerak sepenuhnya dengan kukuh. Pegang alat sedut secara menegak dengan ibu jari di pangkalan. Letakkan satu atau dua jari di atas bahagian atas kanister.

Cara penggunaan yang sesuai dan berguna untuk kanak – kanak

Kanak-kanak dan individu lain yang mempunyai kekuatan tangan yang lemah mungkin menghadapi kesukaran untuk menekan bahagian atas inhaler hanya dengan sebelah tangan. Mereka boleh menggunakan kedua-dua belah tangan untuk mengendalikan inhaler mereka. Hembus nafas sepenuhnya melalui mulut anda untuk melepaskan sebanyak udara yang mungkin dari paru-paru anda.



Selepas itu, letakkan corong alat sedut dalam mulut anda di antara gigi anda.




Tutup bibir di sekitarnya (tanpa menggigit alat), halakan kepala anda sedikit ke belakang. Tarik nafas dengan perlahan-lahan melalui mulut anda.



Semasa anda menarik nafas dengan dalam, tekan kanister ke bawah untuk melepaskan satu sedutan.

Tahan nafas anda dan keluarkan alat sedut daripada mulut anda. Teruskan menahan nafas selama 10 saat atau seberapa lama yang selesa bagi anda. Selepas itu, hembus nafas dengan perlahan-lahan.



Selepas penggunaan, letakkan semula penutup pelepasan mulut.

Pembersihan:

Pastikan penggerak plastik anda disimpan dalam keadaan bersih untuk mengelakkan pembentukan ubat dan tersumbat. Penggerak perlu dibasuh dan digoncang untuk mengeluarkan lebih air dan udara kering dengan teliti sekurang-kurangnya sekali seminggu. Alat sedut boleh berhenti menyembur jika tidak dibersihkan dengan betul.

1. Tarik kanister dengan perlahan-lahan daripada badan plastik alat sedut. Keluarkan penutup pelepasan mulut itu.
2. Bilas badan plastik dan penutup pelepasan mulut di dalam air suam yang mengalir.
3. Keringkan dengan teliti. Elakkan menggunakan suhu berlebihan semasa pengeringan.
4. Pasang semula kanister dan penutup pelepasan mulut dengan betul.
5. Jangan masukkan kanister logam ke dalam air.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan Biosone[®] kecuali dinasihatkan oleh doktor.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Biosone[®] dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan mengendalikan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala selepas mengambil ubat ini, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Sama seperti semua ubat lain, Biosone[®] boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang serius seperti berikut, berhenti menggunakan ubat ini dan bincang dengan doktor anda dengan segera. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

- Reaksi alahan seperti ruam kulit, kemerahan, gatal-gatal dan lain-lain.
- Pernafasan atau masalah semput anda menjadi lebih teruk selepas anda menggunakan inhaler anda.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*]

BIOSONE[®] 100 mcg/dose HFA Inhalation Aerosol

Beclometasone dipropionate 100 mcg/dose

**Cara penyimpanan dan pelupusan
Biosone**

Penyimpanan:

Jauhi ubat daripada capaian kanak-kanak.

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada sinaran matahari.

Pelupusan:

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk:

Biosone[®] adalah persediaan pukal untuk penyedutan, yang dibekalkan di dalam bekas bertekanan. Pada pemeriksaan visual, bekas bertekanan tidak mempunyai tanda-tanda kerosakan fizikal atau kebocoran. Produk ini adalah dalam bentuk larutan yang jernih.

-Bahan-bahan kandungan:

Bahan aktif

-Beclometasone dipropionate BP

Bahan-bahan tidak aktif

-Dehydrated alcohol

-Tetra-fluoro ethane (HFA 134a)

Nombor Mal.:

MAL16115015AZ

Pengilang

BioCare Manufacturing Sdn. Bhd.

Lot 269, Taman Farmaseutikal, Bandar Baru Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

BioCare Manufacturing Sdn. Bhd.

No 67, Jalan Gasing,
46000 Petaling Jaya, Selangor.

Tarikh kemaskini RiMUP

29/09/2025

Nombor siri

NPRA(R2/1)220224/839