

PHARMANIAGA FRUSEMIDE TABLET

Frusemide (40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Frusemide Tablet
2. Bagaimana Pharmaniaga Frusemide Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Frusemide Tablet
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Frusemide Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pharmaniaga Frusemide Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Frusemide Tablet

Pharmaniaga Frusemide Tablet digunakan untuk merawat bengkak pada buku lali, kaki atau juga otak atau paru-paru. Bengkak ini dipanggil edema dan boleh berlaku apabila terdapat masalah jantung, paru-paru, hati atau buah pinggang. Pharmaniaga Frusemide Tablet boleh digunakan pada pesakit yang mengalami masalah buah pinggang yang serius, yang mungkin menyebabkan penahanan bendalir badan.

Pharmaniaga Frusemide Tablet juga boleh digunakan untuk mengurangkan tekanan darah tinggi (yang juga dipanggil hipertensi).

Pharmaniaga Frusemide Tablet boleh diambil secara berasingan atau bersama ubat lain bagi merawat penyakit anda.

Doktor anda boleh mempreskripsikan Pharmaniaga Frusemide Tablet untuk tujuan lain.

Bagaimana Pharmaniaga Frusemide Tablet berfungsi

Pharmaniaga Frusemide Tablet membantu mengurangkan jumlah cecair yang berlebihan dalam badan dengan meningkatkan jumlah air kencing yang dihasilkan.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Frusemide sekiranya anda mengalami:

- Masalah buah pinggang yang tertentu.
- Tiada penghasilan air kencing atau tidak boleh kencing.
- Tekanan darah rendah (hipotensi).
- Kandungan sodium yang rendah dalam darah anda.
- Kandungan potasium yang rendah dalam darah.
- Ternyah-hidrat.

Jangan ambil Pharmaniaga Frusemide Tablet sekiranya anda mengalami alahan kepada:

- Ubat ini atau sebarang ramuan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- Ubat yang dipanggil sulfonamides (contohnya beberapa jenis antibiotik yang dirujuk sebagai 'antibiotik sulfur') atau ubat-ubatan sulfonilurea yang boleh digunakan untuk merawat kencing manis

Antara gejala tindak balas alahan ialah ruam pada kulit, rasa gatal, sesak nafas atau bengkak pada muka, bibir atau lidah, yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas. Jangan ambil Pharmaniaga Frusemide Tablet sekiranya anda hamil.

Jangan ambil Pharmaniaga Frusemide Tablet sekiranya anda menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan bayi.

Bahan aktif, frusemide, meresap ke dalam susu ibu, oleh itu mungkin memberi kesan kepada bayi anda.

-Sebelum mula mengambil

Maklumkan doktor anda jika anda mengalami alahan kepada:

- Sebarang ramuan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- Sebarang ubat lain yang dipanggil sulfonamide atau sulfonilurea.
- Bahan-bahan lain seperti makanan, pengawet atau pencelup.

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda hamil atau bercadang untuk hamil.

Seperti kebanyakan ubat daripada jenis ini, penggunaan Pharmaniaga Frusemide Tablet tidak disyorkan sewaktu kehamilan.

Jika pengambilan Frusemide perlu dipertimbangkan sewaktu kehamilan, doktor anda akan berbincang tentang risiko dan manfaat pengambilannya sekiranya anda hamil.

Beritahu doktor jika anda menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan bayi anda.

Frusemide meresap ke dalam susu ibu, oleh itu mungkin memberi kesan kepada bayi anda. Doktor anda akan berbincang tentang risiko dan manfaat pengambilannya jika anda menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan bayi anda.

Beritahu doktor jika anda pernah atau sedang mengalami sebarang keadaan perubatan, terutamanya perkara berikut:

- Masalah hati
- Masalah buah pinggang
- Masalah jantung
- Kencing manis
- Gout, sejenis penyakit sendi bengkak dan sakit
- Anda kurang membuang air kecil seperti biasa
- Sukar membuang air kecil
- Tiada penghasilan air kencing atau tidak boleh kencing
- Masalah prostat

Beritahu doktor anda jika anda mengamalkan diet terhadap garam.

Jika anda belum memberitahu doktor anda mengenai sebarang perkara di atas, sila beritahu sebelum anda mula mengambil Frusemide.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat yang lain, termasuklah ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat tidak patut diambil bersama Pharmaniaga Frusemide Tablet. Ini termasuklah julap dalam kuantiti yang banyak.

Sesetengah ubat boleh mengganggu fungsi Frusemide. Ini termasuklah:

PHARMANIAGA FRUSEMIDE TABLET

Frusemide (40mg)

- Tablet cecair tertentu atau ubat diuretik lain.
- Ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan beberapa masalah jantung yang lain terutamanya perencat ACE atau antagonis reseptor angiotensin.
- Digoxin dan ubat-ubat lain yang digunakan bagi merawat kegagalan jantung
- Ubat anti radang bukan steroid (NSAID) dan aspirin, ubat yang digunakan untuk melegakan kesakitan, bengkak dan gejala- gejala keradangan yang lain, termasuklah artritis.
- Ubat yang digunakan untuk mengendurkan otot sebelum atau semasa pembedahan.
- Lithium, ubat yang digunakan untuk merawat perubahan ragam dan sesetengah jenis kemurungan.
- Ubat yang digunakan dalam keadaan kecemasan seperti adrenalin dan noradrenalin.
- Cisplatin, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat barah.
- Theophylline, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat lelah.
- Sesetengah antibiotik, terutamanya cephalosporins.
- Amphotericin, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat.
- Barbiturate, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat penyakit sawan babi, sebagai penenang, atau membantu anda tidur.
- Narkotik/ubat penghilang kesakitan yang kuat seperti Codein dan Morphine.
- Insulin dan tablet yang digunakan untuk merawat kencing manis.
- Sucralfate, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat ulser perut.
- Ubat antikonvulsan seperti Chloral hydrate atau Phenytoin.
- Kortikosteroid seperti Cortisone, Prednisone atau Dexamethasone.
- Ubat yang digunakan sewaktu imbasan bagi melihat imej tubuh anda.

Pharmaniaga Frusemide Tablet mungkin mengganggu fungsi ubat-ubat ini, atau menjejaskan keberkesanannya. Anda mungkin perlu menggunakan jumlah atau

jenis ubat yang berbeza. Doktor anda atau ahli farmasi akan memberitahu anda.

Anda tidak sepatutnya mengambil *liquorice* dalam kuantiti yang banyak apabila mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet. Doktor anda atau ahli farmasi mempunyai maklumat lanjut berkaitan ubat yang perlu diawasi atau dielakkan sewaktu pengambilan Pharmaniaga Frusemide Tablet.

Cara menggunakan Pharmaniaga Frusemide Tablet

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan yang diberikan oleh doktor anda dan ahli farmasi dengan teliti.

Secara amnya, bagi orang dewasa rawatan dimulakan dengan dos harian separuh hingga 1 tablet sehari.

Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

Dapatkan maklumat daripada doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti tentang dos yang sesuai untuk anda. Mereka akan memberitahu anda berapa banyak yang perlu diambil.

Ikut arahan yang diberikan kepada anda. Frusemide mungkin tidak memberikan kesan yang sepatutnya dan masalah kesihatan anda tidak beransur pulih sekiranya anda mengambil dos yang salah.

-Bila perlu digunakan

Pharmaniaga Frusemide Tablet selalunya diambil sekali atau dua kali sehari. Ambil Pharmaniaga Frusemide Tablet sewaktu perut kosong. Makanan boleh mengganggu penyerapan ubat.

Ambil Pharmaniaga Frusemide Tablet pada waktu yang hampir sama setiap hari melainkan doktor anda mengarahkan sebaliknya.

Pengambilan ubat pada masa yang sama setiap hari akan memberikan kesan yang terbaik. Ini juga boleh membantu anda mengingati waktu pengambilan ubat.

Sekiranya doktor anda mempreskripsikan Pharmaniaga Frusemide Tablet sekali sehari, adalah lebih baik sebaik-baiknya ambil ubat

pada waktu pagi, contohnya, sebelum sarapan.

Jika anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet lebih daripada sekali sehari, ambil dos yang pertama sejurus sebelum sarapan dan ambil dos terakhir sekitar jam 2:00 ptg (sewaktu perut kosong), melainkan doktor anda mengarahkan sebaliknya.

Pharmaniaga Frusemide Tablet boleh meningkatkan kuantiti air kencing yang dihasilkan, ia juga mengakibatkan anda perlu ke tandas dengan lebih kerap. Tidur anda akan kurang terganggu jika anda mengambil dos terakhir sekitar jam 2.00 ptg.

-Berapa lama perlu digunakan

Edema:

Teruskan pengambilan ubat anda selagi doktor anda mengarahkannya. Ubat ini membantu mengawal keadaan anda dan mengurangkan pengumpulan bendalir di dalam badan.

Hipertensi:

Teruskan pengambilan ubat anda selagi doktor anda mengarahkannya.

Ubat ini membantu mengawal tekanan darah, tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Teruskan pengambilan ubat sehingga doktor mengarahkan anda berhenti mengambilnya.

Dapatkan maklumat daripada doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti berapa lama perlu mengambil ubat ini.

-Jika terlupa menggunakan

Anda perlu mengambil ubat anda setiap hari memandangkan rawatan tetap berfungsi lebih baik.

Walau bagaimanapun, sekiranya anda terlupa mengambil dos Pharmaniaga Frusemide Tablet, ambil dos seterusnya pada waktu yang biasa. Jangan ambil dos berganda sebagai ganti dos yang anda terlupa ambil.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda terambil dos yang berlebihan, hubungi doktor anda atau jabatan kemalangan dan kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Lakukannya walaupun tiada tanda-

PHARMANIAGA FRUSEMIDE TABLET

Frusemide (40mg)

tanda tidak selesa atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan yang segera. Sekiranya anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet terlalu banyak, anda mungkin berasa bercelaru, ternyahhidrat, pening atau membuang air kecil dengan banyak.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Frusemide Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet.

Sekiranya anda merancang untuk menjalani pembedahan yang perlu diberi ubat bius am, beritahu kepada doktor atau doktor gigi anda bahawa anda mengambil ubat ini.

Tekanan darah anda mungkin berkurang secara mendadak.

Sekiranya anda hamil sewaktu pengambilan ubat ini, beritahu doktor anda atau ahli farmasi dengan segera. Beritahu kepada doktor jika anda mengalami muntah-muntah atau cirit- birit yang teruk semasa pengambilan Pharmaniaga Frusemide Tablet atau jika anda mengalami sebarang gejala yang berikut:

- Mulut kering atau rasa dahaga.
- Pengsa.
- Berasa lemah keletihan atau mengantuk.
- Kesakitan atau kekejangan otot.
- Denyutan jantung yang pantas.
- Pembuang air kecil kurang daripada biasa.

Sekiranya anda mengalami gejala ini, anda mungkin ternyahhidrat akibat kehilangan terlalu banyak air.

Pastikan anda minum air yang cukup sewaktu bersenam dan ketika cuaca panas apabila anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet, terutamanya jika anda banyak berpeluh.

Anda mungkin berasa hendak pengsan atau pening-pening lalat atau tidak sihat jika anda tidak minum air secukupnya sewaktu pengambilan Pharmaniaga Frusemide Tablet. Ini kerana tekanan darah anda berkurang secara mendadak dan anda

mengalami penyahhidratan. Beritahu doktor jika anda masih berasa tidak sihat.

Anda harus memberitahu doktor bahawa anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet sebelum menjalani sebarang ujian darah. Ubat ini mungkin boleh menjejaskan keputusan ujian.

Jika anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet bagi merawat tekanan darah tinggi, pastikan anda memeriksa tekanan darah mengikut arahan doktor bagi memastikan keberkesanan Pharmaniaga Frusemide Tablet.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

Jangan gunakan ubat ini untuk merawat masalah lain melainkan diarahkan oleh doktor.

Jangan hentikan pengambilan Pharmaniaga Frusemide Tablet, atau menukar dos, tanpa merujuk kepada doktor anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda berasa pening-pening lalat, pening atau hendak pengsan, bangun dari katil atau berdiri secara perlahan- lahan. Ubat-ubatan diuretik boleh menyebabkan pening atau ringan kepala pada sesetengah orang. Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas kepada ubat anda sebelum anda memandu kereta, mengendalikan jentera, atau melakukan aktiviti yang boleh membahayakan jika anda pening atau ringan kepala.

Keadaan pening atau pening-pening lalat ini boleh menjadi lebih serius jika anda meminum arak atau mengambil ubat penghilang kesakitan yang kuat. Kesan arak akan menjadi lebih ketara sewaktu pengambilan Frusemide. Anda tidak disyorkan meminum arak sewaktu pengambilan Pharmaniaga Frusemide Tablet.

Jika anda mengambil Pharmaniaga Frusemide Tablet bagi suatu jangka masa yang panjang, anda harus berbincang dengan doktor sama ada anda perlu memakan lebih makanan yang

mengandungi kalium atau mengambil potasium tambahan.

Bagaimanapun, penambahan jumlah potasium dalam pemakanan anda mungkin tidak perlu dan berbahaya. Rujuk kepada doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini. Kadangkala kesan sampingan ini teruk, tetapi biasanya tidak. Doktor telah menimbangkan risiko penggunaan ubat ini berbanding faedahnya pada diri anda.

Jangan bimbang tentang senarai kesan sampingan yang mungkin berlaku ini. Anda mungkin tidak akan mengalaminya langsung.

Pharmaniaga Frusemide Tablet membantu kebanyakan orang yang mengalami tekanan darah tinggi atau penahanan bendalir badan, namun ubat ini mungkin mengakibatkan kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang perkara berikut yang merunsingkan anda:

- Kelesuan atau keletihan
- Kesakitan atau kekejangan otot.
- Keresahan.
- Rasa mengantuk atau kekurangan tenaga.
- Rasa pening atau pening-pening lalat.
- Sakit kepala.
- Muntah-muntah atau rasa loya.
- Cirit-birit.
- Penglihatan kabur atau rosak.

Ini merupakan kesan sampingan Pharmaniaga Frusemide Tablet yang lebih biasa berlaku. Kebanyakannya tidak teruk atau tidak berpanjangan.

Beritahu doktor anda secepat mungkin jika anda menyedari berlaku sebarang perkara yang disebutkan di bawah:

- Denyutan jantung yang pantas atau tidak tetap.
- Anda kurang membuang air kecil seperti biasa.
- Sakit perut yang serius, selalunya disertai rasa loya atau muntah- muntah.

PHARMANIAGA FRUSEMIDE TABLET

Frusemide (40mg)

- Pening atau rasa berpusing yang serius.
- Lebih sensitif kepada cahaya matahari.
- Kulit terkelupas atau tertanggal.
- Gejala anemia seperti keletihan, tercungap ketika bersenam, pening dan kelihatan pucat.
- Tidak dapat mengawal pundi kencing atau usus (kencing tak terkawal).
- Gout, sejenis penyakit sendi, bengkak dan sakit.

Ini mungkin kesan sampingan Frusemide yang berlaku. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan yang segera. Kesan sampingan yang serius bukan keadaan yang biasa berlaku.

Jika berlaku perkara seperti yang berikut, beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke jabatan Kemalangan dan Kecemasan di hospital yang terdekat:

- Tanda alahan yang berlaku secara tiba-tiba seperti ruam, rasa gatal atau gatal-gatal (bahagian benjolan yang gatal kemerahan) pada kulit,
- bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian lain pada badan, sesak nafas, bunyi nafas berdehit atau kesukaran bernafas.
- Sakit dada.
- Pengsan atau denyutan nadi yang lebih cepat serta lemah.
- Kancing gigi.
- Bintik-bintik kemerahan yang selalunya gatal, serupa dengan ruam campak yang bermula dari kaki dan tangan serta kadangkala pada muka dan badan. Bintik-bintik ini boleh
- melepuh dan membentuk tanda-tanda benjolan kemerahan yang berwarna pucat di tengahnya. Jangkitan boleh menyebabkan demam, sakit tekak, sakit kepala berserta atau tanpa cirit-birit.
- Kulit dan/atau mata menjadi kuning (demam kuning).

Ini ialah kesan sampingan yang serius. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan atau kemasukan ke hospital yang segera. Kesan sampingan ini sangat jarang berlaku.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda menyedari ada perkara lain yang menyebabkan anda rasa tidak sihat.

Sesetengah orang mungkin mengalami kesan sampingan yang tidak dinyatakan di atas.

Dapatkan maklumat daripada doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web np.ra.gov.my [Consumer -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Frusemide Tablet

-Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak. Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhunya sentiasa dibawah 30°C.

Tutup rapat penutup bekas. Lindungi dari cahaya.

Jangan simpan ubat didalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki atau tingkap. Jangan meninggalkan ubat ini di dalam kereta semasa cuaca panas. Kepanasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melewati tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusannya.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk bulat dwicembung yang berwarna putih hingga putih pudar dengan cira-ciri penandaan.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Frusemide 40 mg

Bahan tidak aktif

Cornstarch, Povidone K29/32, Talcum, Magnesium Stearate, Sodium Starch Glycolate, Lactose.

-Nombor MAL:

MAL19870221AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (198001006232),

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (198001006232),

No. 11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/07/2024

Nombor siri

NPRA(R2/1)201126/568