

PHARMANIAGA CEPHALEXIN SUSPENSION

Cephalexin (125mg per 5ml, 250mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Cephalexin Suspension
2. Bagaimana Pharmaniaga Cephalexin Suspension berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Cephalexin Suspension
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Cephalexin Suspension
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Cephalexin Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Cephalexin Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Pharmaniaga Cephalexin Suspension

Ia digunakan untuk merawat septisemia (jangkitan darah), jangkitan tulang dan sendi, termasuk jangkitan luka terbakar dan jangkitan saluran kencing yang disebabkan oleh bakteria. Ia tidak berkesan dalam merawat jangkitan sistem saraf.

Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh digunakan sebagai satu alternatif kepada rawatan penisilin untuk merawat radang paru-paru dan jangkitan dalam hati disebabkan oleh jangkitan bakteria.

Bagaimana Pharmaniaga Cephalexin Suspension berfungsi

Cephalexin merupakan antibiotik cephalosporin generasi pertama. Cephalosporin mempunyai keupayaan untuk menghalang penghasilan bakteria seperti penisilin dengan bertindak dengan menghalang penghasilan dinding sel bakteria.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Cephalexin Suspension

-Bila tidak boleh diambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai reaksi alahan kepada Pharmaniaga Cephalexin Suspension atau ubat cephalosporins yang lain, atau mana-mana bahan dalam kandungan ubat ini yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula menggunakan ubat ini, bincang dengan doktor atau ahli farmasi.

-Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor jika anda mempunyai alahan kepada ubat cephalosporins, penisilin atau mana-mana antibiotik lain sebelum mengambil ubat ini. Anda mungkin mempunyai peluang yang tinggi mengalami alahan kepada Pharmaniaga Cephalexin Suspension jika anda alahan kepada ubat-ubat ini.

- Kira-kira 10% daripada individu yang sensitif kepada penisilin akan juga alah kepada cephalosporins. Oleh itu, ambil langkah berjaga-jaga jika Pharmaniaga Cephalexin Suspension diberikan kepada individu yang sangat sensitif kepada penisilin. Perhatian juga perlu diberikan kepada individu yang diketahui mempunyai sejarah alahan.
- Pengurangan sukatan dos akan disyorkan untuk pesakit yang mempunyai masalah kerosakan buah pinggang yang teruk.
- Penggunaan berterusan Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh menyebabkan pertumbuhan berlebihan organisma yang tahan kepada antibiotik.
- Elakkan mengambil Pharmaniaga Cephalexin Suspension jika anda mempunyai masalah keturunan yang jarang berlaku iaitu intoleransi fruktosa, kekurangan zat glukosa-galaktosa atau kekurangan sukrosa-isomaltase.
- Langkah berjaga-jaga harus diambil sekiranya anda menghidap diabetes.

Hamil dan menyusukan bayi

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi terlebih dahulu sekiranya anda sedang hamil atau sedang menyusukan bayi kerana Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh melintasi plasenta dan kuantiti yang kecil dijumpai di dalam susu ibu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Hal ini kerana Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh mempengaruhi cara sesuatu ubat yang lain berfungsi. Malah, sesuatu ubat yang lain juga boleh mempengaruhi cara Pharmaniaga Cephalexin Suspension berfungsi.

- Probenecid, ubat untuk gout
- Sitotoksik, ubat untuk leukemia
- Antibiotik bakteristatik
- Antikoagulan oral, ubat untuk mencegah pembekuan darah
- Metformin, ubat untuk diabetes jenis 2
- Kontraseptif oral, ubat untuk mencegah kehamilan

Jika anda memerlukan nasihat, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Cara menggunakan Pharmaniaga Cephalexin Suspension

Arahan untuk pembancuhan: Goncang botol untuk meleraikan serbuk. Tambah air yang baru dimasak dan air sejuk dan goncang ratakan. Tambah air sehingga mencapai takat jumlah yang dikehendaki. Ubat ini mesti digunakan dalam tempoh 7 hari selepas bancuhan. Goncang bekas dengan baik setiap kali sebelum digunakan.

-Berapa banyak harus diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Ia mungkin berbeza daripada kandungan maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa:

1 hingga 2 g setiap hari dalam dos yang dibahagikan selang 6, 8 atau 12 jam.

Kanak-kanak dan bayi:

25 hingga 100 mg setiap kg berat badan setiap hari dalam dos yang dibahagikan kepada maksimum 4 g setiap hari.

Rejimen dos yang biasa :

Kanak-kanak berusia,
5 hingga 12 tahun – 250 mg tiga kali sehari

1 hingga 5 tahun – 125 mg tiga kali sehari
Bawah 1 tahun – 62.5 mg hingga 125 mg dua kali sehari

-Bila perlu diambil

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada waktu biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda merasakan anda atau orang lain mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala mengambil ubat ini secara berlebihan termasuklah loya, muntah, sakit perut, cirit-birit dan darah dalam air kencing anda.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Cephalexin Suspension

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat sepertimana diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Beritahu doktor dan ahli farmasi anda jika anda alah kepada cephalosporin, penisilin, atau mana-mana antibiotik yang lain.
- Beritahu doktor anda dan ahli farmasi mengenai sebarang ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi yang anda ambil.
- Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mempunyai penyakit buah pinggang atau penyakit hati, ulser atau masalah perut.
- Beritahu doktor anda jika anda hamil, merancang untuk hamil, atau menyusukan bayi. Jika anda hamil semasa mengambil Pharmaniaga Cephalexin Suspension, hubungi doktor anda.

- Jika anda akan mengambil ujian darah atau air kencing, beritahu doktor bahawa anda sedang mengambil ubat ini. Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh menjejaskan keputusan beberapa ujian ini.

-Perkara yang tidak boleh lakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan berkongsi Pharmaniaga Cephalexin Suspension dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika reaksi alahan berlaku, berhenti menggunakannya dan beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan Pharmaniaga Cephalexin Suspension termasuklah loya, muntah, ketidakhadaman, cirit-birit, sakit perut, bengkak atau keradangan usus besar disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan bakteria *Clostridioides difficile*, tahap platelet yang rendah dan tidak normal, kepekatan sel darah putih dan merah yang rendah dan tidak normal, peningkatan enzim hati (ALT dan AST), penyakit hati, reaksi alahan seperti ruam kulit, kulit kemerahan, lepuh, keradangan faraj dan keputihan yang tidak normal, kekejangan otot atau sendi seperti sakit, bengkak dan nyeri, penyakit buah pinggang, pening, keletihan, sakit kepala, kegelisahan, kekeliruan, halusinasi, hiperaktif, kegelisahan, gangguan tidur atau sawan.

Pharmaniaga Cephalexin Suspension boleh menyebabkan alergi teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Pharmaniaga Cephalexin Suspension dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera sekiranya anda mengalami gejala berikut:

- Kulit kemerah-merahan, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nprra.moh.gov.my (*Public Reporting Side Effects to medicines (ConSERF)/Vaccine (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Cephalexin Suspension

-Penyimpanan

Simpan ubat dibawah suhu 30°C. Pastikan bekas ubat ditutup rapat. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan mengambil Pharmaniaga Cephalexin Suspension selepas tarikh tamat tempoh seperti yang dicetak pada label. Simpan ubat ini dalam bekas yang tertutup rapat.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Pharmaniaga Cephalexin Suspension 125mg/5ml:

Sebelum pembancuhan: Serbuk berwarna putih ke putih pucat, bebas daripada kekotoran.

Selepas pembancuhan: Larutan suspensi berwarna oren yang likat, mengalir dengan bebas dan seragam, bebas daripada kekotoran.

Pharmaniaga Cephalexin Suspension 250mg/5ml:

Sebelum pembancuhan: Serbuk kuning muda dengan aroma buah-buahan.

Selepas pembancuhan: Larutan suspensi berwarna kuning muda yang manis dan likat dengan rasa buah-buahan.

-Bahan-bahan kandungan:

Pharmaniaga Cephalexin Suspension
125mg/5ml

-Bahan aktif: Setiap 5ml selepas
pembancuhan mengandungi 125mg
Cephalexin

-Bahan tidak aktif: *Tutti Frutti Flavour,*
Castor Sugar, Sunset Yellow, Sodium
Benzoate, Sodium Saccharin, Talcum,
Carboxymethylcellulose, Sodium
Dihydrogen Phosphate, Sodium
Bicarbonate

Pharmaniaga Cephalexin Suspension
250mg/5ml

-Bahan aktif: Setiap 5ml selepas
pembancuhan mengandungi 250mg
Cephalexin

-Bahan tidak aktif: *Talcum, Colloidal*
Silicon Dioxide, Carboxymethylcellulose
Sodium, Quinoline Yellow, Refined
Sugar, Tutti Frutti Flavour, Sodium
Phosphate Monobasic, Sodium
Saccharin, Sodium Bicarbonate

-Nombor MAL

Pharmaniaga Cephalexin Suspension
125mg/5ml: MAL19940383AZ

Pharmaniaga Cephalexin Suspension
250mg/5ml: MAL19973678AZ

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
No. 11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
No. 11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini:

21/12/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)160718/00196