

PHARMANIAGA ALLOPURINOL TABLET 300 MG

Allopurinol (300mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg
2. Bagaimana Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg

Ia digunakan untuk mencegah gout. Ini adalah penyakit di mana badan anda menghasilkan terlalu banyak bahan yang dipanggil asid urik. Asid urik ini berkumpul di dalam sendi dan tendon dalam bentuk kristal. Kristal-kristal ini boleh menyebabkan tindak balas keradangan. Keradangan ini menyebabkan kulit di sekitar kawasan sendi tertentu menjadi bengkak, dan sakit apabila disentuh walaupun sedikit. Anda juga boleh mengalami kesakitan teruk semasa mengerakkan sendi-sendi tersebut.

Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg digunakan untuk mencegah keadaan-keadaan lain di mana adanya pengumpulan asid urik dalam badan. Ini termasuklah batu karang dan beberapa jenis masalah buah pinggang yang lain dan ketika anda sedang membuat rawatan kanser.

Bagaimana Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg berfungsi
Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg berfungsi dengan memperlahankan sesetengah tindakbalas kimia dalam tubuh anda. Ini akan mengurangkan kepekatan asid urik dalam plasma darah dan air kencing sehingga ke satu tahap di

mana penyimpanan atau pengumpulan asid urik tadi akan terlarut atau dihalang dari terbentuk.

Dengan mengurangkan kepekatan asid urik dalam kedua-dua serum dan air kencing akan menghalang kejadian atau perkembangan gout.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- mempunyai reaksi alahan kepada Allopurinol atau mana-mana bahan dalam kandungan ubat ini yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- sedang mengalami serangan gout yang akut.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula menggunakan ubat ini, bincang dengan doktor atau ahli farmasi.

-Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda mempunyai masalah penyakit buah pinggang atau hati yang teruk. Anda mungkin diberi dos yang rendah.

Hamil dan menyusukan bayi

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi terlebih dahulu sekiranya anda sedang hamil atau merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengambil ubat-ubatan berikut:

- ubat pencair darah (*Warfarin* atau *Coumadin*)
- ubat mencegah atau menghalang aktiviti sistem imun (*Azothioprine*, *Mercaptopurine*)

- ubat membantu mengekalkan pH air kencing (*Ammonium chloride*, *ascorbic acid*, *potassium chloride*)
- antibiotik (*Amoxycillin*, *ampicillin*, *bacampicillin*, *hetacillin*)
- ubat merawat kanser (*Cyclophosphamide*)
- ubat untuk diabetes (*Chlorpropamide*)
- ubat kemoterapi (*Dacarbazine*)
- diuretik atau tablet untuk menyingkirkan air dalam badan (*Hydrochlorothiazide*)
- ubat rawatan gout (*Probenecid*)
- Xanthine atau alkaloid berkesan sebagai ubat perangsang ringan (*Aminophylline*, *theophylline*)

Ini bukan senarai lengkap. Sila rujuk kepada doktor anda untuk maklumat lanjut.

Cara menggunakan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg

-Berapa banyak harus diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada kandungan maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa:

Gout

Dos permulaan adalah 100 hingga 200 mg sekali sehari. Dos pengekalan adalah 200 hingga 300 mg sekali sehari.

Terapi penyakit neoplastik

Dos permulaan adalah 600 hingga 800 mg sekali sehari.

Batu karang

Dos permulaan adalah 100 hingga 200 mg sekali sehari.

Kanak-kanak (biasanya terhad kepada penyakit metabolik atau kanser):

Penyakit neoplastik

10 hingga 20 mg setiap kg berat badan setiap hari.

PHARMANIAGA ALLOPURINOL TABLET 300 MG

Allopurinol (300mg)

Pesakit dengan penyakit buah pinggang:

Doktor anda mungkin akan menyarankan dos yang lebih rendah.

-Bila perlu diambil

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada waktu biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat jika anda ataupun orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Kesan sampingan yang lanjut adalah tanda-tanda gejala oral.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan seperti ruam, demam, sakit tekak, atau kerengsaan mata, hentikan mengambil ubat ini SEGERA dan berunding dengan doktor / ahli farmasi anda.

Semua individu yang mengambil Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg disyorkan untuk mengambil air yang mencukupi untuk mengekalkan pengeluaran air kencing yang tidak kurang dari 2 liter sehari dan untuk memastikan air kencing menjadi neutral atau sedikit beralkali.

Ambil ubat sepertimana diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan. Doktor atau ahli farmasi anda akan memeriksa keadaan anda dan akan memberitahu sama ada anda perlu meneruskan atau tidak pengambilan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan berkongsi Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Individu perlu berhati-hati sebelum memandu, menggunakan jentera atau mengambil bahagian dalam aktiviti berbahaya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Allopurinol Tablet 300mg boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi bukan semua orang mengalaminya. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang paling biasa:

- Peningkatan sementara dalam kekerapan serangan gout akut
- Ruam kulit

Kesan sampingan yang serius:

- Ruam kulit yang merebak dan penyingkiran kulit disebabkan oleh gangguan penyakit kulit sedia ada
- *Stevens-Johnson syndrome* (SJS) (gangguan kulit dan membran mukus yang teruk)
- *Toxic epidermal necrolysis* (TEN) (gangguan dermatologi)
- *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic-Symptoms* (DRESS)

(reaksi yang jarang berlaku terhadap ubat tertentu)

Gejala hipersensitiviti lanjut termasuk:

- Demam
- Penyakit yang menjejaskan nodus limfa
- Pengurangan jumlah sel darah putih
- Peningkatan jumlah sel darah putih
- Sakit sendi
- Keradangan salur darah yang boleh menyebabkan kerosakan hati & buah pinggang
- Simptom masalah otak

Kesan sampingan yang teruk:

- Kesan hematologi seperti *thrombocytopenia* (kekurangan platelet dalam darah), *aplastic anaemia* (kekurangan semua jenis sel darah disebabkan kegagalan perkembangan sum-sum tulang), *agranulocytosis* (kekurangan granulosit menyebabkan mudah terdedah kepada jangkitan dan *haemolytic anaemia* (keadaan dimana sel darah merah dimusnahkan sebelum jangka hayatnya yang normal berakhir)

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Rasa yang abnormal
- Penyakit yang menjejaskan saraf
- Botak
- *Gynecomastia* (pembesaran payudara lelaki)
- Gangguan rasa
- Loya
- Muntah
- Sakit di bahagian perut
- Cirit-birit
- Sakit kepala
- Mengantuk
- Vertigo
- Gangguan visual

Jika anda mengalami kesan sampingan seperti ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata, berhenti mengambil ubat ini dengan SEGERA dan berunding dengan doktor/ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui

PHARMANIAGA ALLOPURINOL TABLET 300 MG

Allopurinol (300mg)

laman web nprra.moh.gov.my
[Consumers → Reporting Side Effects
to Medicines (ConSERF) or Vaccines
(AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Allopurinol Tablet 300mg

-Penyimpanan

- Simpan dibawah suhu 30°C.
- Lindungi daripada cahaya.

Jauhi semua ubat daripada kanak-
kanak.

Jangan mengambil Pharmaniaga
Allopurinol Tablet 300mg selepas
tarikh tamat tempoh seperti yang
dicetak pada label.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan
melalui air buangan atau sisa isi
rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi
anda mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak diperlukan
lagi. Langkah-langkah ini dapat
membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bulat dwicembung berwarna
kuning dengan garis pusat 10 mm,
dengan garisan belahan di satu sisi dan
permukaan rata di sisi yang lain.

-Bahan bahan kandungan

-Bahan aktif:

Setiap tablet mengandungi Allopurinol
300 mg

-Bahan tidak aktif:

*Isopropyl Alcohol, Purified Water,
Yellow Iron Oxide Lake, Potassium
Sorbate, Kollidon CL, Kollidon 30,
Magnesium Stearate, Talc, Lactose,
Quinoline Yellow Lake, Cornstarch.*

-Nombor MAL

MAL19972155AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
No.11A, Jalan P/1, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650, Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
No. 11A, Jalan P/1, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650, Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/10/2021

Nombor Siri NPRA(R4/1)201218/00378