

PHARMANIAGA TETRACYCLINE CAPSULE

Tetracycline Hydrochloride (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Tetracycline Capsule
2. Bagaimana Pharmaniaga Tetracycline Capsule berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Tetracycline Capsule
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Tetracycline Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Tetracycline Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Tetracycline Capsule

Ia mengandungi tetracycline yang tergolong kepada kumpulan ubat yang dipanggil antibiotik tetracycline. Ia juga dikenali sebagai antibiotik spektrum luas dan boleh digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan yang disebabkan oleh bakteria, ini termasuk:-

- jangkitan saluran pernafasan
- jangkitan saluran kencing
- penyakit kelamin seperti klamidia
- jangkitan rickettsial seperti jerawat
- Tetracycline juga boleh digunakan untuk merawat leptospirosis

Bagaimana Pharmaniaga Tetracycline Capsule berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan menghapuskan atau menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan atau yang menyebabkan pertumbuhan jerawat menjadi lebih teruk.

Pharmaniaga Tetracycline Capsule tidak akan berfungsi terhadap jangkitan virus seperti selsema.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule jika anda:-

- alah kepada Tetracycline Hydrochloride atau sebarang bahan-bahan lain yang terdapat dalam Pharmaniaga Tetracycline Capsule
- mempunyai masalah buah pinggang atau hati

Seperti ubat-ubatan lain, tetracyclines boleh membahayakan bayi yang sedang membesar atau disusukan. Ini mungkin termasuk kerosakan enamel dan memberi kesan perubahan warna kepada gigi kanak-kanak dan meningkatkan tekanan pada otak anak anda.

Dos tetracyclines yang tinggi juga boleh menyebabkan masalah hati di kalangan wanita hamil.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule, berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan Pharmaniaga Tetracycline Capsule kepada kanak-kanak di bawah lapan tahun dan kecuali diarahkan oleh doktor.

Seperti semua tetracyclines lain, Pharmaniaga Tetracycline Capsule boleh menyebabkan kerosakan enamel dan memberi kesan perubahan warna kepada gigi yang tumbuh.

Hamil dan menyusukan bayi

Jangan ambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin hamil.

Jangan ambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule jika anda sedang menyusukan bayi. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat jika anda sedang menyusukan anak.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:-

- mengalami atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan yang lain.

- merancang untuk hamil atau menyusukan bayi.
- telah dijadualkan untuk menjalani pembedahan anestetik.
- terdedah kepada cahaya matahari atau cahaya ultra-ungu.

Jika anda tidak pasti sama ada perkara-perkara di atas ada kaitan dengan anda, sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat Pharmaniaga Tetracycline Capsule.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Fungsi ubat-ubatan lain mungkin terjejas jika diambil bersama Pharmaniaga Tetracycline Capsule, termasuk:

- antikoagulan
- ubat seperti antacid atau ubat lain yang mengandungi aluminium, kalsium, besi, magnesium, garam zink, natrium bikarbonat.
- cholestyramine, colestipol
- pil perancang (pil untuk mengelakkan kehamilan).

Cara menggunakan Pharmaniaga Tetracycline Capsule

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, sila dapat bantuan daripada doktor atau ahli farmasi.

Pharmaniaga Tetracycline Capsule perlu diambil semasa perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam selepas makan bersama segelas air.

Jangkitan umum: 1 kapsul (250 mg) setiap 6 jam, anda boleh diberikan 2 kapsul (500 mg) pada mulanya.

PHARMANIAGA TETRACYCLINE CAPSULE

Tetracycline Hydrochloride (250mg)

Untuk jangkitan teruk doktor anda boleh meningkatkan dos anda kepada 500 mg (2 kapsul) setiap 6 jam.

Brucellosis: 2 kapsul (500 mg) empat kali sehari dengan streptomycin

Penyakit menular seksual: 2 kapsul (500 mg) empat kali sehari antara 5 dan 30 hari bergantung keadaan anda.

Jangkitan pada dubur yang disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis* : 500 mg empat kali sehari untuk sekurang-kurangnya 7 hari.

Dos untuk orang dewasa yang dihidkan : Sehingga 4 gram setiap hari.

Bayi dan kanak-kanak berumur 8 tahun: Penggunaan ubat ini adalah tidak digalakkan.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan Pharmaniaga Tetracycline Capsule untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda ataupun orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Tetracycline Capsule

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat sepertimana diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya perlu mendapat rawatan lain, pastikan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi dimaklumkan bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan memberi Pharmaniaga Tetracycline Capsule kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan mengendalikan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, lrtih atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Tetracycline Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi bukan semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati mana-mana yang berikut dan mereka bimbang anda:

- Jangkitan pada mulut - putih, rasa berbulu, tekak dan mulut berasa sakit
- Jangkitan pada faraj - sakit dan gatal pada faraj dan /atau

keputihan

- Loya
- Muntah
- hilang selera makan
- sakit perut
- lidah berwarna gelap
- hilang deria rasa
- perubahan warna gigi

Beritahu doktor dengan segera, atau pergi ke hospital yang terdekat jika anda mengalami mana-mana daripada yang berikut:

- ruam kulit / gatal-gatal
- kesukaran untuk bernafas
- demam
- sakit tekak
- lebam lebih kerap daripada biasa
- selaran matahari yang teruk
- kekuningan pada mata atau kulit (jaundis).

Beritahu doktor dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan yang berikut, terutamanya jika ia berlaku beberapa minggu selepas rawatan dengan Pharmaniaga Tetracycline Capsule dihentikan.

- kejang perut yang teruk atau kekejangan perut
- cirit-birit yang berair dan teruk, yang mungkin juga berdarah
- demam yang berkombinasi dengan satu atau kedua-dua perkara di atas.

Ini adalah kesan sampingan yang jarang berlaku tetapi serius. Anda mungkin mengalami keadaan yang serius yang menjejaskan fungsi usus anda. Oleh itu, anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Walaubagaimanapun, kesan sampingan ini adalah sangat jarang berlaku. Jangan mengambil sebarang ubat cirit-birit tanpa diperiksa oleh doktor terlebih dahulu.

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang serius seperti di atas, henti makan ubat dengan segera dan jumpa doktor serta merta. Anda mungkin perlu rawatan perubatan.

PHARMANIAGA TETRACYCLINE CAPSULE

Tetracycline Hydrochloride (250mg)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490 atau laman web nptra.moh.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) / Vaccine (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Tetracycline Capsule

-Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan mengambil Pharmaniaga Tetracycline Capsule selepas tarikh tamat tempoh seperti yang dicetak pada label.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Kapsul gelatin yang keras berwarna kuning / hitam, saiz '2', dengan tanda ciri.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap kapsul mengandungi Tetracycline Hydrochloride 250mg

- Bahan tidak aktif:

Lactose and Magnesium Stearate

-Nombor MAL

MAL19986510AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/02/2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)180219/00042