

PHARMANIAGA ACICLOVIR TABLET

Aciclovir (200mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Aciclovir Tablet
2. Bagaimana Pharmaniaga Aciclovir Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet
4. Cara pengambilan Pharmaniaga Aciclovir Tablet
5. Semasa mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Aciclovir Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Aciclovir Tablet

Pharmaniaga Aciclovir Tablet ialah sejenis ubat antiviral. Pharmaniaga Aciclovir Tablet digunakan untuk:

- merawat atau mencegah jangkitan *herpes genital* (jangkitan daripada hubungan seksual).
- merawat atau mencegah *herpes simplex* (jangkitan disebabkan oleh virus dipanggil *herpes* yang menyebabkan lepuh pada kulit, radang pada bahagian kemaluan, atau dalam mata)
- merawat atau mencegah penyakit cacar air (jangkitan virus *varicella*).
- merawat atau mencegah penyakit *herpes zooster* (kayap)

Bagaimana Pharmaniaga Aciclovir Tablet berfungsi

Pharmaniaga Aciclovir Tablet berfungsi dengan menghentikan pembiakan virus tersebut ke atas sel-sel yang dijangkiti.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet sekiranya:

- anda alah (hipersensitif) kepada aciclovir, atau mana-mana bahan-bahan yang terdapat dalam Pharmaniaga Aciclovir Tablet.

-Sebelum mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet

Sebelum mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet, maklumkan kepada doktor jika anda mempunyai sistem saraf yang tidak normal dan masalah buah pinggang.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru sahaja mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi terutama sekali:

- ubat - ubatan probenecid (untuk rawatan gout) kerana ubat ini boleh meningkatkan kepekatan Aciclovir and melambatkan proses penyingkiran dari buah pinggang sekaligus meningkatkan toksik.
- Ubat – ubatan nephrotoxic (ubat yang boleh memberi kesan sampingan pada buah pinggang) – penggunaan serentak Aciclovir bersama ubat ini boleh meningkatkan kegagalan buah pinggang terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah buah pinggang.

Cara pengambilan Pharmaniaga Aciclovir Tablet

-Berapa banyak harus diambil

Patuhi arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada kandungan maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dos biasa untuk orang dewasa

- **Jangkitan Herpes Genital**

- Rawatan awal - 200mg lima kali sehari selang setiap empat jam selama sepuluh hari

- **Herpes zoster (penyakit kayap)**

- Ambil 800mg, lima kali sehari selama tujuh hari.

- **Varicella (Cacar air)**

- Ambil 20mg setiap kg berat badan, sehingga 800mg setiap dos, lima kali sehari selama tujuh hari.

Untuk kanak-kanak

- **Varicella (Cacar air)**

- 20mg mengikut setiap kg berat badan, maksimum 800mg), empat kali sehari.
- Kanak-kanak berumur 6 tahun ke atas: 800mg, empat kali sehari.

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah buah pinggang kerana doktor anda mungkin perlu mengubah dos yang biasa diambil. Kadang-kadang, doktor menetapkan sukatan dos yang berbeza untuk individu yang mempunyai masalah buah pinggang. Dos yang harus anda ambil akan dicatat pada label bungkusan. Jika anda masih tidak pasti, tanya doktor anda atau ahli farmasi.

-Bila perlu diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Terus mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

PHARMANIAGA ACICLOVIR TABLET

Aciclovir (200mg, 400mg)

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk pengambilan dos yang seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada waktu biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan bantuan perubatan dengan segera.

Semasa mengambil Pharmaniaga Aciclovir Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Pharmaniaga Aciclovir Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda telah hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Pharmaniaga Aciclovir Tablet dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hamil dan menyusukan bayi
Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau sedang menyusukan bayi anda tidak boleh mengambil Pharmaniaga

Aciclovir Tablet tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu.

Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Aciclovir Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

- **Umum:** Demam, sakit kepala, peripheral oedema (bengkak disebabkan pengumpulan cecair) and anaphylaxis (alergik yang serius) yang jarang sekali berlaku.
- **Saraf:** Keliru, pening, halusinasi, paraesthesia (rasa panas pada tangan, lengan, kaki), keinginan untuk tidur dengan lama.
- **Penghadaman:** Muntah, Diarrhoea, ketidakselesaan pada perut, loya.
- **Darah dan limfa:** Leucopenia, lymphadenopathy (penyakit yang menjejaskan system limfa)
- **Otot:** Sakit otot
- **Kulit:** Ruam
- **Perkumuhan:** Peningkatan creatinine yang menandakan fungsi buah pingang terjejas.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas mengambil ubat ini kerana gejala tersebut boleh menjadi teruk.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang serius, atau jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-7883 5490, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)/ Vaccines (AEFI))

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pharmaniaga Aciclovir Tablet

-Penyimpanan

Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhunya sentiasa dibawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan simpan ubat didalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki atau tingkap.

Jangan meninggalkan ubat ini di dalam kereta semasa cuaca panas. Kepanasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melewati tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusannya.

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

PHARMANIAGA ACICLOVIR TABLET

Aciclovir (200mg, 400mg)

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
200mg:

Tablet kuning, berbentuk perisai, bertanda ikon Pharmaniaga pada salah satu permukaannya.

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
400mg:

Tablet merah jambu, berbentuk perisai, bertanda ikon Pharmaniaga pada salah satu permukaannya.

-Bahan-bahan kandungan:

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
200mg:

-Bahan aktif:

Aciclovir 200mg

-Bahan tidak aktif:

Quinoline Yellow Lake, Povidone 30, Croscarmellose Sodium, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Sodium Lauryl Sulphate dan Lactose Monohydrate.

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
400mg:

-Bahan aktif:

Aciclovir 400mg

-Bahan tidak aktif:

Carmoisine lake, Povidone 30, Croscarmellose Sodium, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Sodium Lauryl Sulphate, dan Lactose Monohydrate.

-Nombor MAL:

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
200mg:

MAL19987008AZ

Pharmaniaga Aciclovir Tablet
400mg:

MAL19987366AZ

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232)

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232)

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/02/2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)190219/00043