

PHARMANIAGA DERMAL C CREAM

Betamethasone / Clotrimazole (0.05% w/w / 1.00% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Dermal C Cream
2. Bagaimana Pharmaniaga Dermal C Cream berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Dermal C Cream
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Dermal C Cream
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Dermal C Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Dermal C Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Dermal C Cream

Pharmaniaga Dermal C Cream adalah ubat yang digunakan untuk merawat kulit yang terkena jangkitan fungus pada bahagian kaki, pangkal peha dan badan sepertimana yang telah dikenal pasti oleh doktor anda.

Pharmaniaga Dermal C Cream sepatutnya digunakan pada jangkitan fungus yang mempunyai tanda-tanda kemerahan dan /atau kegatalan. Beritahu kepada doktor anda sekiranya jangkitan fungus ini tidak mempunyai tanda-tanda tersebut.

Bagaimana Pharmaniaga Dermal C Cream berfungsi

Pharmaniaga Dermal C Cream adalah kombinasi agen antifungus (clotrimazole) dan kortikosteroid (betamethasone dipropionate). Clotrimazole bertindak ke atas fungus. Betamethasone dipropionate, sejenis kortikosteroid, digunakan untuk melegakan tanda kemerah-merahan, bengkak, kegatalan, melegakan tekanan darah rendah dan juga rasa tidak selesa yang lain akibat daripada jangkitan fungus ini.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Dermal C Cream

-Bila tidak boleh mengambil

- Pharmaniaga Dermal C Cream tidak boleh digunakan untuk masalah ruam lampin.
- Pharmaniaga Dermal C Cream tidak boleh digunakan dengan pembalut oklusif dan pelekat.
- Pharmaniaga Dermal C Cream tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun.
- Anda tidak boleh menggunakan ubat ini sekiranya anda sensitif atau alah terhadap clotrimazole dan betamethasone dipropionate, imidazole dan kortikosteroid yang lain, atau pada mana mana bahan yang terkandung di dalam ubat ini.

-Sebelum mengambil Pharmaniaga Dermal C Cream

Beritahu kepada doktor anda sekiranya anda sedang hamil atau sedang merancang untuk hamil sebelum menggunakan ubat ini. Anda juga perlu memaklumkan pada doktor anda sekiranya anda sedang menyusu bayi anda.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat yang mengandungi bahan kortikosteroid yang lain tidak boleh digunakan bersama dengan Pharmaniaga Dermal C Cream tanpa merujuk kepada doktor anda terlebih dahulu.

Cara menggunakan Pharmaniaga Dermal C Cream

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Sapukan ubat Pharmaniaga Dermal C Cream dengan lembut dengan secukupnya pada kawasan yang terlibat dan juga kawasan di sekeliling jangkitan sebanyak 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan malam. Rawatan selama 2

minggu disyorkan kepada jangkitan di pangkal peha atau bahagian badan, dan selama 4 minggu pada jangkitan bahagian kaki.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda ataupun orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

Apabila kortikosteroid diambil secara berlebihan, ia dapat menghalang bahagian sistem endokrin yang mengawal hormon dalam badan daripada berfungsi.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Dermal C Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat sepertimana diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya perlu mendapat rawatan lain, pastikan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi dimaklumkan bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga Dermal C Cream.

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya tiada tanda-tanda gejala untuk pulih selepas penggunaan selama 1 minggu pada jangkitan di pangkal peha

dan badan atau selepas 2 minggu pada jangkitan di bahagian kaki.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan membalut kawasan jangkitan selepas menggunakan ubat ini.

Jangan gunakan ubat ini untuk jangkitan mata.

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan memberi Pharmaniaga Dermal C Cream kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini perlu digunakan dalam masa 2 minggu sahaja apabila digunakan pada bahagian pangkal peha dan sapukan krim ini secara berhati-hati. Anda patut memberitahu doktor anda sekiranya masalah anda masih berpanjangan walaupun selepas 2 minggu penggunaannya.

Jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi, jangan gunakan Pharmaniaga Dermal C Cream tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu.

Anda perlu memakai pakaian yang longgar bagi mengelakkan bahagian yang disapu dengan Pharmaniaga Dermal C Cream ditutupi dengan ketat.

Pharmaniaga Dermal C Cream tidak mempengaruhi keupayaan memandu dan mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubat yang lain, Pharmaniaga Dermal C Cream juga boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan berikut atau kesankesan lain yang tidak tersenarai di bawah.

Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan dengan penggunaan ubat sapuan kortikosteroid: kegatalan, iritasi, kekeringan, jangkitan pada folikel rambut, peningkatan pertumbuhan rambut di bahagian tubuh, jerawat, pembuluh darah mudah rapuh, urat-urat kecil yang timbul di permukaan kulit, sensitisasi (tindakbalas setempat akibat penggunaan ubat ini secara berulang kali), perubahan warna kulit, tindakbalas alahan pada kulit, penipisan kulit, tanda regangan, kerapuhan kapilari (ekimosis) dan kabur penglihatan.

Pada kanak-kanak, kesan advers ubat yang dilaporkan dengan penggunaan ubat sapuan kortikosteroid termasuk pertumbuhan yang lambat, kenaikan berat badan yang perlahan, Sindrom Cushing (sejenis masalah hormon yang tidak stabil yang boleh menjadi lebih serius) dan juga tindakbalas pada kulit termasuk penipisan kulit dan juga tanda regangan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Dermal C Cream

-Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan mengambil Pharmaniaga Dermal C Cream selepas tarikh tamat tempoh seperti yang dinyatakan pada label.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim lembut bewarna putih.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Betamethasone (as dipropionate) 0.05% w/w dan Clotrimazole 1.00% w/w

-Bahan tidak aktif

White soft paraffin, cetostearyl alcohol, dimethicone, liquid paraffin, citric acid, chlorocresol, propylene glycol, sodium citrate, cetamacrogol dan purified water.

-Nombor MAL

MAL20001561AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
198001006232 (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
198001006232 (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/05/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/1)241018/00294