

PHARMANIAGA LORATADINE TABLET 10MG

Loratadine 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg
2. Bagaimana Pharmaniaga Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg
4. Cara pengambilan Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg
5. Semasa mengambil Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg

Loratadine Tablet 10mg digunakan untuk melegakan simptom berkaitan dengan alahan rinitis (keradangan membran mukus hidung) seperti bersin, mukus dari hidung (hidung berair) dan gatal, serta kegatalan dan kepedihan okular (mata), urtikaria (ruam gatal yang timbul pada kulit) kronik dan gangguan alahan dermatologi yang lain.

Bagaimana Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan cara menghalang kesan bahan yang dikenali sebagai histamin yang dihasilkan di dalam tubuh. Histamin boleh mengakibatkan gatal-gatal, bersin, hidung berair dan mata berair. Dalam sesetengah kes, bahan ini boleh mengakibatkan saluran udara ke paru-paru tertutup, dengan itu menyukarkan pernafasan.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil Loratadine Tablet 10mg sekiranya:

- Anda mengalami alahan (hipersensitif) kepada loratadine atau sebarang ramuan yang lain.
- Pesakit ialah kanak-kanak yang berusia bawah dua tahun.

-Sebelum mengambil

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat anda sekiranya:

- Anda mengalami masalah hati.
- Anda akan menjalani ujian kulit. Hentikan pengambilan ubat ini sekurang-kurangnya 48 jam sebelum menjalani ujian kulit

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, terutamanya:

- Ketoconazole (ubat anti kulat).
- Erythromycin (antibiotik).
- Cimetidine (ubat untuk merawat ulser perut)
- Alkohol

Cara pengambilan Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti. Arahan mereka mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada botol ubat anda, tanya ahli farmasi, jururawat, atau doktor untuk menerangkannya kepada anda.

-Berapa banyak harus diambil

Untuk pengambilan oral sahaja.

Dos:

- Dewasa dan kanak-kanak berusia lebih 12 tahun: Satu tablet sekali sehari.
- Kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahun dengan berat badan lebih dari 30kg: Satu tablet sekali sehari.
- Pesakit dengan masalah hati yang teruk: dos awal 5mg (setengah tablet) sekali sehari atau 10mg (satu tablet) selang sehari adalah disyorkan.

-Bila perlu diambil

Biasanya, ubat ini harus diambil sekali sahaja dalam setiap 24 jam. Kekalkan pengambilan setiap dos yang berikutnya pada waktu yang sama dengan dos pertama yang diambil. Doktor anda boleh mengubah aturan pengambilan dos menurut keadaan kesihatan anda. Sila ikut nasihat doktor anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Anda perlu hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengambil Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg berlebihan.

Antara tanda-tanda dos berlebihan ialah rasa mengantuk, denyut jantung pantas dan sakit kepala.

Semasa mengambil Pharmaniaga Loratadine Tablet 10mg

-Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil atau menyusui anak, rujuk kepada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

PHARMANIAGA LORATADINE TABLET 10MG

Loratadine 10mg

Pengambilan Loratadine Tablet 10mg tidak disarankan semasa hamil atau menyusui anak.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Anda tidak sepatutnya mengambil Loratadine Tablet 10mg semasa menyusui anak kerana Loratadine boleh meresap masuk ke dalam susu badan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Kebanyakan orang tidak akan mengantuk setelah mengambil Pharamniaga Loratadine Tablet 10mg. Walau bagaimanapun, anda tidak harus memandu atau menjalankan tugas yang memerlukan kemahiran, seperti menggunakan mesin, sehingga anda pasti bahawa anda tidak mengalami kesan mengantuk

Kesan-kesan Sampingan

Sebagaimana ubat-ubatan lain, Pharamniaga Loratadine Tablet 10mg boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak pada semua orang.

Beritahu doktor anda sekiranya anda menyedari terdapat sebarang kesan sampingan berikut atau menyedari terdapat sebarang kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Sistem saraf: lakrimasi berlebihan, peliuran berlebihan, kemerahan, kekebasan, mati pucuk, perpeluhan, dahaga, kekerapan kedipan kelopak mata (blefarospasme), pening, masalah bertutur (dysphonia), tegang otot (hipertonik), migrain, rasa panas pada kulit (parestesia), getetar, merasakan seolah-olah keadaan sekeliling berpusing (vertigo), sakit kepala, kegemuruh, letih, menagntuk (somnia), kejang.
- Badan secara keseluruhan: edema angioneuron (*Angioneurotic oedema*), lemah badan (astenia), sakit belakang, kabur penglihatan, sakit dada,

sakit telinga, sakit mata, demam, kejang kaki, lesu, meggeletar, bunyi dengung ditelinga (tinitus), jangkitan virus, penambahan berat badan.

- Jantung: tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, denyutan jantung yang tidak tetap, denyutan jantung yang pantas, pitam.
- Perut dan usus: masalah deria rasa, anoreksia, selera bertambah, rasa sakit atau jatuh sakit, sembelit, cirit-birit, ketidakcernaan, kembung, radang perut (gastritis), tersedu, radang mulut (stomatitis), sakit gigi, muntah, mulut kering, najis cair.
- Sistem rangka otot: sakit sendi, sakit otot.
- Psikiatrik: resah, hilang ingatan (amnesia), kerisauan, kebingungan, kurang libido, kemurungan, masalah penumpuan, sukar tidur (insomnia), kebengkengan, paroniria.
- Sistem reproduktif: sakit payudara, payudara membesar, sakit semasa haid, pendarahan berlebihan semasa haid, radang pada faraj.
- Sistem pernafasan: Inflamasi pada tiub bronkus, penyempitan bronkus (bronkospasma), batuk, kesukaran bernafas, pendarahan dihidung, batuk berdarah, keradangan pada larinks (*laryngitis*), kekeringan hidung, keradangan bahagian farinks. (*pharyngitis*), keradangan sinus (*sinusitis*), bersin.
- Kulit: radang kulit,, rambut kering, kulit kering, tindak balas alergi dari cahaya, kegatalan, ruam ungu pada kulit (*purpura*), gatal-gatal, kulit kemerahan,

ruam, keadaan botak atau keguguran rambut.

- Sistem imun: tindak balas alergi. (termasuk bengkak dan reaksi alahan yang mengancam nyawa)
- Sistem *urinary*: masalah kencing, perubahan warna kencing, masalah pengawalan kencing, susah kencing.
- Sistem *hepatobiliary*: fungsi hati yang tidak normal termasuk kekuningan, radang hati dan kerosakan sel hati.
- Sistem darah dan limfa: tahap platelet rendah

Sekiranya anda menyedari berlaku sebarang kesan sampingan, kesan sampingan makin teruk atau anda menyedari berlaku kesan sampingan yang tidak disenaraikan, sila maklumkan kepada doktor anda atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pharamniaga Loratadine Tablet 10mg

-Penyimpanan

Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhunya sentiasa dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan menyimpan ubat di dalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki atau tingkap.

Jangan meninggalkan ubat ini di dalam kereta semasa cuaca panas. Keparasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.

PHARMANIAGA LORATADINE TABLET 10MG

Loratadine 10mg

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melepasi tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusannya.

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bujur berbentuk dwicembung yang berwarna putih, dengan ikon Pharmaniaga pada satu sisi dan garisan belahan pada sisi sebelah lagi.

-Bahan bahan kandungan

-Bahan aktif :

Loratadine 10 mg

-Bahan tidak aktif:

Crosscarmellose Sodium,
Microcrystalline cellulose,
Lactose Monohydrate,
Magnesium Stearate

-Nombor MAL

MAL20014224AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198201002939),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198201002939),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

18/09/2024

Nombor siri

NPRA(R2/1)240913/1345