PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION 0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Cetirizine.
2. Bagaimana Pharmaniaga Cetirizine berfungsi.
3. Sebelum menggunakan PharmaniagaCetirizine.
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Cetirizine.
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Cetirizine.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Cetirizine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Cetirizine.

Pharmaniaga Cetirizine boleh digunakan:

-untuk melegakan simptom demam, alahan pernafasan (rinitis alahan bermusim) dan alahan seperti alahan terhadap habuk dan haiwan peliharaan (rinitis alahan malar), seperti bersin, gatal-gatal, hidung berair dan tersumbat, mata merah dan berair.

-untuk melegakan bengkak, kemerahan dan gatal pada kulit (simptom urtikaria idiopatik kronik, yang juga diketahui sebagai ruam netel kronik).

Bagaimana Pharmaniaga Cetirizine berfungsi.

Ubat ini berfungsi dengan cara menghalang kesan bahan yang bernama histamin yang dihasilkan di dalam tubuh. Histamin boleh mengakibatkan gatal-gatal, bersin, hidung berair dan mata berair**.** Dalam sesetengah kes, bahan ini boleh mengakibatkan saluran udara ke paru-paru tertutup,dengan itu menyukarkan pernafasan.

Sebelum menggunakan Pharmaniaga Cetirizine.

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Pharmaniaga Cetirizine:

-Sekiranya anda diketahui alah (hipersensitif) terhadap bahan aktif Pharmaniaga Cetirizine atau sebarang ramuan lain yang terkandung dalam ubat ini.

-Sekiranya anda diketahui alah (hipersensitif) kepada hydroxyzine (berkait rapat dengan bahan aktif ubat lain).

-Sebelum mula menggunakan Pharmaniaga Citirizine

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat anda.

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi. Pemberian serentak theophylline dan cetirizine boleh mengurangkan penyingkiran cetirizine daripada badan, dengan itu boleh mengakibatkan kemungkinan berlaku ketoksikan cetirizine.

Makanan didapati tidak menjejaskan penyerapan cetirizine dengan ketara. Begitu juga dengan pengambilan sebarang antihistamin, anda disyorkan agar mengelakkan daripada meminum arak semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Pharmaniaga Citirizine.

-Berapa banyak harus digunakan

Garis panduan ini harus dipatuhi melainkan doktor anda memberikan arahan berbeza kepadaanda mengenai cara pengambilan Pharmaniaga Cetirizine. Sila ikut semua arahan ini, jika tidak Pharmaniaga Cetirizine mungkin tidak memberikan kesan sepenuhnya.

Dewasa dan kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas: 10ml sehari sekali. 5ml larutan oral boleh dicadangkan jika ini mencapai kawalan simptom-simptom yang memuaskan.

Sekiranya anda merasakan bahawa kesan ubat Pharmaniaga Cetirizine tidak begitu mujarab atau pun terlalu kuat, sila rujuk kepada doktor anda.

-Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Dos yang ditetapkan amat bergantung pada indikasi penyakit yang anda alami. Sila ikut nasihat doktor anda dan kekalkan pengambilan mengikut panduan dos seperti yang disarankan oleh doktor. Jangan hentikan pengambilan Pharmaniaga Cetirizine tanpa merujuk kepada doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil Pharmaniaga Cetirizine, makan ubat tersebut sesegera yang boleh. Ambil dos anda yang berikutnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos berganda sebagai ganti dos yang anda terlupa ambil.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda fikir bahawa anda terlebih ambil dos Pharmaniaga Cetirizine, sila maklumkan kepada doktor anda. Doktor anda akan memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil, jika ada. Setelah terlebih ambil ubat, anda mungkin berasa kegelisahan dan mengalami kerengsaan pada peringkat awalnya, kemudian diikuti oleh rasa mengantuk. Penawar yang khusus

PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION 0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg

bagi cetirizine belum lagi diketahui. Rawatan yang diberikan mengikut simptom dan sebagai sokongan sahaja.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Cetirizine.

-Perkara yang perlu dilakukan

Dapatkan nasihat daripada doktor anda sebelum pengambilan sebarang ubat. Sebagaimana juga dengan ubat lain, penggunaan Pharmaniaga Cetirizine harus dielakkan oleh wanita hamil. Penggunaan ubat secara tidak sengaja oleh wanita hamil tidak seharusnya memberi sebarang kesan buruk kepada janin. Namun begitu, pemberian ubat ini harus dihentikan.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan.

Anda tidak sepatutnya mengambil Pharmaniaga Cetirizine semasa menyusui bayi kerana cetirizine boleh meresap masuk ke dalam susu badan.

-Perkara yang perlu dberi perhatian

Sekiranya anda berhasrat untuk memandu, mengendalikan mesin atau melakukan tugas lain yang memerlukan perhatian penuh, anda tidak harus mengambil lebih daripada dos yang disarankan dan anda harus mengawasi dengan teliti tindak balas tubuh anda terhadap ubat tersebut.

Sekiranya anda pesakit yang sensitif, anda akan dapati bahawa penggunaan serentak arak atau agen penenang depresi boleh menjejaskan lagi perhatian anda dan keupayaan anda untuk bertindak balas.

Kesan-kesan sampingan.

Sebagaimana ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Cetirizine boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak pada semua orang.

Kesan-kesan sampingan jarang-jarang sekali berlaku:

- Denyutan jantung yang pantas
- Gatal dan ruam, edema (bengkak menyeluruh disebabkan oleh pengekalan air)
- Hipersensitif
- Keputusan ujian fungsi hati yang tidak normal
- Gatal-gatal
- Peningkatan berat badan
- Sawan

Kesan-kesan sampingan sangat jarang-jarang sekali berlaku:

- Penglihatan kabur
- Kesukaran pemfokusan
- Putaran mata yang tidak terkawal
- Mulut kering
- Kencing tidur, sakit dan/atau kesukaran membuang air
- Reaksi alahan yang serius yang menyebabkan bengkak pada muka atau tengkuk
- Ruam kecil yang bengkak and kemerahan pada kulit
- Pergerakan luar kawalan anggota badan
- Gangguan deria rasa dalam mulut
- Pengsan
- Geletar (pergerakan tubuh yang tidak terkawal)
- Pergerakan luar kawalan anggota badan

Kesan-kesan sampingan tidak lazim berlaku:

- Cirit-birit
- Gatal dan ruam
- Rasa lemah atau tidak sihat secara amnya,
- Keagresifan, kekeliruan, kemurungan, halusinasi (mendengar atau melihat benda), tidak dapat tidur
- Rasa lemah
- Mengantuk
- Sakit kepala
- Rasa gelisah
- Kesemutan atau berasa kebas pada tangan atau kaki

Sekiranya anda fikir anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak disebutkan dalam risalah ini, sila maklumkan kepada doktor anda atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)or Vaccines (AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Cetirizine.

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30ºC.
Lindungi daripada cahaya.
Pastikan bekas ditutup rapat.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut.

-Rupa dan warna produk

Larutan jernih tanpa warna.

-Bahan-bahan kandungan:

Pharmaniaga Cetirizine Oral Solution 0.1% w/v mengandungi *Cetirizine Hydrochloride 1.0 mg, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Acetate, Sucrose, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Grape Flavour, Purified Water, Citric Acid, Banana Flavour.*

-Nombor MAL:

MAL20020881AZ

Pengilang:

InspiraPharma Sdn. Bhd.
(200401023395),
Lot 24 & 25, Jalan 8, Kawasan Perusahaan Bakar Arang,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman, Malaysia.

PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION 0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg

Pemegang Pendaftaran Produk:
Pharmaniaga Manufacturing Berhad (198001006232),
No.11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:
23/06/2026

Nombor siri
NPRA(R2/1)260612/00078