

PHARMANIAGA CETIRIZINE TABLET 10MG

PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION

0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Cetirizine
2. Bagaimana Pharmaniaga Cetirizine berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Cetirizine
4. Cara mengambil Pharmaniaga Cetirizine
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Cetirizine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan Pharmaniaga Cetirizine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Cetirizine

Pharmaniaga Cetirizine boleh digunakan:

- untuk melegakan simptom demam alahan pernafasan (rinitis alahan bermusim) dan alahan seperti alahan terhadap habuk dan haiwan kesayangan (rinitis alahan malar), seperti bersin, gatal-gatal, hidung berair dan tersumbat, mata merah dan berair.
- untuk melegakan bengkak, kemerahan dan gatal pada kulit (simptom urtikaria idiopatik kronik, yang juga diketahui sebagai ruam netel kronik).

Bagaimana Pharmaniaga Cetirizine berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan cara menghalang kesan bahan yang bernama histamin yang dihasilkan di dalam tubuh. Histamin boleh mengakibatkan gatal-gatal, bersin, hidung berair dan mata berair. Dalam sesetengah kes, bahan ini boleh mengakibatkan saluran

udara ke paru-paru tertutup, dengan itu menyukarkan pernafasan.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Cetirizine

- Bila tidak boleh mengambil
- Jangan ambil Pharmaniaga Cetirizine:
- • sekiranya anda diketahui alah (hipersensitif) terhadap bahan aktif Pharmaniaga Cetirizine atau sebarang ramuan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- • sekiranya anda diketahui alah (hipersensitif) kepada hydroxyzine (berkait rapat dengan bahan aktif ubat lain).

-Sebelum mula mengambil

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat anda.

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusui bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi. Pemberian serentak theophylline dan cetirizine boleh mengurangkan penyingkiran cetirizine daripada badan, dengan itu boleh mengakibatkan kemungkinan berlaku ketoksikan cetirizine. Makanan didapati tidak menjejaskan penyerapan cetirizine dengan ketara. Begitu juga dengan pengambilan sebarang antihistamin, anda disyorkan agar mengelakkan daripada meminum arak semasa mengambil ubat ini.

Cara mengambil Pharmaniaga Cetirizine

Berapa banyak perlu diambil

Garis panduan ini harus dipatuhi melainkan doktor anda memberikan arahan berbeza kepada anda mengenai cara pengambilan Pharmaniaga Cetirizine. Sila ikut semua arahan ini, jika tidak Pharmaniaga Cetirizine mungkin tidak memberikan kesan sepenuhnya

Pharmaniaga Cetirizine Tablet 10 mg

Dewasa: 1 tablet sekali sehari.

Pharmaniaga Cetirizine Oral Solution 0.1% w/v

Kanak-kanak berusia 6 tahun ke atas: 10mL, sama ada 5mL dua kali sehari atau 10mL sekali sehari.

Sekiranya anda merasakan bahawa kesan ubat Pharmaniaga Cetirizine tidak begitu mujarab atau pun terlalu kuat, sila rujuk kepada doktor anda.

Bila perlu diambil

Ubat ini harus diambil sekali sahaja dalam setiap 24 jam. Kekalkan pengambilan setiap dos yang berikutnya pada waktu yang sama dengan dos pertama yang diambil. Doktor anda boleh mengubah aturan pengambilan dos menurut keadaan kesihatan anda. Sila ikut nasihat doktor anda.

Berapa lama perlu diambil

Dos yang ditetapkan amat bergantung pada indikasi penyakit yang anda alami. Sila ikut nasihat doktor anda dan kekalkan pengambilan mengikut panduan dos seperti yang disarankan oleh doktor. Jangan hentikan pengambilan Pharmaniaga Cetirizine tanpa merujuk kepada

PHARMANIAGA CETIRIZINE TABLET 10MG

PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION

0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg
dokter anda.

-Jika terlupa mengambil

Sekiranya anda terlupa mengambil Pharmaniaga Cetirizine, makan ubat tersebut sesegera yang boleh. Ambil dos anda yang berikutnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos berganda sebagai ganti dos yang anda terlupa ambil.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda fikir bahawa anda terlebih ambil dos Pharmaniaga Cetirizine, sila maklumkan kepada doktor anda. Doktor anda akan memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil, jika ada. Setelah terlebih ambil ubat, anda mungkin berasa kegelisahan dan mengalami kerengsaan pada peringkat awalnya, kemudian diikuti oleh rasa mengantuk. Penawar yang khusus bagi cetirizine belum lagi diketahui. Rawatan yang diberikan mengikut simptom dan sebagai sokongan sahaja.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Cetirizine

Perkara yang perlu dilakukan
Dapatkan nasihat daripada doktor anda sebelum pengambilan sebarang ubat. Sebagaimana juga dengan ubat lain, penggunaan Pharmaniaga Cetirizine harus dielakkan oleh wanita hamil. Penggunaan ubat secara tidak sengaja oleh wanita hamil tidak seharusnya memberi sebarang kesan buruk kepada janin. Namun begitu, pemberian ubat ini harus dihentikan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Anda tidak sepatutnya mengambil Pharmaniaga Cetirizine semasa menyusui bayi kerana cetirizine boleh meresap masuk ke dalam susu badan.

-Perkara yang perlu diawasi

Sekiranya anda berhasrat untuk memandu, mengendalikan mesin atau melakukan tugas lain yang memerlukan perhatian penuh, anda tidak harus mengambil lebih daripada dos yang disarankan dan anda harus mengawasi dengan teliti tindak balas tubuh anda terhadap ubat tersebut.

Sekiranya anda pesakit yang sensitif, anda akan dapati bahawa penggunaan serentak arak atau agen penenang depresi boleh menjejaskan lagi perhatian anda dan keupayaan anda untuk bertindak balas.

Kesan-kesan sampingan

Sebagaimana ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Cetirizine boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak pada semua orang. Pernah dilaporkan berlaku kesan sampingan ringan dan sementara seperti sakit kepala, pening, mengantuk, fikiran terganggu, mulut kering dan ketidakselesaan gastrousus. Keadaan seperti khayal setelah pengambilan Pharmaniaga Cetirizine juga pernah dilaporkan berlaku.

Sekiranya anda fikir anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak disebutkan dalam risalah ini, sila maklumkan kepada doktor anda atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adverse ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccine (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Cetirizine

-Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melewati tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusnya. Simpan di tempat yang bersuhu Bawah 30°C. Ubat ini tidak memerlukan sebarang keadaan penyimpanan khusus yang lain.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Pharmaniaga Cetirizine Tablet 10 mg

Tablet putih berbentuk bujur yang bersalut, rata pada satu sisi dan garisan belahan pada sisi sebelah lagi.

Pharmaniaga Cetirizine Oral Solution 0.1% w/v

Larutan jernih tanpa warna.

-Bahan-bahan kandungan:

Pharmaniaga Cetirizine Tablet 10 mg

mengandungi Cetirizine Dihydrochloride 10 mg, Opadry White, Magnesium Stearate, Povidone 30, Starch, Lactose Monohydrate.

Pharmaniaga Cetirizine Oral

Solution 0.1% w/v mengandungi Cetirizine Hydrochloride 1.0 mg, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Acetate, Sucrose, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Grape

PHARMANIAGA CETIRIZINE TABLET 10MG

PHARMANIAGA CETIRIZINE ORAL SOLUTION

0.1% W/V

Cetirizine Dihydrochloride 10mg/ Cetirizine Hydrochloride 1.0mg

Flavour, Purified Water, Citric

Acid, Banana Flavour.

-Nombor MAL:

Pharmaniaga Cetirizine Tablet

10mg

MAL20020882AZ

Pharmaniaga Cetirizine Oral

Solution 0.1 % w/v

MAL20020881AZ

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad

(198001006232),

No. 11A, Jalan P/1,

Kawasan Perusahaan Bangi,

43650 Bandar Baru Bangi,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad

(198001006232),

No. 11A, Jalan P/1,

Kawasan Perusahaan Bangi,

43650 Bandar Baru Bangi,

Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

25/05/2022

Nombor siri

NPRA (R2/1)220107/820