

XYLID TABLET

Cefuroxime Axetil (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Xylid Tablet
2. Bagaimana Xylid Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Xylid Tablet
4. Cara pengambilan Xylid Tablet
5. Semasa mengambil Xylid Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Xylid Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Xylid Tablet

Xylid Tablet ialah ubat antibiotik yang digunakan pada orang dewasa dan kanak-kanak. Ia digunakan bagi merawat jangkitan yang disebabkan oleh:

Jangkitan sistem pernafasan atas seperti:

- Jangkitan pada telinga, hidung and tekak seperti sinus, tonsil and keradangan pada bahagian belakang tekak. (pharyngitis).

Jangkitan sistem pernafasan bawah seperti:

- Pneumonia (jangkitan paru-paru)
- Bronchitis (keradangan pada paru-paru)

Jangkitan saluran kencing seperti:

- Pyelonephritis (jangkitan pada buah pinggang)
- Cyst
- Urethritis (jangkitan pada pundi kencing)

Jangkitan pada kulit seperti:

- Jangkitan pada kulit atau tisu lembut yang akan menyebabkan jangkitan semakin melarat-larat.

Jangkitan seksual & keradangan serviks.

Bagaimana Xylid Tablet berfungsi

Xylid Tablet berfungsi dengan cara membunuh bakteria penyebab jangkitan atau menghentikan pertumbuhan bakteria tersebut.

Sebelum mengambil Xylid Tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Xylid Tablet sekiranya:

- anda alah kepada cephalosporin, antibiotik penisilin atau pada bahan-bahan yang terkandung di dalam Xylid Tablet.

Sekiranya anda tidak pasti, sila bertemu dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil Xylid Tablet.

-Sebelum mula mengambil

Sebelum mengambil Xylid Tablet, doktor anda perlu tahu sekiranya anda ada atau pernah mengalami keadaan berikut:

- hipersensitif terhadap penisilin
- masalah buah pinggang
- sejarah penyakit berkaitan salur makanan / pencernaan (gastrointestinal).
- hamil atau menyusukan bayi

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda sedang mengambil atau pernah mengambil ubat-ubat yang lain dalam masa yang terdekat. Ini termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dan juga dari persediaan herba.

Ini kerana Xylid Tablet boleh memberi kesan pada cara sesetengah ubat lain berfungsi. Pada masa sama, ubat-ubat lain juga boleh memberi kesan pada cara Xylid Tablet berfungsi.

Perhatian haruslah diberikan sekiranya anda mengambil Xylid Tablet dan menerima rawatan ubat frusemide dalam masa yang sama. Ini kerana kombinasi pengambilan kedua-dua ubat ni secara serentak boleh mengganggu fungsi buah pinggang.

Cara pengambilan Xylid Tablet

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa mengambil Xylid Tablet sepertimana yang telah diarahkan oleh doktor. Anda perlu merujuk pada doktor atau ahli farmasi sekiranya tidak pasti. Xylid Tablet perlu diambil selepas waktu makan. Jangan hancurkan atau belah ubat ini.

Dewasa:

250 mg hingga 500 mg dua kali sehari bergantung kepada keterukan dan jenis jangkitan kecuali untuk pesakit gonorea yang tidak rumit adalah dos tunggal 1 g.

Kanak-kanak:

Dos yang biasa diberikan ialah 125mg atau 250mg sebanyak 2 kali sehari mengikut tahap sesuatu jangkitan tersebut.

Xylid Tablet tidak disarankan untuk kanak-kanak berumur 3 bulan ke bawah kerana keselamatan dan keberkesanannya tidak diketahui bagi kumpulan ini.

Jika anda mengalami masalah buah pinggang, doktor anda mungkin menukar dos anda.

-Bila perlu diambil

Jarakkan waktu pengambilan ubat secara sama rata.

Berjumpa doktor anda sekiranya masih berasa tidak sihat selepas menggunakan ubat ini

-Berapa lama perlu diambil

Tempoh rawatan yang biasa ialah selama 7 hari kecuali dinyatakan sebaliknya oleh doktor anda.

Sentiasa menghabiskan ubat walaupun anda sudah berasa sihat.

Berjumpa dengan doktor anda semula jika jangkitan anda semakin teruk atau tidak berkurang dalam masa beberapa hari atau terdapat jangkitan baru.

XYLID TABLET

Cefuroxime Axetil (250mg)

-Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil Xylid Tablet, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Ambil dos yang seterusnya mengikut waktu yang sepatutnya. Jangan menggandakan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda terlalu banyak mengambil Xylid Tablet, tanda-tanda seperti sawan mungkin berlaku. Beritahu doktor anda dan hubungi jabatan kecemasan dan kecemasan di hospital yang terdekat dengan segera.

Semasa mengambil Xylid Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya mendapati degupan jantung yang tidak normal, atau rasa pening dan pitam atau rasa sakit otot ketika mengambil Xylid Tablet.

Beritahu doktor jika anda mengalami cirit-birit semasa mengambil Xylid Tablet. Jangan mengambil sebarang ubat untuk melegakan cirit-birit anda sebelum berbincang dengan doktor. Jika cirit-birit berterusan, maklumkan kepada doktor.

Sentiasa habiskan ubat ini walaupun anda sudah berasa sihat. Jika jangkitan semakin teruk atau tidak bertambah baik selepas menggunakannya selama beberapa hari, sila berjumpa dengan doktor anda semula.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jika anda berhenti menggunakan Xylid Tablet terlalu cepat, jangkitan mungkin boleh kembali. Ambil ubat ini mengikut tempoh rawatan yang ditetapkan walaupun anda sudah mula berasa sihat.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda sekiranya:

- mengalami cirit-birit yang teruk ketika atau selepas rawatan dengan Xylid Tablet.
- sedang menggunakan antibiotik untuk jangkitan yang lama. Ini kerana ia boleh menggalakkan pertumbuhan cepat organisma tidak berpengaruh.

Penggunaan Xylid Tablet perlu dihadkan kepada jangkitan yang serius atau teruk.

Hamil dan menyusukan bayi

Rujuk doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil apa-apa ubat sekiranya anda merasakan diri anda hamil atau sedang hamil atau sedang menyusukan bayi.

Memandu dan pengendalian mesin

Xylid Tablet boleh mengakibatkan rasa pening. Jika anda berasa terganggu, elakkan daripada memandu, mengendalikan mesin atau menjalani sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan risiko pada anda atau orang lain.

Menjalani ujian air kencing atau ujian darah

Maklumkan pada doktor atau jururawat bahawa anda sedang mengambil Xylid Tablet jika harus menjalani ujian urin (ujian glukosa dalam urin) atau ujian darah untuk fungsi hati atau Coombs atau ujian resus (ujian sel darah merah). Ini kerana Xylid Tablet boleh mempengaruhi keputusan ujian-ujian tersebut.

Kesan-kesan sampingan

Xylid Tablet boleh menyebabkan allergik teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Xylid Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala seperti berikut:

- Kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Seperti ubat-ubat yang lain, Xylid Tablet juga boleh memberi kesan sampingan walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami tanda-tanda yang dinyatakan di bawah setelah menggunakan ubat ini.

- tindak balas allergik yang serius (jarang sekali berlaku) seperti sesak nafas.
- Ketidakselesaan pada perut seperti cirit birit, loya dan muntah.
- Sakit kepala
- Sakit kuning tetapi jarang sekali berlaku.
- Penyakit darah tetapi jarang berlaku seperti *thrombocytopenia* and *leucopenia*.
- loya

Jika mana-mana kesan sampingan ini bertambah teruk, atau jika anda mendapati terdapat kesan-kesan sampingan selain daripada yang dinyatakan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my

(Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)/ Vaccines (AEFI))

Cara penyimpanan dan pelupusan Xylid Tablet

-Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan menggunakan ubat yang telah tamat tempoh seperti yang telah dinyatakan pada bungkusan ubat.

Simpan pada suhu 30°C.

Lindungi dari cahaya.

XYLID TABLET

Cefuroxime Axetil (250mg)

Jangan gunakan Xylid Tablet sekiranya ubat ini telah pecah atau terdapat tanda-tanda kerosakan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih putih dan berbentuk bujur.

-Bahan-bahan kandungan:

-Bahan aktif:

Cefuroxime 250 mg (sebagai Cefuroxime Axetil).

-Bahan-bahan tidak aktif:

Colloidal Silicone Dioxide, Croscarmellose Sodium, Opadry White, Microcrystalline Cellulose, dan Magnesium Stearate.

Nombor MAL:

MAL 05101678AZ

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(198001006232),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/01/2023

Nombor Siri

NPRA(R4/1)301018/00319