

PHARMANIAGA CAPTOPRIL TABLET 25MG

Captopril 25mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Captopril Tablet
2. Bagaimana Pharmaniaga Captopril Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet
4. Cara pengambilan Pharmaniaga Captopril Tablet
5. Semasa pengambilan Pharmaniaga Captopril Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pharmaniaga Captopril Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Pharmaniaga Captopril Tablet

Captopril tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil Perencat *Angiotensin Converting Enzyme (ACE)*.

Captopril digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan sesetengah masalah jantung. Jika tekanan darah tidak dikawal, ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung atau strok. *Captopril* bertindak dengan mengurangkan tekanan darah seterusnya mengurangkan risiko ini.

Captopril juga membantu mereka yang mempunyai masalah jantung yang tidak dapat mengepam seperti biasa. Keadaan ini dikenali sebagai kegagalan jantung.

Captopril juga digunakan untuk pesakit yang baru menghidap serangan jantung. Serangan jantung berlaku apabila saluran darah yang membekalkan darah ke jantung menjadi tersumbat. Ini bermakna jantung tidak menerima oksigen yang diperlukan dan otot-otot jantung menjadi rosak.

Sebagai tambahan, *Captopril* boleh juga digunakan untuk merawat masalah buah pinggang bagi pesakit yang ada kencing manis.

Bagaimana Pharmaniaga Captopril Tablet berfungsi

Perencat *ACE* berfungsi dengan membantu mengembangkan salur darah di mana ini akan memudahkan jantung anda untuk mengepam darah melaluinya.

Sebelum mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet sekiranya anda:

- mengalami alahan (hipersensitif) kepada *Captopril*, mana-mana bahan lain dalam kandungan ubat ini atau Perencat *ACE* yang lain
- sekiranya anda pernah mengalami reaksi termasuklah bengkak tangan, bibir, muka atau lidah di mana puncanya tidak diketahui
- sekiranya anda hamil melebihi 3 bulan (elakkan pengambilan Pharmaniaga Captopril Tablet pada awal

kehamilan), merancang untuk hamil atau menyusukan bayi.

Sekiranya anda mengalami perkara di atas dan tidak tahu untuk berbuat apa, berbincanglah dengan doktor anda.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- sekiranya anda mengalami penyakit buah pinggang
- sekiranya anda mengalami penyakit hati
- sekiranya anda menjalani dialisis
- sekiranya anda mengalami penyakit jantung terutamanya yang berkaitan dengan masalah injap jantung
- Sekiranya anda menerima rawatan *immuno-suppressant*
- Sekiranya anda baru mengalami cirit-birit dan muntah yang melampau
- Sekiranya anda ada masalah kencing manis
- Sekiranya anda menghidapi penyakit yang berkaitan dengan vaskular kolagen
- Sekiranya anda mengalami jangkitan seperti sakit tekak atau demam
- Sekiranya anda akan menjalani pembedahan gigi atau pembedahan major yang melibatkan ubat bius.

Kehamilan

Beritahulah doktor anda sekiranya anda hamil atau mungkin hamil. Biasanya doktor anda akan menasihatkan untuk berhenti mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet sebelum anda hamil

atau sebaik sahaja anda mengetahui yang anda hamil, doktor akan menukarkan kepada ubat lain selain daripada *Captopril*. *Captopril* patut diambil oleh perempuan hamil sekiranya manfaatnya jelas mengatasi risiko.

Menyusukan bayi

Beritahulah doktor anda sekiranya anda menyusukan bayi atau baru mula menyusukan bayi. Doktor anda akan berbincang dan menasihatkan anda tentang risiko dan faedah mengambil *Pharmaniaga Captopril Tablet* ketika menyusukan bayi berbanding rawatan lain.

Bertanyalah kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum memulakan pengambilan sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahulah doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda ada mengambil ubat-ubatan lain termasuklah ubat-ubatan yang dibeli tanpa preskripsi. Adalah amat penting untuk anda memberitahu doktor anda sekiranya anda mengambil ubat-ubatan berikut:

- Diuretik (ubat yang meningkatkan aliran kencing)
- Makanan tambahan kalium atau garam gantikan yang mengandungi kalium (seperti *triamterene*, *amiloride* dan *spironolactone*)
- Ubat-ubatan untuk mengembangkan salur darah
- Ubat tahan sakit *non-steroidal anti-inflammatory* (NSAIDS) (cth. *indomethacin*)

- Ubat-ubatan untuk merawat tekanan darah tinggi (cth. *beta-blocker* atau *calcium channel blocker*)
- Sebarang ubat-ubatan yang digunakan semasa dan selepas serangan jantung.

Cara pengambilan Pharmaniaga Captopril Tablet

Pharmaniaga Captopril Tablet perlu diambil sebagaimana yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda haruslah merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Berapa banyak perlu diambil

Telan tablet ini dengan segelas air.

Dos yang biasa:

Untuk rawatan tekanan darah tinggi

Dos permulaan yang biasa adalah 50mg sekali sehari atau 25mg dua kali sehari. Doktor anda akan meningkatkan dos anda secara berkala sehingga 100mg sehari dalam satu atau dua dos terbahagi. Anda mungkin juga diberi ubat lain untuk mengurangkan tekanan darah anda.

Untuk rawatan kegagalan jantung

Dos permulaan yang biasa adalah 6.25 – 12.5mg tiga kali sehari. Doktor anda akan meningkatkan dos secara berkala tidak melebihi 450mg sehari.

Selepas serangan jantung.

Dos permulaan yang biasa adalah 6.25mg, di mana doktor akan meningkatkan dos ini sehingga 150mg sehari.

Untuk rawatan pesakit diabetes dengan penyakit buah pinggang.

Dos yang biasa adalah 75 - 100mg sehari dalam dos terbahagi.

Kadang-kadang doktor akan memberikan dos yang lain dari yang tertulis di atas dan sekiranya ini berlaku pada anda, berbincanglah dengan doktor anda.

Waktu pengambilan

Anda seharusnya mengambil *Pharmaniaga Captopril Tablet* ini pada masa yang sama setiap hari. Ia perlu diambil sebelum makan.

Tempoh pengambilan

Teruskanlah mengambil ubat ini selama mana diarahkan doktor.

Ubat ini membantu mengawal keadaan anda tetapi tidak menyembuhkan. Amatlah penting untuk anda meneruskan pengambilannya walaupun anda sudah berasa sihat.

Jika terlupa mengambil

Ambil dos ini dengan segera sebaik sahaja anda teringat, dan teruskan mengambil seperti biasa.

Bagaimanapun, jika sudah menghampiri waktu untuk dos berikutnya, biarkan sahaja dos yang terlupa tadi dan teruskan dengan dos yang berikutnya mengikut jadual pengambilan ubat.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa dimakan. Ini boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesan sampingan yang tidak diinginkan.

Sekiranya anda tidak tahu untuk berbuat apa, tanyalah doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda mengalami masalah mengingati masa pengambilan ubat anda, sila rujuk kepada ahli farmasi anda untuk mengatasi masalah ini.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda atau sesiapa sahaja telah mengambil ubat ini secara berlebihan, segeralah hubungi doktor anda atau pergi ke jabatan kecemasan hospital berdekatan. Sentiasa bawa lebihan ubat bersama-sama dengan risalah dan juga kotak ubat ini bagi memudahkan doktor mengenalpasti jenis ubat ini.

Semasa pengambilan Pharmaniaga Captopril Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda hendak memulakan rawatan ubat yang baru, sentiasalah mengingatkan doktor anda bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet.

Beritahulah mana-mana doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini. Sekiranya anda akan menjalani pembedahan (walaupun pembedahan gigi) yang memerlukan anestesia umum, beritahulah pakar bedah, doktor gigi atau pakar bius tersebut yang anda sedang mengambil ubat ini.

Tekanan darah anda boleh rendah dengan serta-merta semasa pembedahan.

Segeralah beritahu doktor anda sekiranya anda berasa pening atau kepala berasa ringan selepas mengambil dos pertama Pharmaniaga Captopril Tablet atau apabila dos anda dinaikkan.

Ini penting terutamanya jika anda mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet untuk rawatan kegagalan jantung.

Pastikan anda sentiasa minum air yang mencukupi semasa bersenam atau semasa cuaca panas apabila anda mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet, terutama jika anda banyak berpeluh.

Jika anda tidak minum air yang mencukupi, anda berkemungkinan boleh pitam, pening dan rasa tidak sihat. Ini disebabkan tekanan darah anda menurun dengan mendadak.

Jika anda berterusan berasa tidak sihat, beritahu doktor anda.

Sekiranya anda mengalami muntah atau cirit-birit yang berlebihan semasa mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet, beritahu doktor anda. Anda mungkin kehilangan air dan garam dalam badan dan ini boleh menyebabkan tekanan darah anda menurun dengan banyaknya.

Sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini, segera maklumkan kepada doktor anda.

Sekiranya anda akan menjalani ujian darah, beritahulah doktor anda yang anda sedang mengambil ubat ini. Ia mungkin boleh mengganggu keputusan sesetengah ujian.

Penuhi kesemua temujanji dengan doktor anda supaya perkembangan anda boleh diperiksa.

Doktor anda perlu memeriksa tekanan darah anda untuk memastikan Pharmaniaga Captopril Tablet berkesan terhadap anda.

Doktor anda akan sentiasa melakukan ujian darah dari masa ke semasa untuk memeriksa tahap kalium dan fungsi buah pinggang anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet untuk merawat masalah lain kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengambilnya kurang daripada dos yang disarankan sebelum merujuk kepada doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati memandu atau mengendalikan jentera berat sehingga anda pasti bagaimana Pharmaniaga Captopril Tablet boleh mempengaruhi anda.

Ubat ini boleh menyebabkan rasa pening, kepala rasa ringan dan keletihan pada sesetengah orang terutamanya kali pertama mengambil ubat ini atau dos dinaikkan. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom ini, jangan memandu, mengendalikan jentera berat atau

melakukan sesuatu yang boleh membahayakan anda.

Berhati-hati semasa meminum arak semasa mengambil ubat ini. Sekiranya anda meminum arak semasa mengambil ubat ini, masalah pening dan kepala ringan akan bertambah teruk.

Jika anda berasa pening, kepala rasa ringan atau pitam semasa bangun dari tidur atau untuk berdiri, bangunlah perlahan-lahan. Berdiri perlahan-lahan, terutamanya apabila anda bangun dari katil atau kerusi, dapat membantu badan anda membiasakan diri kepada perubahan posisi dan tekanan darah. Jika masalah ini berterusan atau semakin teruk, bincanglah dengan doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Segeralah beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda berasa tidak sihat semasa mengambil Pharmaniaga Captopril Tablet.

Semua ubat ada kesan sampingannya. Kadang-kadang ianya serius, tetapi kebanyakannya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan segera sekiranya anda mengalami kesan sampingan tersebut.

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalaminya.

Tanyalah doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda ada sebarang persoalan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami masalah berikut dan ianya membimbangkan anda:

Kulit: ruam, gatal-gatal, lesi/ luka pemfigoid, fotosensitiviti, eksaserbasi

(pertambahan gejala) penyakit psoriasis, sindrom *Stevens-Johnson*.

Gastrosus: Gangguan rasa, angioedema usus, loya, cirit-birit, radang pada membran mukus mulut menyerupai ulser aftus.

Buah pinggang: Lebihan serum protein dalam air kencing, kegagalan buah pinggang, penyakit buah pinggang, pengeluaran air kencing secara berlebihan, mengurangkan penghasilan air kencing.

Perubahan keputusan makmal: Elektrolit serum: Kalium yang tinggi, Natrium yang rendah.

Hati: Kerosakan hati.

Gangguan darah: Kekurangan sel darah putih, kekurangan sel darah merah, kiraan platelet darah yang rendah dan kekurangan semua jenis sel darah.

Sistem peredaran darah: Tekanan darah rendah, degupan jantung laju, sakit dada, degupan jantung tidak normal, serangan jantung, sindrom *Raynaud*, kegagalan jantung kongestif.

Imunologi: Bengkak mana-mana bahagian badan, tindak balas alahan.

Pernafasan: batuk, berdehit.

Pembedahan/Anestesia: Pesakit yang menjalani pembedahan besar, atau semasa anestesia, *Captopril* boleh menyebabkan tekanan darah rendah.

Lain-lain: deria rasa tidak normal pada tangan, penyakit reaksi serum, penyakit yang memberi kesan kepada kelenjar limfa.

Beritahulah doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda perasan tanda-

tanda lain yang membuatkan anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers →Reporting*).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Pharmaniaga Captopril Tablet

Penyimpanan

Sentiasa simpan ubat anda dalam bungkusan asal.

Sekiranya anda mengeluarkan ubat tersebut dari bungkusan asal, ubat tersebut mungkin tidak akan tersimpan elok.

Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhu perlu di bawah 30°C.

Jangan simpan ubat di dalam bilik mandi atau berdekatan dengan sinki.

Jangan tinggalkan ubat ini di tingkap atau dalam kereta.

Kepanasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.

Pastikan semua ubat tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan ubat di dalam kabinet berkunci yang berketinggian sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai.

Pelupusan

Sekiranya doktor anda menyuruh anda untuk berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah melepasi tarikh luput, sila

rujuk ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan pada ubat yang masih berbaki. Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Tarikh kemaskini: 25 Ogos 2014

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, berbentuk segi empat dengan lambang Pharmaniaga di sebelah bahagian dan garisan pembahagian empat di sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan:

Bahan aktif: *Captopril*.

Bahan tidak aktif: *Lactose monohydrate*,
Microcrystalline Cellulose,
Pregelatinized Starch dan *Stearic acid*.

Nombor MAL:

MALXXXXXXXXXX

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad
(60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan
Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.