

IQNYDE TABLET

Sildenafil (50mg, 100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Iqnyde Tablet
2. Bagaimana Iqnyde Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Iqnyde Tablet
4. Cara pengambilan Iqnyde Tablet
5. Semasa mengambil Iqnyde Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Iqnyde Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Iqnyde Tablet

Iqnyde digunakan untuk rawatan mati pucuk di kalangan lelaki dewasa, iaitu ketidakupayaan untuk mencapai atau mengekalkan ereksi zakar yang mencukupi untuk prestasi seksual yang memuaskan.

Bagaimana Iqnyde Tablet berfungsi

Sildenafil berfungsi dengan membantu mengendurkan saluran darah di zakar anda, melancarkan perjalanan darah ke zakar apabila anda dirangsang secara seksual. *Sildenafil* hanya akan membantu anda mendapatkan ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual.

Sebelum mengambil Iqnyde Tablet

-Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak seharusnya mengambil *Sildenafil* sekiranya anda tiada masalah disfungsi ereksi.

Kaum wanita tidak seharusnya mengambil *Sildenafil*.

Jangan mengambil Iqnyde Tablet sekiranya anda:

- mengalami alahan kepada *Sildenafil* atau bahan-bahan lain dalam kandungan ubat ini
- Sekiranya anda mengalami masalah jantung atau hati yang teruk.

- Sekiranya anda baharu sahaja mengalami serangan jantung atau strok, atau sekiranya anda mempunyai tekanan darah rendah.
- Sekiranya anda mempunyai penyakit mata keturunan yang jarang berlaku (seperti pigmentosa retinitis iaitu penyakit degeneratif mata yang menyebabkan penglihatan yang teruk dan sering buta)
- Sekiranya anda pernah mengalami masalah hilang penglihatan disebabkan oleh kerosakan pada saraf optik akibat dari kekurangan bekalan darah yang juga dipanggil sebagai optik neuropati iskemik anterior bukan arteritis (NAION).

-Sebelum mengambil Iqnyde Tablet

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda ada alergi/alah terhadap sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna. Beritahu doktor anda:

- sekiranya ada kecacatan pada bentuk zakar anda atau penyakit Peyronie (suatu keadaan yang ditandai dengan terbentuknya plak atau benjolan keras pada penis).
- sekiranya anda menghidapi anemia sel sabit (suatu keabnormalan sel darah merah), leukemia (kanser sel darah), *multiple myeloma* (kanser sumsum tulang)
- sekiranya anda mempunyai masalah dengan jantung anda. Doktor anda sepatutnya memeriksa dengan teliti sama ada jantung anda boleh menghadapi tekanan tambahan daripada melakukan hubungan seksual
- sekiranya anda baru-baru ini menghidapi ulser perut, atau masalah pendarahan (seperti hemofilia).

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda sedang mengambil atau pernah mengambil ubat-ubat yang lain

dalam masa yang terdekat ini. Ini termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

Iqnyde Tablet mungkin mengganggu sesetengah ubat, terutamanya ubat-ubat yang digunakan untuk merawat masalah sakit dada. Dalam keadaan yang melibatkan masalah kecemasan perubatan, anda harus memberitahu sesiapa yang merawat anda bahawa anda mengambil Iqnyde Tablet dan bila anda mengambilnya.

Jangan mengambil Iqnyde Tablet dengan ubat-ubat lain melainkan atas arahan doktor anda.

Anda tidak seharusnya berpotensi menurunkan tekanan darah ke tahap yang membahayakan. Selalulah memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil ubat tersebut yang digunakan bagi melegakan serangan jantung (atau sakit dada).

Anda tidak harus mengambil Iqnyde Tablet jika anda sedang mengambil dadah rekreasi yang dipanggil "popper" seperti *amyl nitrate* dan *butyl nitrate* kerana kombinasi ini boleh menyebabkan penurunan tekanan darah ke tahap yang serius.

Sekiranya anda sedang mengambil ubatan yang tergolong dalam kumpulan perencat protease, seperti yang digunakan dalam rawatan HIV, doktor anda mungkin memulakan anda pada dos Iqnyde Tablet yang paling rendah (25 mg). Akan tetapi kombinasi produk-produk ini adalah lebih baik untuk dijaui kecuali kegunaannya amat diperlukan.

Sesetengah pesakit yang mengambil ubat-ubatan dalam kumpulan *alpha-blocker* untuk rawatan tekanan darah

IQNYDE TABLET

Sildenafil (50mg, 100mg)

tinggi atau masalah prostat mungkin mengalami masalah kepeningan atau simptom kepala rasa ringan dan melayang sekiranya duduk dan berdiri dengan cepat.

Pesakit-pesakit tertentu telah mengalami simptom-simptom ini apabila mengambil Iqnyde Tablet dengan *alpha-blocker*. Ini paling berkemungkinan berlaku dalam masa 4 jam selepas mengambil Iqnyde Tablet. Bagi mengurangkan kemungkinan simptom-simptom ini daripada berlaku, anda harus menggunakan dos harian tetap *alpha-blocker* sebelum memulakan Iqnyde Tablet. Doktor anda mungkin memulakan anda pada dos Iqnyde Tablet 25 mg.

Meminum arak/ alkohol akan mempengaruhi secara sementara keupayaan anda untuk mendapatkan ereksi. Bagi mendapatkan kesan yang maksima daripada ubat anda, anda dinasihatkan untuk tidak meminum arak secara berlebihan sebelum mengambil Iqnyde Tablet.

Cara pengambilan Iqnyde Tablet

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasalah mengambil Iqnyde Tablet seperti yang doktor anda arahkan. Anda harus memeriksa dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti. Dos permulaan biasa adalah 50 mg. Anda tidak boleh mengambil Iqnyde Tablet lebih daripada sekali sehari.

-Bila perlu diambil

Iqnyde Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Walaubagaimanapun, anda mungkin mendapati bahawa Iqnyde Tablet mengambil masa lebih lama untuk mula berkesan jika anda mengambilnya dengan makanan berat.

Anda harus mengambil Iqnyde Tablet kira-kira satu jam sebelum aktiviti seksual.

Sila telan tablet ini keseluruhannya

dengan segelas air.

Sekiranya anda beranggapan bahawa kesan Iqnyde Tablet adalah terlalu kuat atau terlalu lemah, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Iqnyde Tablet hanya akan membantu anda untuk mendapat ereksi sekiranya anda dirangsang secara seksual. Jangka masa diambil bagi Iqnyde Tablet untuk memberikan kesan berbeza-beza bagi setiap orang, tetapi ia biasanya mengambil masa di antara setengah jam dan satu jam.

-Berapa lama perlu diambil

Iqnyde Tablet hanya diambil apabila perlu sahaja.

Sekiranya Iqnyde Tablet tidak membantu anda untuk mendapat ereksi, atau jika ereksi anda tidak berterusan secukupnya untuk anda melengkapkan hubungan seksual, anda harus memberitahu doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Sekiranya anda terlupa mengambil Iqnyde Tablet sebelum aktiviti seksual anda, anda harus mengambilnya kira-kira satu jam sebelum aktiviti seksual bagi mendapatkan kesan sepenuhnya ubat ini.

Anda tidak boleh menggunakan Sildenafil lebih daripada sekali sehari.

Anda tidak boleh mengambil tablet lebih daripada yang disarankan doktor.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke hospital yang berdekatan dengan segera. Jangan memandu sekiranya anda sudah terlebih ambil ubat ini.

Jika anda mengambil Iqnyde Tablet lebih daripada yang anda sepatutnya ambil: Anda mungkin mengalami peningkatan dalam kesan-kesan

sampingannya dan menerukkan lagi keadaannya.

Dos melebihi 100 mg tidak meningkatkan lagi keberkesanan ubat ini.

Anda tidak boleh mengambil tablet ini lebih daripada yang doktor sarankan. Sila hubungi doktor anda jika anda mengambil tablet lebih daripada yang anda sepatutnya ambil.

Semasa mengambil Iqnyde Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya Iqnyde Tablet tidak membantu anda untuk mendapat ereksi, atau jika ereksi anda tidak berterusan secukupnya untuk anda melengkapkan hubungan seksual, anda harus memberitahu doktor anda.

Sekiranya anda mengalami pengurangan atau kehilangan penglihatan secara mendadak, berhentilah mengambil Iqnyde Tablet dan hubungilah doktor anda segera.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Iqnyde Tablet untuk merawat masalah lain kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disarankan kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Iqnyde Tablet boleh mengganggu penglihatan dan boleh menyebabkan menyebabkan kepeningan. Anda harus peka bagaimana kesan Iqnyde Tablet terhadap anda sebelum anda memandu atau mengendalikan jentera berat.

Kesan-kesan sampingan

Beritahulah ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda tidak berasa sihat semasa mengambil Iqnyde Tablet. Ubat

IQNYDE TABLET

Sildenafil (50mg, 100mg)

ini membantu kebanyakan orang tetapi ianya berkemungkinan memberikan kesan sampingan pada sesetengah orang. Semua ubat-ubatan akan menghasilkan kesan sampingan. Kadangkadang kesan sampingan ini serius, kadang-kadang ianya tidak. Anda mungkin memerlukan pemerhatian perubatan sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut.

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalaminya. Bertanyalah dengan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda ada sebarang pertanyaan. Kesan sampingan yang amat biasa berlaku (terjadi pada 1 dalam 10 pesakit) adalah sakit kepala.

Kesan sampingan yang biasa berlaku (terjadi pada 1 hingga 10 dalam 100 pesakit): kemerahan muka, ketidakhadaman, hidung tersumbat, kepeningan dan perubahan penglihatan seperti peningkatan kepekaan kepada cahaya, pandangan menjadi kabur atau kesukaran membezakan antara warna biru dan hijau.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.moh.gov.my/underline this address](http://npra.moh.gov.my/underline_this_address) [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Iqnyde Tablet

-Penyimpanan

Pastikan ubat tidak dapat dicapai dan dilihat oleh kanak-kanak. Jangan ambil Iqnyde Tablet selepas tarikh tamat tempoh seperti yang tercatat pada karton dan blister. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan itu. Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C. Simpan tablet anda dalam bungkus yang asal. Simpan blister di dalam karton. Ini dapat melindungi ubat anda

daripada cahaya dan lembapan.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkahlangkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Iqnyde Tablet 50mg:

Tablet bersalut filem, berwarna biru, berbentuk berlian permukaan sebelah lagi. rata di permukaan sebelah lagi.

Iqnyde Tablet 100mg:

Tablet bersalut filem, berwarna biru, berbentuk berlian dwicembung dengan ikon Pharmaniaga pada satu permukaan dan rata di permukaan sebelah lagi.

-Bahan-bahan kandungan

Iqnyde Tablet 50mg:

Bahan aktif:

Sildenafil 50mg

Bahan tidak aktif:

Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Croscarmellose sodium, Talc, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Opadry II Blue.

Iqnyde Tablet 100mg:

Bahan aktif:

Sildenafil 50mg

Bahan tidak aktif:

Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Croscarmellose sodium, Talc, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Opadry II Blue

-Nombor MAL

Iqnyde Tablet 50mg:

MAL15045061AZ

Iqnyde Tablet 100mg:

MAL15045069AZ

Pengilang

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),

11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

9/6/2020

Nombor siri

NPRA(R2/1)200213/356