

BIO-BACTEDENE GEL 10%w/w

Povidone-Iodine 10g/100g (equivalent to iodine 1 g)

Apa yang ada pada risalah ini

1. Apa kegunaan Bio-Bactedene gel 10%w/w
2. Bagaimana Bio-Bactedene gel 10%w/w berfungsi
3. Sebelum menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w
4. Cara menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w
5. Semasa menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bio-Bactedene gel 10% w/w
8. Penerangan Produk
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh Semakan

Apakah kegunaan Bio-Bactedene Gel 10%w/w

Bio-Bactedene gel 10%w/w digunakan untuk mencegah jangkitan ketika luka, melecet, terbakar dan penggunaan untuk pra pembasmian kuman pada kulit.

Bagaimana Bio-Bactedene gel 10%w/w berfungsi

Bahan aktif yang terkandung dalam Bio-Bactedene gel 10%w/w adalah Povidone – Iodine yang mampu membunuh pelbagai jenis kuman.

Sebelum menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w

-Bila Tidak boleh menggunakannya

Beritahu doktor anda jika mana-mana yang berikut adalah benar untuk anda sebagai pesakit dengan syarat ini tidak boleh menggunakan Povidone – Iodine

- Jika alah (hipersensitif) kepada polyvinylpyrrolidone, iodine atau mana-mana ramuan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam bahagian Penerangan Produk)
- Jika anda sediaada atau baru mempunyai fungsi tyroid atau kanser
- Jika umur kurang dari 2 tahun
- Jika mengambil lithium
- Jika anda hamil

- Sebelum mula menggunakannya

- Bercakap dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w
- Jika anda telah mempunyai tiroid atau kanser
- Jika buah pinggang anda tidak berfungsi dengan baik

Semak dengan doktor sekiranya mana-mana yang berikut terpakai kepada anda:

- Jika anda mempunyai reaksi alahan yang serius atau tindakbalas kulit yang serius terhadap sebarang ubat
- Jika anda mengambil lithium atau natrium picosulfate
- Sekiranya anda menguji fungsi tiroid atau beberapa jenis ujian untuk mengesan darah okultisme dalam najis atau darah.

-Jika mengambil ubat -ubat lain

Sesetengah ubat boleh menjejaskan cara ubat lain berfungsi. Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru mula mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat- ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi:

- Lithium: Menggunakan serentak dengan terapi lithium untuk menunjukkan kesan adanya hipotiroidik aditif
- Sodium picosulfate: Antibiotik boleh mengurangkan kesan terapeutik daripada natrium picosulfate.

Beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda mengambil, atau baru mengambil sebarang ubat yang disenaraikan diatas atau mana-mana ubat lain.

Cara menggunakan Bio-Bactedene gel 10% w/w

-Berapa banyak yang harus digunakan

- Gunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w dalam kuantiti yang betul dengan meletakkan pada bahagian kulit yang luka sebanyak 2—3 kali sehari.

Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi

-Berapa lama perlu digunakan

Jangan gunakan produk ini lebih dari 1 minggu kecuali diarahkan oleh doktor kerana pendedahan berpanjangan boleh menyebabkan kerengsaan, alahan atau reaksi kulit yang teruk.

-Jika terlupa menggunakannya

Rujuk pada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Sapukan dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga penggunaan berikut dan langkau penggunaan yang telah terlepas. Jangan gunakan dos berganda pada penggunaan yang telah terlepas.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan berdekatan, jika anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini.

Lakukan ia walaupun tidak ada sebarang tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian atau perubatan segera.

Semasa menggunakan Bio-Bactedene gel 10% w/w

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat ini sebetulnya seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu semua doktor atau ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Bio-Bactedene gel 10%w/w.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

-Produk ini hanya untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan gunakan produk ini pada mata atau Kawasan besar bahagian badan.

BIO-BACTEDENE GEL 10%w/w

Povidone-Iodine 10g/100g (equivalent to iodine 1 g)

- Tidak panas semasa penggunaan
- Tidak berhenti menggunakan ubat kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda.
- Tidak mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi.
- Jangan berikan Bio-Bactedene gel 10%w/w kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau simptom yang sama seperti anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Bio-Bactedene gel 10%w/w boleh memberi kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Beberapa kesan sampingan yang disenaraikan dibawah:

Kesan sampingan biasa: Kerengsaan biasa, kulit terbakar dan tindakbalas sensitiviti.

Kesan sampingan serius: Tindakbalas anaphylactic, kejutan anaphylactic, kanser, hypothyroidism, serius hyperthyroidism, metabolic acidosis, dan kegagalan buah pinggang akut.

Lawati doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan apa-apa kesan sampingan atau tindakbalas ubat-ubatan yang merosakkan terus ke Pusat Pemantauan Dadah Berbahaya dengan melayari laman web npa.gov.my/ [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan bagi Bio-Bactedene gel 10%w/w

Penyimpanan:

- Simpan dibawah 30 °C.
- Jauhkan ubat dari capaian kanak-kanak.

Pelupusan:

Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan air atau sisa buangan pepejal. Sila rujuk pada ahli farmasi bagaimana cara untuk membuang uabt yang tidak digunakan lagi. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Penerangan Produk

-Rupa dan warna produk

Gel coklat

-Bahan -bahan kandungan

- * Bahan Aktif – Povidone iodine
- * Bahan Tidak Aktif – Sodium bicarbonate, purified water, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 4000

MAL number: MAL20046134XZ

Pengilang

MacroPhar Co.,Ltd
89 Soi Pattanakarn 20 Yaek 4,
Pattanakarn Road., Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

TOP BIOPHARMA SDN. BHD
No. 23A, Jalan Kesuma 3/11,
Bandar Tasik Kesuma,
43700 Beranang, Selangor D.E.
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/07/2020

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/024