

SCABICIDE CREAM

Crotamiton (10% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Scabicide Cream
2. Bagaimana Scabicide Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Scabicide Cream
4. Cara menggunakan Scabicide Cream
5. Semasa menggunakan Scabicide Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan Scabicide Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Scabicide Cream

Scabicide Cream digunakan untuk rawatan *scabies*, Scabicide Cream adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

Bagaimana Scabicide Cream berfungsi
Crotamiton, adalah bahan aktif dalam Scabicide Cream, ia digunakan untuk merawat kegatalan. Di samping ia mencegah kerosakan pada kulit (disebabkan oleh garuan) supaya mengurangkan risiko jangkitan oleh kutu. Scabicide Cream juga membantut pertumbuhan beberapa jenis bakteria.

Sebelum menggunakan Scabicide Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika:

- anda alergik atau hipersensitif terhadap crotamiton atau mana-mana bahan terkandung dalam produk ini.
- anda mengalami penyakit kulit atau keradangan kulit.
- Rujuk doktor atau ahli farmasi anda, jika anda mempunyai masalah kulit ini.
- ia tidak dipreskrib oleh doktor atau ahli farmasi.

- anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung, melainkan jika ia telah dipreskrib oleh doktor.
- anda sedang menyusukan anak, melainkan doktor telah preskrib kepada anda.

- Sebelum mula menggunakan Scabicide Cream

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda mengandung, sedang cuba untuk mengandung atau sedang menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Scabicide Cream

- Berapa banyak harus digunakan

- Untuk rawatan *scabies*:
Dewasa dan kanak-kanak: Sapukan krim pada kulit di seluruh badan, bermula dari dagu dan seterusnya ke bawah di bahagian badan lain. Tumpukan lebih perhatian kepada bahagian badan yang berlipat.
- Scabicide Cream boleh digunakan pada kanak-kanak. Walau bagaimanapun, untuk kanak-kanak berusia kurang daripada 3 tahun, Scabicide Cream TIDAK BOLEH digunakan lebih daripada satu kali dalam sehari.
- Untuk rawatan kegatalan (*pruritus*):
Sapukan Scabicide kepada kawasan yang terjejas 2-3 kali sehari sehingga ubat diserap sepenuhnya. Scabicide akan memberikan kelegaan daripada kerengsaan selama 6-10 jam selepas Scabicide disapukan.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh anda doktor atau ahli farmasi.

- Sapuan hendaklah diulang sekali setiap hari, disarankan pada waktu petang.
- Anda disarankan untuk membuat sapuan kali kedua selepas 24 jam kemudian.

ARAHAN PENGGUNAAN:

Selepas mandi dengan air suam, kulit mesti dikeringkan dengan teliti sebelum Scabicide Cream disapukan pada seluruh permukaan badan (kecuali muka dan kulit kepala) sehingga tiada baki Scabicide Cream kelihatan pada permukaan kulit. Lebih tumpuan patut diberikan pada bahagian yang terdedah kepada jangkitan (seperti di celah-celah jari, pergelangan tangan, ketiak dan bahagian kemaluan). Kawasan di mana terdapat pembentukan nanah harus ditutup dengan pembalut luka yang diresapi dengan Scabicide Cream. Sepanjang tempoh rawatan dengan Scabicide Cream anda disarankan untuk mandi dahulu sebelum sapuan seterusnya. Setelah rawatan tamat, anda digalakkan untuk mandi dengan bersih dan tukar alas katil dan pakaian dalam.

- Berapa lama perlu digunakan

Rawatan untuk *scabies* kebiasaannya mengambil masa selama 3-5 hari, bergantung pada respons kepada rawatan. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya gejala berterusan.

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos tertinggal dan tunggu untuk menyapu dos seterusnya seperti biasa mengikut jadual. Jangan menyapu dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

SCABICIDE CREAM

Crotamiton (10% w/w)

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat anda, jika anda merasakan anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Sekiranya tertelan dengan tidak sengaja, gejala yang mungkin terjadi adalah seperti rasa loya, muntah dan kerengsaan pada lapisan dalam pipi (dalam mulut), tekak dan perut. Terdapat kes di mana kehilangan kesedaran dan sawan pernah dilaporkan, tetapi adalah jarang berlaku.

Semasa menggunakan Scabicide Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Gunakan Scabicide Cream seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan Scabicide Cream
- Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa menggunakan Scabicide Cream.
- Rujuk doktor anda sekiranya keadaan tidak bertambah baik atau sekiranya ia menjadi lebih teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Scabicide Cream kepada sesiapa sahaja, walaupun dia mengalami simptom atau keadaan yang sama seperti anda.
- Scabicide Cream tidak boleh disapu pada lapisan dalam pipi (dalam mulut) atau pada mata atau bahagian

sekitar mata kerana boleh menyebabkan keradangan mata. Sekiranya tidak sengaja bersentuhan dengan mata atau dalam mulut, bilas dengan air bersih.

- Scabicide Cream tidak boleh digunakan sekiranya terdapat luka, ekzema, lecur, atau kulit yang meradang. Rujuk doktor anda jika anda mempunyai masalah kulit seperti di atas.
- Sekiranya anda sedang menyusu, dan doktor telah preskrib kepada anda Scabicide Cream, jangan sapu Scabicide Cream pada kawasan puting.
- Jangan berhenti menggunakan ubat sehingga rawatan tamat, walaupun anda mula berasa lebih baik selepas beberapa hari menggunakan ubat.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Rawatan harus dihentikan sekiranya anda mengalami tindak balas alahan atau kerengsaan kulit yang teruk. Dapatkan rawatan daripada doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Scabicide Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang paling kerap dilaporkan semasa dalam rawatan adalah kegatalan.

Keradangan kulit dan tindak balas disebabkan oleh hipersensitiviti seperti ruam, ekzema, kemerahan, kerengsaan kulit dan bengkak boleh berlaku, walaupun jarang.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Scabicide Cream

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya secara langsung.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim putih tanpa bau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Crotamiton

- Bahan tidak aktif

Polysorbate 80 (TWEEN 80), propylene glycol, glyceryl monostearate, cetostearyl alcohol, hard paraffin, purified water, cetomacrogol 1000

- Nombor MAL:

MAL19940583XCZ

SCABICIDE CREAM

Crotamiton (10% w/w)

Pengilang

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
(445695-T)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

17/06/2021

Nombor Siri

NPRA (R4/1)090621/00039