

PRONERGAN TABLET

Promethazine Hydrochloride (12.5 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pronergeran Tablet
2. Bagaimana Pronergeran Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pronergeran Tablet
4. Cara menggunakan Pronergeran Tablet
5. Semasa menggunakan Pronergeran Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pronergeran Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pronergeran Tablet

Pronergeran Tablet digunakan untuk merawat reaksi alahan, mual dan muntah.

Bagaimana Pronergeran Tablet berfungsi

Pronergeran Tablet mengandungi promethazine hydrochloride yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil antihistamin. Ia berfungsi untuk menyekat histamin iaitu suatu bahan kimia yang dihasilkan oleh tubuh badan semasa reaksi alahan. Ia juga bertindak pada otak untuk membantu anda berasa lebih tenang.

Sebelum menggunakan Pronergeran Tablet

-Bila tidak boleh menggunakannya:

Jangan gunakan Pronergeran Tablet 12.5mg jika anda:

- Mempunyai alahan terhadap promethazine hydrochloride atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Pronergeran Tablet

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil ubat ini jika anda:

- sensitif terhadap ubat di dalam kelas yang sama dengan promethazine seperti methdilazine dan trimeprazine.
- mempunyai pundi kencing tersumbat
- mempunyai pembesaran kelenjar prostat
- mempunyai pengekal air kencing
- mempunyai pengurangan dalam penghasilan sel-sel darah dalam sumsum tulang
- mempunyai penyakit jantung
- mempunyai sawan
- mempunyai glaukoma (penyakit mata)
- mempunyai penyakit hati atau jaundis
- mempunyai sindrom Reye (sejenis penyakit yang jarang berlaku yang boleh menyebabkan kerosakan hati dan otak yang serius)

Jangan gunakan pada bayi yang baru lahir atau pramatang kerana ia boleh menyebabkan sawan.

Jangan gunakan ubat ini untuk jangka masa yang lama kerana ianya boleh menyebabkan masalah gigi seperti kerosakan gigi, penyakit gusi, jangkitan kulat dan ketidakselesaan di dalam mulut. Jangan berikan kepada kanak-kanak dibawah umur 2 tahun.

Kehamilan dan penyusuan

Jangan gunakan Promethazine 2 minggu sebelum beranak.

Jangan gunakan Promethazine jika anda menyusu kerana promethazine boleh dirembeskan ke dalam susu ibu dan ini mungkin berbahaya kepada bayi.

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Alkohol

- ubat-ubatan untuk merawat kemurungan seperti perencat Monoamine Oxidase (MAO), maprotiline dan tricyclic antidepressants.
- Ubat untuk merawat *attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)* seperti amphetamines
- ubat untuk merawat sawan seperti barbiturat
- ubat untuk mengurangkan selera makan
- ubat untuk merawat tekanan darah tinggi seperti propranolol
- ubat untuk merawat Parkinson seperti bromocriptine, levodopa dan selegiline
- ubat-ubatan untuk merawat tekanan darah rendah seperti dopamin, ephedrine, metaraminol dan methoxamine
- ubat-ubatan untuk merawat reaksi alergi yang teruk seperti epinephrine
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan gangguan pergerakan
- ubat-ubatan untuk merawat tekanan darah tinggi seperti guanadrel atau guanethidine
- ubat-ubatan yang boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan hati
- ubat yang menyebabkan tekanan darah rendah
- ubat yang digunakan untuk ujian radiologi seperti metrizamide
- ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria seperti furazolidone
- ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit Hodgkin (sejenis barah darah) seperti procarbazine
- ubat yang boleh menyebabkan kerosakan pada telinga
- ubat-ubatan untuk merawat degupan jantung yang tidak teratur seperti quinidine
- suplemen kesihatan seperti riboflavin (Vitamin B2)

PRONERGAN TABLET

Promethazine Hydrochloride (12.5 mg)

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Pronergan Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa : Ambil 1 biji, 4 kali sehari

Children (6 – 12 tahun) : Berikan setengah atau satu biji, 2 atau 3 kali sehari

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Pronergan Tablet mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda atau anak anda mengambil lebih banyak Tablet Promethazine daripada yang sepatutnya, beritahu doktor atau pergi ke hospital jabatan segera. Bawa pek ubat itu bersama anda.

Ini dapat membantu doktor untuk mengetahui ubat yang telah di ambil.

Kesan berikut mungkin berlaku:

- Pada kanak-kanak:
 - tidak stabil; mengantuk teruk; mulut, hidung, atau tekak kering yang teruk; rasa panas atau muka merah; sesak nafas atau masalah bernafas)
 - halusinasi; sawan; sukar untuk tidur
- Pada orang dewasa:

- kekejangan otot, terutamanya leher dan belakang; kegelisahan; berjalan menyeret; pergerakan kepala dan muka seperti tersentak dan tangan menggeletar
- Tekanan darah rendah (rasa pitam)

Semasa menggunakan Pronergan Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini selain arahan doktor.
- Jangan gunakan sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Pronergan Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan Pronergan Tablet kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan mengambil Pronergan Tablet untuk merawat simptom yang lain melainkan jika ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.
- Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali diberitahu oleh ahli farmasi atau doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini mengandungi laktosa (sejenis gula). Sekiranya anda mempunyai masalah pencernaan gula, beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan mesin.

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika Pronergan Tablet membuatkan anda berasa pening atau mengantuk, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Promethazine boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Hentikan pengambilan ubat ini dan berjumpa dengan doktor atau pergi ke hospital dengan segera jika anda mendapati perubahan pada mana-mana bahagian berikut:

Kesan- kesan sampingan yang lebih kurang kerap atau jarang berlaku:

- mengantuk
- kahak menjadi pekat

Kesan-kesan sampingan yang jarang berlaku:

- gangguan darah (sakit tekak, demam, pendarahan atau lebam yang tidak biasa, keletihan atau kelemahan yang tidak normal)
- penglihatan kabur atau terjejas
- kekeliruan
- sakit atau sukar untuk membuang air kecil
- pening
- mulut, hidung atau tekak kering
- tekanan darah rendah (rasa pitam)
- peluh berlebihan
- hilang selera makan
- mimpi buruk, perasaan teruja, kegelisahan atau mudah marah
- kulit lebih sensitif terhadap cahaya matahari
- bunyi berdering dalam telinga
- ruam
- degupan jantung yang cepat

Sekiranya anda mengalami kesan di atas atau yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting

PRONERGAN TABLET

Promethazine Hydrochloride (12.5 mg)

Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

PronerGAN Tablet

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C simpan tempat yang kering dan jauh dari cahaya.

- Pelupusan

Jangan gunakan tablet selepas tarikh luput, yang dinyatakan pada kotak. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir dalam bulan itu.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet rata bulat berwarna putih dengan skor "TPI" pada satu bahagian dan "J/61" timbul di bahagian lain

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Promethazine Hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Magnesium stearate, croscarmellose sodium, corn starch, PVP-K90, lactose

- Nombor MAL:

MAL19872194ACZ

Pengilang

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

(445695-T)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

23/05/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1) 230522/00029

