

RESCANIL SYRUP

Salbutamol sulphate (2mg setiap 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rescanil Syrup
2. Bagaimana Rescanil Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Rescanil Syrup
4. Cara menggunakan Rescanil Syrup
5. Semasa menggunakan Rescanil Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rescanil Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Rescanil Syrup

Ia digunakan untuk merawat keadaan paru-paru yang menyebabkan masalah pernafasan seperti asma, keradangan saluran udara dan kerosakan pada kantung udara pada paru-paru.

Bagaimana Rescanil Syrup berfungsi

Bahan aktif Rescanil ialah salbutamol, yang berfungsi untuk meluaskan saluran pernafasan ke paru-paru dan melegakan masalah pernafasan.

Sebelum menggunakan Rescanil Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Rescanil Syrup jika anda:

- mempunyai alahan (hipersensitiviti) terhadap salbutamol sulphate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam Rescanil Syrup (disenaraikan dalam maklumat lanjut).
- bersalin pramatang atau berkemungkinan mengalami keguguran bayi.

- Sebelum mula menggunakan Rescanil Syrup

Produk ini tidak boleh dicairkan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda:

- mengandung, mungkin hamil atau sedang menyusui. Salbutamol boleh dirembeskan ke dalam susu ibu, oleh itu penggunaannya dalam ibu-ibu yang menyusui perlu dipertimbangkan dengan teliti.

- menghidap asma yang tidak terkawal atau teruk
- mengalami pembesaran prostat, kerana Rescanil Syrup boleh menyebabkan kesukaran membuang air kecil.
- menghidap diabetes, kerana produk ini boleh menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Kesan ini mungkin akan meningkat sekiranya anda mengambil kortikosteroid.
- mempunyai masalah jantung, degupan jantung meningkat dan sakit dada atau sesak nafas.
- mempunyai kelenjar tiroid yang terlalu aktif.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- ubat-ubatan untuk rawatan tekanan darah tinggi: contohnya reserpine, propranolol, methyldopa dan guanethidine.

Beritahu doktor anda bahawa anda mengambil Rescanil Syrup jika anda menjalani pembedahan yang memerlukan ubat bius (contohnya: chloroform, cyclopropane atau halothane dan agen halogen yang lain)

Cara menggunakan Rescanil Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa: Ambil 5ml-15ml
- Kanak-kanak 2-6 tahun: 0.1-0.2mg / kg berat badan. Doktor atau ahli farmasi anda akan mengira dos untuk anak anda.
- Umur 6-14 tahun: Berikan 5ml

- Bila perlu digunakan

Gunakan 3 atau 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- degupan jantung meningkat
- menggeletar
- terlampau aktif
- paras kalium rendah dalam darah menyebabkan kelemahan, sentakan dan kekejangan otot
- pengumpulan asid laktik dalam aliran darah yang boleh menyebabkan anda bernaafas dengan lebih cepat
- loya, muntah dan paras gula yang tinggi dalam darah (terutamanya pada kanak-kanak)

Semasa menggunakan Rescanil Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Rescanil Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

RESCANIL SYRUP

Salbutamol sulphate (2mg setiap 5ml)

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Rescanil Syrup kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Anda perlu mendapatkan nasihat doktor jika rawatan dengan Rescanil Syrup menjadi kurang berkesan atau anda memerlukan penyedut dengan lebih kerap. Dos atau kekerapan pengambilan ubat hanya boleh ditambah atas nasihat doktor.
- Beritahu doktor jika anda juga menggunakan penyedut untuk melegakan gejala masalah pernafasan.

Memandu dan menggunakan jentera. Berhati-hati apabila memandu atau menggunakan jentera sehingga anda tahu bagaimana Rescanil Syrup mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Rescanil Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Berhenti menggunakan Rescanil Syrup dan dapatkan nasihat doktor jika anda mengalami reaksi alahan berlaku, termasuk ruam kulit, kesukaran bernafas, pening atau pitam.

Kesan sampingan yang sangat kerap berlaku:

- menggeletar

Kesan sampingan yang kerap berlaku:

- degupan jantung yang cepat
- sakit kepala
- kekejangan otot

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

- paras kalium rendah dalam darah

- degupan jantung tidak teratur
- peningkatan aliran darah ke lengan dan kaki

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku:

- reaksi alahan termasuk bengkak, gatal-gatal, kesukaran bernafas, tekanan darah rendah dan tidak sedarkan diri.
- terlampau aktif
- ketegangan otot

Kesan sampingan yang lain:

- ketegangan
- gelisah

Sekiranya kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapati kesan sampingan yang tidak dinyatakan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Rescanil Syrup

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya langsung.

- Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui sisa air atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih tidak berwarna dengan rasa manis dan berbau buah.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Salbutamol

- Bahan tidak aktif

Sodium saccharin, sodium chloride, sodium phosphate monobasic, tutti fruity, propylene glycol, sorbitol, purified water qs, methyl paraben, sodium benzoate, liquid glucose, propyl paraben

- Nombor MAL:

MAL19890245ACZ

Pengilang

Teraputics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
(445695-T)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

25/05/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)261021/00080