

DIMERINE SYRUP

Dimenhydrinate (25 mg/5 ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dimerine Syrup
2. Bagaimana Dimerine Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dimerine Syrup
4. Cara menggunakan Dimerine Syrup
5. Semasa menggunakan Dimerine Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dimerine Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dimerine Syrup
Dimerine Syrup digunakan untuk melegakan rasa mual, muntah, yang disebabkan oleh mabuk perjalanan dan rasa pening atau berpusing.

Bagaimana Dimerine Syrup berfungsi

Bahan aktif Dimerine Syrup adalah dimenhydrinate yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai antihistamin. Ia membantu melegakan gejala pening, rasa berpusing dan mual.

Sebelum menggunakan Dimerine Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Dimerine Syrup jika anda:

- mempunyai alahan (hipersensitiviti) terhadap dimenhydrinate atau bahan - bahan lain dalam Dimerine Syrup
- mengambil ubat yang boleh memudaratkan telinga seperti antibiotik tertentu.
- alergi terhadap ubat antihistamin lain. Anda tidak boleh mengambil ubat ini melainkan jika anda telah diberitahu oleh doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan

Dimerine Syrup

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda:

- mengalami sawan
 - mengalami pembesaran prostat yang menyebabkan kesukaran membuang air kecil
 - mengalami peningkatan tekanan dalam mata
 - mempunyai masalah hati
 - hamil atau menyusu. Dimenhydrinate tidak boleh digunakan kecuali diarahkan oleh doktor.
- Terdapat kejadian ketara sumbing lelangit dan kecacatan lain pada anak-anak setelah ibunya mengambil dimenhydrinate (komponen dimenhydrinate).

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat lain, terutama yang berikut:

- Ubat antikolinergik dan anti parkinson seperti benzhexol, kerana dimenhydrinate akan meningkatkan kesan sampingan antikolinergik.
- antibiotik

Dos neperidine, morphine atau ubat tahan sakit narkotik lain harus dikurangkan menjadi $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ apabila digunakan bersama dengan Dimenhydrinate.

Arahan: Jangan minum alkohol semasa menjalani rawatan dengan Dimenhydrinate kerana ia akan menyebabkan anda rasa letih dan mengantuk.

Cara menggunakan Dimerine Syrup

- Berapa banyak harus digunakan

- 2-6 tahun: $\frac{1}{2}$ - 1 sudu teh (2.5 ml - 5 ml)
- 6 - 12 tahun: 1 - 2 sudu teh (5 ml - 10 ml)
- Dewasa: 2 - 4 sudu teh

(10 ml - 20 ml)

- Bila perlu digunakan

- Diminum 3 atau 4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda
- Diminum 1 jam sebelum perjalanan dimulakan (mabuk perjalanan)

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan semua ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil Dimerine Syrup, ambilkannya secepat mungkin apabila anda ingat dan kemudian ambil dos seterusnya mengikut jadual yang ditetapkan. Jangan ambil dos berlebihan untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor atau pergi ke Jabatan Kecemasan atau hospital terdekat, jika anda atau orang lain mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukannya walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak Dimerine Syrup mungkin menyebabkan kekejangan. Pastikan individu tersebut berdiam diri terutama pada kanak-kanak bagi mengurangkan keterujaan yang berlaku.

Semasa menggunakan Dimerine Syrup

- Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dan mengambil semua ubat dalam jumlah yang ditetapkan setiap hari.

DIMERINE SYRUP

Dimenhydrinate (25 mg/5 ml)

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan Dimerine Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diambil perhatian:

- sedang memandu dan menggunakan mesin, di mana Dimerine akan menyebabkan anda merasa mengantuk dan mengurangkan kewaspadaan anda. Sekiranya ini berlaku, anda tidak boleh memandu atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Segera berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami:

- mulut kering
- kesukaran membuang air kecil
- kekeliruan
- mengantuk
- pening
- tekanan darah rendah yang tidak normal
- kelemahan otot dan pergerakan tidak terkawal
- sakit kepala

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Dimerine Syrup

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang dilindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui sisa air atau sampah di rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap tanpa warna yang jernih dengan bau buah-buahan dan rasa manis.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Dimenhydrinate

- Bahan tidak aktif

propylene glycol, sodium chloride, liquid glucose, purified water, sodium saccharin, propyl paraben, methyl paraben

- Nombor MAL:

MAL19890411ACZ

Pengilang

Terapeutics Sdn. Bhd. (590500-W)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B,
14100 Simpang Ampat, S.P.S.,
Pulau Pinang, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
(445695-T)
Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B,
14100 Simpang Ampat, S.P.S.,
Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

- 09/03/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)090321/00014