

FUNGICIDE CREAM

Miconazole Nitrate (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fungicide Cream
2. Bagaimana Fungicide Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fungicide Cream
4. Cara menggunakan Fungicide Cream
5. Semasa menggunakan Fungicide Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan Pelupusan Fungicide Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Fungicide Cream

Fungicide Cream digunakan untuk rawatan jangkitan kulat pada kulit dan kuku.

Bagaimana Fungicide Cream berfungsi

Miconazole nitrate adalah agen antikulat imidazol yang berfungsi untuk membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan dan beberapa jenis bakteria berkaitan.

Sebelum menggunakan Fungicide Cream

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- Mempunyai alahan terhadap miconazole nitrate atau ubat yang serupa atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

- Sebelum mula menggunakan Fungicide Cream

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda

mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.
- Beritahu doktor anda sekiranya anda mengambil ubat untuk mencairkan darah anda (antikoagulan) seperti warfarin.

Cara menggunakan Fungicide Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan nipis pada bahagian kulit yang terjejas sehingga sembuh sepenuhnya.

- Bila perlu digunakan

Sapukan 2 atau 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh anda doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Fungicide Cream mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan terdekat, jika dos berlebihan telah

digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Sekiranya anda termakan ubat ini, pergi ke Jabatan Kecemasan atau hospital terdekat. Penggunaan berlebihan boleh mengakibatkan iritasi kulit, yang biasanya akan hilang apabila ubat tidak lagi digunakan.

Semasa menggunakan Fungicide Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Guna ubat anda mengikut arahan doktor
- Beritahu semua doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang menggunakan Fungicide Cream
- Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa menggunakan Fungicide Cream.
- Beritahu doktor anda sekiranya keadaan tidak bertambah baik atau sekiranya ia menjadi lebih teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Fungicide cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Fungicide cream tidak boleh bersentuhan dengan mata anda.

FUNGICIDE CREAM

Miconazole Nitrate (2% w/w)

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Fungicide Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang paling kerap dilaporkan adalah iritasi kulit. Sekiranya terdapat lepuh, kulit terbakar, kemerahan, ruam kulit atau tanda-tanda iritasi kulit yang lain, hentikan penggunaan ubat ini dan berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Fungicide Cream

- Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim lembut berwarna putih tanpa bau.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Miconazole nitrate

- Bahan tidak aktif

Chlorocresol, tween 80, cetomagrogol 1000, white soft paraffin, liquid paraffin, propylene glycol, purified water, cetostearyl alcohol

- Nombor MAL:

MAL19900274ACZ

Pengilang

Terapeutics Sdn. Bhd.

(590500-W)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park, Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100 Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn.

Bhd. (445695-T)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park, Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100 Simpang Ampat, S.P.S., Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

29/03/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)290322/00021