

METACIN TABLET

Paracetamol (500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Metacin Tablet
2. Bagaimana Metacin Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Metacin Tablet
4. Cara menggunakan Metacin Tablet
5. Semasa menggunakan Metacin Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Metacin Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Metacin Tablet

Metacin Tablet digunakan untuk melegakan kesakitan ringan hingga sederhana dan untuk mengurangkan demam.

Bagaimana Metacin Tablet berfungsi

Ubat ini mengandungi paracetamol, ubat tahan sakit. Ia berfungsi dengan cara mengurangkan penghasilan bahan yang menyebabkan kesakitan dan keradangan.

Sebelum mengambil Metacin Tablet

- Bila tidak boleh mengambil :

- Ubat ini mengandungi paracetamol. Jangan ambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.
- Jangan ambil Metacin Tablet jika anda alah kepada paracetamol atau kepada bahan-bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.

- Sebelum mengambil Metacin Tablet:

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda, jika anda:

- mengandungi atau sedang menyusukan bayi
- mempunyai masalah hati atau buah pinggang
- anda bergantung kepada alkohol

-Jika mengambil ubat-ubat lain:

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jikalau anda mengambil:

- Sebarang ubat-ubatan lain, termasuk mana-mana ubat yang anda beli atau dapatkan tanpa preskripsi dari

farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

- Doxorubicin: digunakan untuk merawat kanser.
- Ubat cair darah (warfarin): digunakan untuk mengurangkan darah beku.
- Metoclopramide dan domperidone: digunakan untuk merawat dan mencegah rasa mual dan muntah-muntah.
- Colestyramine: digunakan untuk menurunkan paras kolesterol dalam darah.
- Phenobarbitone: digunakan untuk merawat sawan

Cara menggunakan Metacin Tablet

- Berapa banyak harus digunakan:

Dewasa: 1-2 tablet setiap 4-6 jam, maksimum 8 tablet sehari.

Kanak-kanak (6 - 12 tahun): Suku hingga setengah tablet setiap 4-6 jam apabila perlu.

-Bila perlu digunakan :

Untuk diberikan setiap 4 - 6 jam bila perlu atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Maksimum 4 kali dalam 24 jam.

-Berapa lama perlu digunakan :

Ambil Metacin Tablet selama tempoh yang dicadangkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan :

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos) :

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mendapati anda telah menggunakan ubat ini secara berlebihan. Simptom dos berlebihan dalam 24 jam pertama adalah

termasuk pucat, mual, muntah-muntah, kurang selera makan dan sakit di bahagian perut. Kerosakan hati yang ketara akan berlaku setelah 12 hingga 48 jam selepas pengambilan ubat. Dalam kes keracunan yang serius, penyakit, kerosakan atau gangguan fungsi otak, pendarahan, penurunan paras gula dalam darah, otak bengkak dan kematian boleh berlaku.

Semasa menggunakan Metacin Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan :

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang menggunakan Metacin Tablet.
- Beritahu doktor dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan :

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Metacin Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.
- Jangan melebihi dos yang disyorkan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian :

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan tindakbalas kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindakbalas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan rawatan dengan segera:

- hubungi doktor anda atau ahli farmasi anda jika sakit kepala atau gejala berlarutan
- berunding dengan doktor jika anda mempunyai artritis yang memerlukan ubat penahan sakit setiap hari.

METACIN TABLET

Paracetamol (500 mg)

Kesan- kesan sampingan

Kesan sampingan yang disebabkan oleh paracetamol jarang berlaku dan selalunya ringan walaupun tindak balas darah telah dilaporkan. Ruam dan kesan hipersensitiviti kulit yang termasuk bengkak di bawah kulit, kesukaran bernafas, *Steven Johnson Syndrome/ Toxic Epidermal Necrolysis* telah dilaporkan.

Kerosakan hati boleh juga berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Metacin Tablet

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang jauh daripada cahaya.

Jauhkan semua ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih tanpa bau dengan ZONTRON 500 dan skor pada satu sisi.

- Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Paracetamol

- Bahan tidak aktif

Sodium benzoate, corn starch, PVP K-90, pre-gelatinised starch, stearic acid powder dan croscarmellose sodium.

- Nombor MAL:

MAL07061569XCZ

Pemegang Pendaftaran Produk

Zontron Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
(445695-T)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat S.P.S. Penang, Malaysia

Pengilang

Teraputics Sdn. Bhd. (590500-W)

Lot 10 & 11, PERDA Industrial Park,
Lorong IKS Simpang Ampat B, 14100
Simpang Ampat S.P.S. Penang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

09/03/2022

Nombor Siri

NPRA(R4/1)301121/00089