

KRISOVIN TABLET

Griseofulvin (500gm)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Krivosin
2. Bagaimana Krivosin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Krivosin
4. Cara menggunakan Krivosin
5. Semasa menggunakan Krivosin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Krivosin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Krivosin

Krivosin mengandungi griseofulvin iaitu sejenis antikulat. Krivosin digunakan untuk merawat tinea, sejenis jangkitan kulat. Ianya hanya digunakan apabila rawatan antifungi yang lain seperti krim atau serbuk tinea yang tidak berkesan. Krivosin tidak akan berkesan keatas bakteria atau jangkitan viral.

Bagaimana Krivosin berfungsi

Tinea mungkin berlaku pada kulit badan dan kepala, rambut dan kuku. Krivosin berfungsi membantu kulit, rambut dan kuku yang baru tumbuh untuk melawan serangan fungi. Tisu lama yang sudah terjangkit akan luruh semasa tisu baru (keratin) tumbuh. Adalah penting untuk meneruskan rawatan sehingga semua tisu lama yang sudah terjangkit hilang.

Tanya kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai soalan mengapa Krivosin dipreskripsikan kepada anda.

Sebelum menggunakan Krivosin

- Bila tidak boleh menggunakan

Sebelum mula mengambil Krivosin, anda mesti memaklumkan doktor anda jika:

- Pernah mengalami tindakbalas alahan terhadap mana-mana bahan yang tersenarai di hujung risalah ini.
- Sedang hamil atau mungkin hamil
- Sedang menyusukan
- Perancangan untuk mempunyai anak (bapa)

- Mempunyai sebarang masalah kesihatan terutamanya penyakit hati dan lupus (systemic lupus erythematosus).

Krivosin mungkin akan mengurangkan keberkesanan kontraseptif oral. Anda dinasihatkan untuk menggunakan cara kontraseptif alternatif atau tambahan apabila mengambil griseofulvin bersama dengan kontraseptif oral yang mengandungi estrogen dan selama 1 bulan selepas berhenti mengambil griseofulvin.

Ubat ini boleh mengakibatkan kecacatan sewaktu kelahiran. Oleh itu, tidak boleh digunakan semasa hamil. Jika anda bercadang untuk hamil, anda patut tunda sehingga sekurang-kurangnya sebulan selepas menghentikan rawatan.

Krivosin boleh mengakibatkan keabnormalan pada sel sperma. Seorang lelaki tidak patut menghamilkan wanita sehingga sekurang-kurangnya enam bulan selepas menghentikan rawatan.

Jangan gunakan Krivosin jika terdapat kesan bukaan, koyak atau tanda salah guna pada pembungkusan.

Jangan guna selepas tarikh luput yang tertera pada pek bungkusan. Ia mungkin tidak lagi mempunyai kesan, atau lebih buruk lagi ia mungkin akan memberikan kesan yang tidak dijangka, jika anda gunakannya selepas tarikh luput.

- Sebelum menggunakan Krivosin

Maklumkan doktor anda jika anda sedang mengambil ubatan berikut:

- Barbiturates
- Warfarin (sejenis antikoagulan)
- Perancang kehamilan

Kiraan sel darah yang lengkap, kepekatan kreatinin serum, urinalisis dan penentuan fungsi hati disyorkan pada selang masa berkala semasa terapi untuk individu tertentu.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung, atau sedang menyusukan atau merancang untuk menyusukan bayi anda.

Doktor anda akan membincangkan akan risiko dan manfaat yang terlibat. Jika anda masih belum memaklumkan kepada doktor anda, maklumkan ianya sebelum anda mula mengambil Krivosin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubatan ini mungkin akan menjejaskan atau terjejas oleh Krivosin. Anda mungkin perlu mengubah dos anda atau menukar ubat anda.

Kesan antikoagulan boleh dikurangkan apabila digunakan bersama dengan griseofulvin disebabkan metabolisma antikoagulan yang dipercepatkan.

Kesan antikulat Krivosin boleh dikurangkan apabila digunakan serentak dengan primidone atau barbiturate (untuk sawan), terutama phenobarbital, kerana penyerapan terjejas, menyebabkan kepekatan dalam serum menurun. Walaupun kesan kepekatan dalam serum menurun pada kesan terapeutik belum diiktiraf, dinasihatkan untuk elak daripada penggunaan serentak bagi kedua-dua ubat ini.

Doktor atau ahli farmasi anda akan mempunyai lebih informasi mengenai ubatan yang perlu dielakkan atau perlu diberi perhatian semasa mengambil Krivosin.

Cara menggunakan Krivosin

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa – dos kebiasaan ialah 500mg sehari.

Kanak-kanak - dos kebiasaan ialah 10mg/kg berat badan setiap hari, mengambil secara dos yang dibahagikan.

Dos ditetapkan berdasarkan jenis rawatan yang diperlukan untuk individu. Doktor anda akan menentukan jumlah dos yang anda perlukan setiap hari. Jumlah dos ini mungkin akan berlainan dari dos kebiasaan yang dinyatakan dalam risalah ini.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Krivosin akan berfungsi dengan lebih baik jika sedikit lemak dimasukkan ke dalam pemakanan (contohnya susu atau aiskrim).

Maklumkan doktor anda jika anda sedang menjalani diet kurang lemak.

- Berapa lama perlu digunakan

Doktor anda akan menetapkan berapa lama anda harus mengambil Krivosin.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas (selepas makan) sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Jika anda mengalami masalah mengingati untuk mengambil Krivosin, rujuk ahli farmasi anda untuk petua.

- Jia mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos

berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Krivosin

- Perkara yang perlu dilakukan

Krivosin boleh meningkatkan kadar sensitif kulit kepada cahaya matahari. Elakkan dari terdedah kepada cahaya matahari dan sinaran UV tiruan. Apabila keluar dari rumah, gunakan pakaian yang melindungi kulit anda, topi dan kaca mata hitam, dan gunakan krim pelindung matahari yang sekurang-kurangnya ada SPF15.

Jika anda hendak memulakan sebarang ubatan yang baru, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Krivosin.

Jika anda mengalami reaksi kulit yang teruk, termasuk benjolan di bawah kulit, lepuh, kemerahan dan mengelupas dengan atau tanpa demam, kelenjar membengkak dan keputusan ujian darah yang tidak normal, nerjumpa doktor anda dengan segera.

Beritahu doktor anda, untuk sebarang sebab anda tidak mengambil ubat ini seperti yang ditetapkan. Jika tidak, doctor anda akan fikir bahawa ubat ini tidak sesuai dan akan tukar rawatan.

- Perkara yang tidak patut dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangkitan dan simptom anda mungkin belum pulih sepenuhnya.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berkongsi Krivosin dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Krivosin mungkin akan meningkatkan kesan alkohol. Jika

diambil bersama alkohol, ia mungkin akan mengakibatkan tackingardia (degupan jantung menjadi lebih laju), *flushing* (muka menjadi kemerahan) dan diaphoresis (peluh berlebihan). Jika anda mengalami tindakbalas seperti ini, jangan minum minuman yang mengandungi alkohol tanpa merujuk kepada doktor anda terlebih dahulu.

Untuk mengelakkan jangkitan ulangan, sebarang pakaian, tuala, kain cadar, kasut, tudung atau topi dan sebagainya, mestilah dibersihkan sebaiknya atau dibuang. Jika boleh, pakaian dan kain cadar patut dibersihkan dengan sabun dan air panas dan dikeringkan dibawah matahari. Anda juga boleh menggunakan serbuk atau krim tinea untuk membantu mengurangkan jangkitan pada pakaian dan cadar.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Krivosin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan seperti berikut dan membimbangkan anda, maklumkan kepada doktor anda:

- Sakit kepala, kemungkinan adalah teruk, namun akan hilang apabila rawatan diteruskan.
- Keletihan
- Pening kepala
- Loya, muntah-muntah dan dahaga
- Mulut kering
- Sensasi rasa berubah
- Cirit-birit
- Susah untuk tidur
- Ruam kulit dan letusan kulit

Jika anda mengalami kesan sampingan yang berikut, maklumkan kepada doktor anda

segera, kerana anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera;

- Kekeliruan mental
- Ruam kulit dan gatal-gatal
- Rasa sakit atau pedih pada mulut atau lidah
- Rasa kebas, rasa sesemut, sakit atau lemah pada tangan atau kaki
- Sakit tekak dan demam
- Mata atau kulit menjadi kuning
- Bengkak pada tekak

Reaksi kulit yang jarang berlaku yang mungkin serius: ruam meluas dengan lepuh dan pengelupasan kulit, terutamanya di sekitar mulut, hidung dan dalam kawasan kemaluan yang menyebabkan pengelupasan kulit yang teruk, demam, pembesaran limfa nod, atau ujian darah yang tidak normal (paras eosinophil meningkat atau enzim hati peringkat). Jika anda mempunyai tanda-tanda sedemikian, dapatkan nasihat doktor anda dengan segera.

Krivosin juga boleh mengakibatkan kesan sampingan lain yang tidak tersenarai seperti diatas. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Jangan berasa cemas dengan senarai kesan sampingan diatas. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana simptom ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Krivosin

- Penyimpanan

Simpan Krivosin di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Simpan Krivosin dalam peknya sehingga tiba masa untuk mengambilnya. Jika anda

mengeluarkan pil daripada peknya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Jangan simpan Krivosin atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa & Warna Produk

Krivosin Tablet: tablet berukuran 12mm, bulat, cembung, bergaris tengah dan bertanda 'UP500' dan berwarna putih.

- Bahan-bahan Kandungan

- Bahan Aktif

Setiap tablet Krivosin mengandungi 500mg griseofulvin BP.

- Bahan Tidak Aktif

- Sodium Starch Glycolate
- Tween 80
- Corn Starch
- Lactose Monohydrate
- Magnesium Stearate

- Nombor MAL:

MAL19860847AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd.

Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd.

Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/05/2023

Nombor siri:

NPRA (R4/1)161018/00284