

PROCHLOR TABLET 5MG

Prochlorperazine Maleate 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Prochlor
2. Bagaimana Prochlor berfungsi
3. Sebelum mengambil Prochlor
4. Cara menggunakan Prochlor
5. Semasa menggunakan Prochlor
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Prochlor
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Prochlor

Prochlor digunakan dalam pengurusan keadaan psikotik termasuk rawatan skizofrenia dan untuk menghasilkan kesan tenang dalam pesakit psikotik hiperaktif atau teruja .

Prochlor digunakan untuk merawat rasa loya, muntah-muntah dan rasa pening yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuklah migrain (sakit kepala yang teruk) atau emesis (muntah) teraruh ubat dan untuk melegakan gejala jangka pendek atau vertigo seperti yang berlaku dalam penyakit Meniere (sejenis gangguan bahagian telinga dalam yang menjejaskan keseimbangan dan pendengaran) atau labirintitis (bengkak pada bahagian telinga dalam).

Bagaimana Prochlor berfungsi

Prochlor tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai *phenothiazine*. Ia membetulkan ketidakseimbangan bahan kimia di

dalam otak. Bahan-bahan kimia ini mungkin mempengaruhi beberapa bahagian otak yang mengawal tindak balas rasa loya dan muntah-muntah.

Sebelum mengambil Prochlor

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Prochlor jika anda alah kepada:

- Prochlor
- jika anda mengalami depresi sistem saraf pusat
- jika anda menghidap penyakit kardiovaskular (jantung/saluran darah) yang teruk.
- ubat dalam kumpulan *Phenothiazine*
- bahan yang disenaraikan di hujung risalah ini.

Beberapa simptom reaksi alahan termasuklah:

- sesak nafas, berdehit atau sukar bernafas
- bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain
- ruam, gatal-gatal atau bintik-bintik merah pada kulit

Prochlor tidak patut diberikan kepada pesakit yang tidak sedarkan diri atau koma.

Jangan mengambil sebarang ubat yang boleh menyebabkan rasa mengantuk ketika anda mengambil ubat Prochlor.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada pek atau jika pembungkusan koyak atau terdapat tanda salahguna.

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil

ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula mengambil
Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda alah kepada:

- sebarang ubat lain.
- sebarang bahan lain seperti makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil.

Seperti kebanyakan ubat *phenothiazine*, Prochlor tidak disyorkan untuk penggunaan semasa kehamilan. Jika Prochlor perlu diambil semasa kehamilan, doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat mengambil ubat ini.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menyusukan bayi atau bercadang untuk menyusukan bayi.

Adalah tidak digalakkan untuk menyusu bayi semasa mengambil ubat Prochlor, kerana tidak diketahui sama ada Prochlor meresap masuk ke dalam susu ibu.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami atau pernah mengalami sebarang masalah perubatan seperti berikut:

- penyakit Parkinson, sejenis penyakit otak yang menjejaskan pergerakan dan menyebabkan postur tegar, menggeletar, pergerakan menjadi lembab

dan langkah menjadi tidak stabil.

- masalah jantung dan saluran darah, tekanan darah rendah
- penyakit hati
- masalah prostat
- atau sawan
- glaukoma, satu keadaan di mana cecair mengumpul dalam mata

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Prochlor boleh bertindak balas antara satu sama lain. Ini termasuklah:

- sesetengah ubat yang digunakan untuk mengawal kemurungan
- alkohol
- *procarbazine*, ubat anti-kanser
- sesetengah ubat untuk mengawal epilepsi
- ubat untuk merawat penyakit Parkinson
- ubat antikolinergik yang digunakan untuk melegakan kekejangan perut dan mabuk perjalanan
- atropine, sejenis ubat yang digunakan dalam sesetengah ubat mata atau ubat batuk dan selsema
- ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan pengumpulan cecair dalam badan

Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh Prochlor atau mungkin menjejaskan fungsinya. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan. Doktor akan menasihati anda.

Cara menggunakan Prochlor

- Berapa banyak harus digunakan

Dos Dewasa:

Gangguan Psikotik

1 or 2 biji, tiga hingga empat kali sehari

Dos dewasa terhad : 150mg setiap hari untuk rawatan gangguan psikotik.

Anxiety

5mg (asas) , 3 hingga 4 kali sehari , sehingga 20mg setiap hari dan tidak melebihi 12 minggu.

Loya dan muntah-muntah

1 atau 2 biji, tiga hingga empat kali sehari sehingga maksimum 40mg sehari.

- Bila perlu digunakan

Anda boleh mengambil Prochlor sama ada sebelum atau selepas makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Prochlor selagi diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jika tidak, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembalimengambil ubat anda seperti biasa.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Prochlor, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Prochlor

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor secepat mungkin jika anda mendapati mana-mana pergerakan lidah, muka, mulut atau rahang yang tidak terkawal.

Simptom-simptom ini jarang berlaku dan dikenali sebagai *tardive dyskinesia*, yang mungkin dialami oleh pesakit yang mengambil ubat *phenothiazine*, termasuk Prochlor.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Prochlor.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Prochlor.

Beritahu doktor anda dengan segera, jika anda hamil semasa mengambil Prochlor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan mengambil Prochlor untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berhenti mengambil Prochlor, atau mengurangkan dos, walaupun keadaan anda bertambah baik, tanpa berbincang dengan doktor anda. Jika anda tiba-tiba berhenti mengambil Prochlor, keadaan anda akan bertambah teruk atau peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diingini akan meningkat. Untuk mencegah keadaan ini, doktor anda akan mengurangkan secara beransur-ansur jumlah Prochlor yang anda ambil setiap hari sebelum menghentikannya sepenuhnya.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Prochlor mempengaruhi anda. Seperti ubat yang lain, Prochlor mungkin menyebabkan gayang, pening, letih dan rasa mengantuk di kalangan sesetengah orang.

Pastikan anda tahu bagaimana anda bertindak balas terhadap Prochlor sebelum anda memandu kereta, mengendalikan mesin atau melakukan perkara lain yang boleh membahayakan jika anda pening atau gayang. Jika ini berlaku, jangan memandu.

Jika Prochlor menyebabkan anda rasa gayang, pening atau pitam, berhati-hati semasa bangun dari posisi duduk atau baring. Bangun secara perlahan-lahan boleh membantu.

Doktor anda mungkin akan mencadangkan anda untuk mengelakkan alkohol semasa anda dirawat dengan Prochlor.

Prochlor mungkin menyebabkan kulit anda lebih sensitif terhadap cahaya matahari daripada kebiasaan. Pendedahan terhadap cahaya matahari mungkin menyebabkan ruam kulit, gatal-gatal atau kemerah-merahan. Jika kulit anda melecur, beritahu doktor anda.

Prochlor mungkin mempengaruhi cara anda bertindak balas terhadap perubahan cuaca.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, Prochlor boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan pada semua orang.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- sembelit
- mulut kering
- rasa mengantuk
- gelisah
- menggeletar, postur tegar, pergerakan menjadi lembab dan langkah tidak stabil.
- penglihatan kabur

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan and pelupusan Prochlor

- Penyimpanan

Simpan Prochlor di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Simpan pil anda dalam peknya sehingga tiba masa untuk mengambilnya.

Jika anda mengeluarkan pil daripada peknya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Jangan simpan Prochlor atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil Prochlor atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Prochlor Tablet 5mg

- Pil berdiameter 6.5mm, berbentuk bulat cembung, bergores, berwarna merah jambu, bertanda 'UP' pada satu permukaan

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- *Prochlorperazine maleate*

Bahan tidak aktif:

- Tepung jagung
- Laktosa
- *Magnesium stearate*
- *Ponceau 4R*

- Nombor MAL

MAL19871687AZ

Pengilang

DUOPHARMA
MANUFACTURING (BANGI)
SDN BHD
Lot No.2&4, Jalan P/7, Section
13, Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, Malaysia

Pemegang Pendaftaran Produk :

DUOPHARMA
MANUFACTURING (BANGI)
SDN BHD
Lot No.2,4,6,8, & 10, Jalan P/7,
Section 13, Bangi Industrial
Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

04/11/2019

Nombor siri

BPFK(R4/1)041214/00073