

ERYSON TABLET

Erythromycin (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ERYSON TABLET
2. Bagaimana ERYSON TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan ERYSON TABLET
4. Cara menggunakan ERYSON TABLET
5. Semasa menggunakan ERYSON TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ERYSON TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ERYSON TABLET

ERYSON TABLET digunakan untuk merawat dan mencegah jangkitan seperti bronkitis, enteritis, penyakit kelamin, difteri, jangkitan Legionella, pertusis, radang paru-paru, sinusitis, profilaksis jangkitan pembedahan, radang pada lapisan tisu dalam jantung, faringitis, jangkitan streptokokus perinatal, demam reumatik, alternatif kepada tetracyclines dalam Lyme penyakit, jangkitan klamidia & rickettsial dan jerawat yang teruk.

Bagaimana ERYSON TABLET berfungsi

ERYSON TABLET terdiri daripada bahan aktif Erythromycin.

Erythromycin adalah antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil macrolides. Ubat ini berfungsi dengan membunuh atau menghentikan

pertumbuhan bakteria, yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan ERYSON TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ERYSON TABLET jika anda mempunyai masalah kesihatan seperti berikut melainkan dinasihati sebaliknya oleh doktor anda:

- Sekiranya anda hipersensitif, atau mempunyai reaksi alergik kepada Erythromycin, Macrolide lain atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini.
- Jika anda mengalami masalah hati sebelum menerima Erythromycin
- Sekiranya anda mempunyai sejarah degupan jantung tidak teratur selepas menerima Erythromycin
- Jika anda mengalami masalah pendengaran, buah pinggang atau hati.
- Jika anda adalah warga tua

- Sebelum menggunakan ERYSON TABLET

Sebelum mengambil ERYSON TABLET, anda perlu beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami atau pernah mengalami:

- Masalah buah pinggang, penyakit hati
- Degupan jantung tidak teratur

Kehamilan

ERYSON TABLET tidak disyorkan untuk digunakan ketika hamil.

Penyusuan

Erythromycin tidak disyorkan untuk digunakan ketika menyusu kerana Erythromycin dirembeskan kedalam susu badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ERYSON TABLET.

Sebelum menggunakan ERYSON TABLET adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperolehi dengan atau tanpa preskripsi doktor.

Beberapa ubatan tidak disyorkan untuk diambil bersama ERYSON TABLET:

- Warfarin (ubat untuk merawat darah beku)
- Cisapride (digunakan untuk masalah perut)
- Pimozide (digunakan dalam rawatan masalah mental)
- Clarithromycin (antibiotik untuk merawat jangkitan tertentu)
- Ergotamine atau dihydroergotamine (untuk migrain)
- Zopiclone (ubat tidur)
- Theophylline (membantu pernafasan)
- Lovastatin (ubat untuk menurunkan kolesterol darah)
- Interaksi dadah lain termasuk: alfentanil, bromocriptine, carbamazepine, siklosporin, digoxin, disopyramide, hexobarbitone, midazolam, phenytoin, quinidine, tacrolimus, triazolam, valproate.

Cara menggunakan ERYSON TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor, atau

ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

Dewasa

Antibakteria:

250mg setiap 6 jam atau 500mg setiap 12 jam.

Jangkitan kelamin:

500mg setiap 6 jam selama 7 hari atau 250mg setiap 6 jam selama 14 hari.

Prophylaxis endokarditis:

1g 2 jam sebelum prosedur dan 500mg 6 jam selepas dos awal.

Penyakit Legionnaire (radang paru-paru):

500 - 1000mg setiap 12 jam

Prophylaxis jangkitan stercoccal dalam pesakit dengan sejarah demam jantung rematik:

250mg setiap 12 jam

Sifilis tahap pertama:

30 - 40g dalam dos dibahagikan dalam tempoh 10 - 15 hari.

Penyakit radang pelvik yang disebabkan oleh N. gonorrhea (erythromycin stearate sahaja):

250mg setiap 6 jam selama 7 hari, selepas pentadbiran intravena erythromycin 500mg setiap 6 jam selama 3 hari

Urethritis nongonokokal yang disebabkan oleh Ureaplasma urealyticum (erythromycin ethylsuccinate sahaja):

500mg setiap 8 jam selama 7 hari atau 250mg setiap 6 jam selama 14 hari

Batas penetapan biasa bagi dewasa: hingga 4 g Antibakterial setiap hari

- Bila perlu digunakan

Ambil ERYSON TABLET seperti yang disyorkan oleh doktor anda.

- Berapa lama untuk digunakan

Teruskan mengambil ERYSON TABLET seperti yang doktor anda syorkan. Jika simptom penyakit tidak hilang, dapatkan nasihat doktor anda.

Adalah penting untuk melengkapkan antibiotik sepenuhnya; jangan berhenti mengambil tablet awal jika anda berasa lebih baik.

- Jika anda lupa menggunakannya

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya. Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga waktu mengambil ubat itu dan langkau dos yang tidak diambil. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tidak diambil.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa anda menggunakan ERYSON TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ERYSON TABLET.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ERYSON TABLET.

- Beritahu doktor atau ahli farmasi and jika anda ingin mula mengambil ubatan lain ketika anda sedang mengambil ERYSON TABLET

- Perkara yang tidak boleh anda lakukan

- Jangan mengambil ERYSON TABLET melebihi dos yang disyorkan oleh doktor dan ahli farmasi anda.
- Jangan mengambil ubatan baru tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi.
- Jangan beri ERYSON TABLET anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan mengambil ERYSON TABLET untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan memandu kereta atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana ERYSON TABLET memberi kesan kepada anda.

Kesan-Kesan sampingan

Seperti semua ubat, ERYSON TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Beritahu doktor anda jika anda melihat mana-mana kesan sampingan berikut atau perhatikan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Perut kejang dan berasa tidak selesa
- Loya
- Muntah
- Cirit-birit
- Hilang pendengaran
- Sakit mulut atau lidah

- Tompok putih di mulut dan / atau lidah
- Gatal dan rembesan dari vagina
- Super-jangkitan
- Ruam kulit, reaksi alergik
- Sakit dada
- Jaundis (Sakit kuning)
- Fungsi hati yang tidak normal
- Demam
- Keletihan atau kelemahan yang luar biasa
- Degupan jantung yang tidak teratur atau perlahan
- Radang pankreas

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda merasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ERYSON TABLET

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya. Simpan di tempat yang dingin. Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara pelupusan ubatan yang betul. Langkah ini boleh membantu menjaga alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat berdiameter 11.5mm, cembung, bertanda dan bersalut filem.

- Kandungan ubat

- Bahan aktif:

- Erythromycin Stearate

- Bahan tidak aktif:

- Povidone 30
- Corn starch
- Lactose
- Monohydrate
- Opadry Pink
- Purified water
- Chloroform Spirit
- Sodium Starch
- Glycolate
- Magnesium
- Stearate
- Tween 80

- Nombor MAL

MAL19871698AZ

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.
Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Pengilang

Duopharma Manufacturing Bangi Sdn. Bhd.
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

06/09/2024

Serial Number

NPRA(R2/1)200824/504