

BUTALINE SYRUP

Terbutaline sulphate 1.5mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Butaline
2. Bagaimana Butaline berfungsi
3. Sebelum mengambil Butaline
4. Cara menggunakan Butaline
5. Semasa menggunakan Butaline
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Butaline
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Butaline

Butaline melebarkan saluran pernafasan di kalangan pesakit yang mempunyai asma, bronkitis (radang pada salur bronkus) dan masalah pernafasan lain supaya mereka boleh bernafas dengan lebih mudah.

Bagaimana Butaline berfungsi

Sirap Butaline mengandungi terbutaline sulfat. Terbutaline ialah sejenis bronkodilator dan tergolong dalam kumpulan ubat yang dinamakan sebagai beta-antagonis-2. Ia berfungsi dengan mengurangkan bronkospasma (penyempitan saluran udara dalam paru-paru) dan mengurangkan rintangan dalam saluran udara.

Sebelum mengambil Butaline

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap:

- sebarang ubat yang mengandungi terbutaline
- sebarang kandungan yang disenaraikan di hujung risalah ini.

Sesetengah simptom-simptom reaksi alahan termasuk:

- ruam, gatal-gatal atau bintik-bintik merah pada kulit
- sesak nafas, berdehit atau sukar bernafas
- bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian badan lain

• Sebelum mula mengambil
Beritahu doktor anda jika anda alah kepada sebarang ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang masalah perubatan seperti berikut:

- masalah jantung
- hipertensi (tekanan darah tinggi)
- diabetes
- masalah tiroid
- sudut tertutup glaukoma (peningkatan tekanan di dalam mata)
- *Phaeochromocytoma* (ketumbuhan yang jarang ditemui pada tisu kelenjar adrenal)
- sejarah sawan.

Ia mungkin tidak selamat untuk anda mengambil Butaline jika anda mempunyai sebarang masalah perubatan ini.

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau bercadang untuk hamil atau menyusukan bayi.

Doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat mengambil Butaline semasa kehamilan dan ketika menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Butaline boleh bertindak balas satu sama lain. Ini termasuklah:

- anestetik seperti kloroform,
- *cyclopropane*, *halothane* atau *trichloroethylene*
- *Tricyclic antidepressants* dan *monoamine oxidase inhibitors (MAOI)* untuk rawatan kemurungan
- hormon tiroid
- *Enflurane*, *isoflurane*, *methoxyflurane*.
- ubat yang digunakan untuk merawat masalah jantung atau tekanan darah tinggi
- ubat yang digunakan untuk merawat asma, bronkitis atau masalah pernafasan

Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh Butaline atau mungkin menjejaskan fungsinya.

Anda mungkin perlu mengambil ubat dalam kuantiti yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan. Doktor atau ahli farmasi anda akan menasihati anda.

Cara menggunakan Butaline

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa
bronkodilator:
2.5-5 mg 3 kali sehari.

Perencat kelahiran pramatang-

Dos pengekal: 2.5mg setiap 4-6 jam ATAU 5mg 3 kali sehari sehingga tempoh bersalin:
2.5 mg 4-6 jam ATAU 5 mg 3 kali sehari sehingga tempoh masa.

Had preskripsi yang biasa untuk dewasa : 15 mg setiap hari.

Kanak-kanak
Kanak-kanak 12-15 tahun:
2.5 mg 3 kali sehari.

Kanak-kanak sehingga 12 tahun: Dos belum ditubuhkan

- Bila perlu digunakan
Ambil Butaline seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan
Teruskan mengambil Butaline selagi diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan
Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jika tidak, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diinginkan.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda sukar mengingat masa untuk mengambil ubat anda, minta petua daripada ahli farmasi anda.

• Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Butaline, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Butaline

• Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda mendapati dos biasa Butaline tidak memberi kesan yang sama seperti sebelum ini, atau anda perlu mengambil ubat ini dengan lebih kerap, sila hubungi doktor anda agar keadaan anda diperiksa oleh doktor.

Ini sangat penting untuk memastikan masalah pernafasan anda dikawal dengan baik.

Jumpa doktor anda untuk pemeriksaan tetap dan untuk memastikan asma anda tidak bertambah teruk.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Butaline.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Butaline.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda, jika anda hamil ketika mengambil Butaline.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil ubat anda untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Butaline mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, Butaline boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun bukan pada semua orang.

Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut yang membimbangkan anda:

- sakit kepala
- tremor (tangan menggigil)
- gelisah
- denyutan jantung bertambah laju atau jantung berdebar-debar
- loya (rasa tidak sihat), muntah atau cirit-birit
- berpeluh atau otot kejang
- mengantuk atau pening
- gelisah atau tidur terganggu

Kesan sampingan ini biasanya ringan.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Butaline

• Penyimpanan

Simpan Butaline di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 30°C.

Simpan Butaline dalam botolnya sehingga tiba masa untuk mengambilnya.

Jangan simpan Butaline atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

• Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Butaline merupakan sirap tanpa warna dengan perasa buah-buahan

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:
Terbutaline Sulphate

Bahan tidak aktif:

- Sorbitol 70%
Solution
- Sodium
Benzoate
- Perasa nanas

- Perasa strawberi
- Glycerin
- Trisodium
Citrate
- Citric Acid

- Nombor MAL

MAL19880212AZ

Pengilang

DUOPHARMA
MANUFACTURING
(BANGI) SDN. BHD.
Lot No. 2 & 4, Jalan P/7,
Section 13, Bangi Industrial
Estate, 43650 Bandar Baru
Bangi, Selangor Darul Ehsan

Pemegang Pendaftaran Produk

DUOPHARMA
MANUFACTURING
(BANGI) SDN. BHD.
Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan
P/7, Section 13, Bangi
Industrial Estate, 43650 Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul
Ehsan

Tarikh kemaskini RIMUP

28/04/2021

Nombor siri

BPFK(R4/1)111114/0048