

KEZORAL CREAM

Ketoconazole (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Kezoral
2. Bagaimana Kezoral berfungsi
3. Sebelum menggunakan Kezoral
4. Cara menggunakan Kezoral
5. Semasa menggunakan Kezoral
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Kezoral
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Kezoral

Kezoral Cream adalah kegunaan untuk jangkitan kulat dan yis di kawasan kulit bagi golongan dewasa.

Jangkitan boleh terjadi pada

- Badan, dada dan belakang (*Tinea corporis, pityriasis versicolor*)
- Tangan atau kaki (*Tinea pedis*)
- Kulit kepala atau muka (*Seborrhoeic dermatitis*)
- Pangkal peha dan kemaluan (*Tinea curis*)

Bagaimana Kezoral berfungsi

Kezoral Cream bertindak menghapuskan kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sila tanya pada doktor sebab ubat ini diberi kepada anda. Doktor anda mungkin memberi ubat ini untuk tujuan yang berbeza.

Sebelum menggunakan Kezoral

- Bila tidak boleh menggunakannya

Jangan gunakan Kezoral Cream:

- jika anda alah pada propylene glycol dan ketoconazole
- untuk jangkitan mata,

Sekiranya anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Kezoral Cream.

- Sebelum anda mula mengambilnya

Orang yang sensitif terhadap miconazole atau imidazol mungkin sensitif terhadap ketoconazole juga

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mula menggunakan krim, salap, atau losyen yang mengandungi steroid pada jangkitan kulit anda. Anda perlu terus menggunakan steroid sederhana kuat (seperti hydrocortisone) krim, salap atau losen pada waktu pagi dan menggunakan Kezoral Cream pada waktu malam. Steroid sederhana kuat ini boleh diberhentikan secara berperingkat dalam tempoh 2-3 minggu.

Sila bertanya pada doktor atau ahli farmasi anda sebarang soalan mengenai cara pemberhentian steroid secara berperingkat.

- Jika anda mengambil ubat lain

Selalunya Kezoral Cream tidak akan bertindak balas terhadap ubatan lain. Walau pun begitu, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang atau baru sahaja ambil ubatan lain. Ini termasuklah ubatan tanpa preskripsi atau ubatan herba.

Cara penggunaan Kezoral

Ubat ini hendaklah sentiasa digunakan seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor anda sekiranya ada kemusykilan.

- Berapa banyak yang perlu digunakan

Jumlah bergantung kepada jenis dan tahap jangkitan.

Untuk cutaneous candidiasis, tinea corporis, tinea cruris dan pityriasis versicolor:

Sekali sehari untuk sekurang-kurangnya 2 minggu

Untuk tinea pedis

Sekali sehari untuk sekurang-kurangnya 6 minggu

Untuk seborrhoeic dermatitis

Sekali hingga dua kali sehari untuk sekurang-kurangnya 4 minggu atau sehingga kelulusan klinikal

Jangan guna krim ini lebih daripada yang disarankan oleh doktor anda.

- Penggunaan Kezoral Cream

- Setiap tiub Kezoral Cream ditutup. Anda perlu menggunakan penutup krim untuk menusuk penutup.
- Gosok secara perlahan pada kawasan jangkitan dan sekelilingnya dengan jari-jari yang bersih
- Jangan gunakan Kezoral Cream pada mata.

Kezoral Cream tidak berminyak dan tidak akan meninggalkan tanda pada pakaian.

- Bila harus digunakan

Doktor anda akan beritahu anda kekerapan krim digunakan dalam sehari dan selama berapa hari.

Berapa lama harus digunakan

Teruskan penggunaan Kezoral Cream untuk beberapa hari sehingga gejala jangkitan tidak kelihatan lagi.

Sekiranya tiada perubahan selepas 4 minggu, sila berjumpa dengan doktor.

- Sekiranya terlupa menggunakan Kezoral

Jangan gantikan dos sekiranya anda lupa menggunakan ubat ini.

- Jika anda ambil berlebihan (lebih dose)

Hubungi doktor anda sekiranya tertelan krim.

Semasa menggunakan Kezoral

- Perkara yang perlu dilakukan

Penyediaan kulit anda

- Bersihkan dan keringkan kawasan jangkitan kulit

Kebersihan diri

- Basuh tangan dengan sabun dan air, kecuali jika jangkitan adalah di kawasan tangan.
- Untuk mengelakkan kemungkinan berjangkit ke kawasan lain ataupun kepada orang lain, basuh tangan anda selepas menggunakan Kezoral Cream.
- Pakaian yang terkena kawasan jangkitan hendaklah selalu dibasuh dan ditukar.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan benarkan orang lain menggunakan flanel atau tuala anda. Ini boleh menghentikan penyakit berjangkit kepada orang lain.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kanak-kanak dan remaja Kezoral Cream tidak disyorkan untuk kegunaan kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun.

Ibu mengandung dan sedang menyusukan anak

Ketoconazole melepasi plasenta. Kajian dan kawalan pada manusia belum dilakukan. Kajian pada haiwan telah menunjukkan ketoconazole adalah teratogenik. Ketoconazole tidak akan menyerap ke dalam susu ibu.

Dapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi sekiranya anda mengandung ataupun menyusukan anak.

Memandu atau mengendalikan mesin

Kezoral Cream tidak mengganggu pemanduan atau pengendalian sebarang alatan dan mesin.

Kesan kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mengalami sesetengah kesan sampingan.

Sila berhenti menggunakan Kezoral Cream dan beritahu doktor anda dengan secepat mungkin sekiranya anda mendapati atau mengesyaki keadaan berikut. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Iritasi kulit (gatal-gatal dan menyengat) telah dilaporkan. Penggunaan dalam jangka masa berpanjangan boleh menyebabkan iritasi kulit dalam sesetengah kes.

Jika anda mendapat mana-mana kesan sampingan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk apa-apa kesan sampingan yang mungkin berlaku yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web www.npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Kezoral

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan krim di dalam pek asal. Simpan ditempat kering dibawah suhu 30°C.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput pada pek. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan itu.

- Pelupusan

Jangan buang ubatan melalui buangan air atau bahan buangan rumah. Tanya kepada ahli farmasi anda cara yang betul untuk membuang ubatan yang tidak digunakan lagi. Langkah langkah ini boleh membantu melindungi kawasan sekeliling.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Krim homogen putih

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Ketoconazole 2% w/w

- Bahan tidak aktif:

- Methylparaben
- White soft paraffin
- Propylparaben
- Emulifying wax
- Propyl gallate
- Propyleneglycol

- Nombor MAL

MAL19988491AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.

Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.

Lot 2,4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RiMUP

Julai 2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)110419/00089