

CARINOX CAPSULE®

Pseudoephedrine sulphate / Loratadine (120mg/5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Carinox
2. Bagaimana Carinox berfungsi
3. Sebelum menggunakan Carinox
4. Cara menggunakan Carinox
5. Semasa menggunakan Carinox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Carinox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Carinox

Carinox merupakan ubat yang digunakan bagi melegakan simptom-simptom demam alah termasuk bersin, hidung berair, mata berair, gatal dan hidung tersumbat.

Bagaimana Carinox berfungsi

Loratadine tergolong dalam kumpulan ubat antihistamina. Ia berfungsi dengan menghalang tindakan histamina, sejenis bahan yang dihasilkan dalam badan yang menyebabkan gejala alergi.

Pseudoephedrine adalah sejenis dekonjestan yang membantu melegakan hidung dan sinus yang tersumbat. Ia berfungsi dengan mengecutkan saluran darah di kawasan sinus di dalam hidung, mengurangkan bengkak sinus dan memudahkan pernafasan.

Sebelum menggunakan Carinox

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Carinox sekiranya anda:

- alah kepada pseudoephedrine atau sebarang bahan-bahan lain yang disenaraikan di dalam risalah ini.
- mengambil ubat yang serupa
- mengalami kelenjar tiroid yang terlalu aktif
- mengalami tekanan dalam mata meningkat
- mengalami kesukaran membuang air kecil
- mengalami tekanan darah yang amat tinggi atau penyakit jantung yang teruk
- sedang mengambil atau pernah mengambil dalam dua minggu yang lepas ubat untuk merawat

kemurungan/depresi dikenali sebagai perencat Monoamine Oxidase (MAOIs).

- Sebelum menggunakan Carinox

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

Mengandung dan penyusuan bayi

- Beritahu doktor atau farmasi jika anda mengandung atau merancang untuk mengandung atau sedang menyusu bayi.
- Doktor atau ahli farmasi anda boleh berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat yang terlibat.
- Penggunaan Carinox dengan selamat semasa mengandung belum dibuktikan. Oleh itu, produk ini harus digunakan hanya jika potensi manfaat mewajarkan potensi risiko kepada janin. Memandangkan loratadine dan pseudoephedrine sulphate dirembeskan dalam susu ibu, keputusan perlu dibuat sama ada untuk menghentikan penyusuan atau menghentikan penggunaan produk ini.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami:

- halangan leher pundi kencing
- masalah hati yang teruk
- *stenosing peptic ulcer* (parut dan bengkak disebabkan oleh ulser yang menyempitkan duodenum dan menghalang aliran keluar gastrik)
- halangan aliran keluar gastrik
- penyakit saluran darah atau jantung
- kencing manis
- pembesaran prostat

Golongan orang tua berumur 60 tahun atau ke atas mungkin lebih cenderung mengalami kekeliruan, khalan, sawan atau penekanan sistem saraf pusat. Guna produk ini dengan berhati-hati.

Keselamatan dan keberkesanan Carinox pada kanak-kanak yang lebih muda dari 12 tahun belum dibuktikan

• Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengambil sebarang ubat lain termasuk:

- ketoconazole untuk antikulat
- erythromycin sebagai antibiotik
- cimetidine untuk ulser perut
- antasid (untuk melegakan pedih ulu hati atau senak) dan kaolin (untuk cirit-birit)
- ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi seperti methyldopa dan beta blockers
- monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (digunakan untuk merawat kemurungan).
- digitalis (untuk merawat masalah jantung)

Cara menggunakan Carinox

Ikut segala arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Arahan tersebut mungkin berbeza daripada risalah ini.

Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label ubat tersebut, bertanya kepada ahli farmasi, jururawat atau doktor anda untuk menjelaskan arahan tersebut.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan oral sahaja.

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: satu kapsul diambil

- Bila perlu digunakan

Ambil 2 kali sehari atau tanya doktor atau ahli farmasi anda bila anda perlu menggunakan Carinox.

- Berapa lama perlu digunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi berapa lama anda perlu menggunakan Carinox.

Sekiranya simptom berlarutan, jumpa doktor anda

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala-gejala terlebih dos termasuk:

- Penekanan Sistem Pusat Saraf (CNS) (sedasi, pernafasan terganggu semasa tidur), kecerdasan mental berkurang, warna biru atau ungu pada kulit, koma, kehilangan aliran darah ke otak dan organ-organ lain secara mengejut
- Merangsang Sistem Pusat Saraf (masalah tidur), k hayalan, menggeletar atau sawan.
- Kegembiraan yang terlampau, kadar jantung yang cepat, berasa debaran jantung yang kuat, dahaga, peluh, loya, pening, deringan atau dengung dalam telinga, kehilangan kawalan penuh pada pergerakan badan, penglihatan kabur dan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah.
- Merangsang (aktiviti meningkat) terutamanya pada kanak-kanak dan juga tanda-tanda dan gejala yang serupa dengan ubat Atropine (mulut kering, anak mata membesar, memerah, peningkatan suhu badan dan gejala-gejala perut dan usus).

Semasa menggunakan Carinox

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom anda tidak bertambah baik. Ahli farmasi atau doktor anda akan memeriksa keadaan anda dan akan menentukan sama ada anda perlu meneruskan atau tidak pengambilan ubat ini.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Carinox.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Carinox dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disarankan kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*
Elakkan minuman beralkohol.

Antihistamin harus diberhentikan kira-kira 48 jam sebelum prosedur ujian kulit dijalankan kerana antihistamin boleh menjejaskan keputusan ujian.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Ubat ini membantu kebanyakan orang tetapi seperti ubat-ubatan lain, Carinox juga berkemungkinan memberikan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kadangkala, ianya teruk, tetapi kebanyakan daripadanya adalah ringan.

Anda mungkin memerlukan pemerhatian perubatan sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut. Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda ada sebarang pertanyaan.

Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera sekiranya anda mengalami sebarang tanda-tanda tindakbalas alergi/alahan berikut semasa sedang mengambil Carinox: gegata; kesukaran bernafas; bengkak muka, bibir, lidah atau tekak.

-Kesan sampingan yang biasa:

- Kesukaran untuk tidur
- Mulut kering

-Kesan sampingan yang serius:

- Mengantuk
- Ruam
- denyutan jantung yang cepat atau kuat
- Kelemahan yang luar biasa
- Berasa sesak nafas
- Tekanan darah tinggi

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Carinox

- *Penyimpanan*

Simpan ubat ini di tempat yang dingin dan kering di mana suhunya sentiasa di bawah 30°C.

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Carinox adalah kapsul yang berwarna kuning cair (legap) dan berwarna kuning (legap) dan tertera “CARINOX” di kedua-dua belah badan dan penutup kapsul yang mengandungi 6 mm kapsul bersalut, berbentuk bulat dan berwarna kuning dan granul berwarna putih hingga putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap kapsul mengandungi 5mg
Loratadine dan 120mg
Pseudoephedrine sulphate.

- Bahan tidak aktif

- Surelease Clear E-7-19010
- Lactose Monohydrate
- Quinoline Yellow Lake
- Glyceryl Behenate
- Magnesium Stearate
- Talcum
- Croscarmellose Sodium
- Microcrystalline Cellulose 102
- Eudragit RSPO

- Nombor MAL

MAL05032545AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn
Bhd (53667-M)
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13, Bangi
Industrial Estate, 43650 Selangor Darul
Ehsan

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn
Bhd (53667-M)
Lot 2,4,6,8&10, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tarikh kemaskini RiMUP

10/10/2023

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)140519/00125