

COVASC®

Amlodipine Besylate (5 mg, 10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Covasc
2. Bagaimana Covasc berfungsi
3. Sebelum menggunakan Covasc
4. Cara menggunakan Covasc
5. Semasa menggunakan Covasc
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Covasc
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Covasc

Covasc digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi). Covasc juga digunakan untuk merawat angina pectoris. Angina adalah rasa sakit atau rasa tidak selesa di dada, sering menyebar ke tangan atau leher, dan kadang-kadang ke bahu dan belakang. Kesakitan angina disebabkan kekurangan oksigen ke jantung.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai mengapa Covasc telah ditetapkan untuk anda. Doktor anda mungkin telah menentukannya untuk tujuan lain.

Bagaimana Covasc berfungsi

Covasc tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai penyekat saluran kalsium atau antagonis ion kalsium. Ubat ini bertindak dengan melebarkan salur darah anda agar lebih mudah untuk jantung mengempam darah ke seluruh badan serta meningkatkan bekalan darah dan oksigen ke jantung. Penyekat saluran kalsium tidak mempengaruhi jumlah kalsium dalam darah atau tulang anda.

Sebelum menggunakan Covasc

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Covasc jika anda alah terhadap:

- Covasc, atau mana-mana ubat lain mengandungi amlodipine
- Penyekat saluran kalsium lain seperti yang disenaraikan di bawah: felodipine, nifedipine, atau lercanidipine.

- mana-mana bahan yang disenaraikan di akhir risalah ini

Gejala tindak balas alergi mungkin termasuk ruam kulit, sarang, demam, bengkak muka, bibir, mulut, tekak atau lidah yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika pembungkus itu koyak atau menunjukkan tanda-tanda gangguan. Jika ia telah tamat tempoh atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jangan ambil ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda telah mengarahkan anda berbuat demikian.

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain.

Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil. Ubat ini mungkin menjejaskan perkembangan bayi anda jika anda mengambilnya semasa kehamilan. Doktor anda boleh berbincang dengan anda tentang risiko dan manfaat yang terlibat.

Jangan mengambil Covasc jika anda menyusukan. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat. Tidak diketahui sama ada ramuan aktif dalam Covasc akan masuk ke dalam susu ibu atau jika anda bayi mungkin terjejas.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mengambil ubat ini, berbincang dengan doktor anda.

- Sebelum menggunakan

Beritahu doktor anda jika anda alah kepada sebarang ubat lain atau sebarang makanan, pewarna atau pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau mempunyai mana-mana syarat perubatan yang berikut:

- Penyakit jantung seperti kegagalan jantung
- Penyakit hati

Sekiranya anda tidak memberitahu doktor mengenai perkara-perkara ini, beritahu mereka sebelum anda mengambil Covasc.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk semua ubat, vitamin, suplemen herba atau terapi semulajadi yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh mengganggu Covasc. Ini termasuk:

- ubat lain yang digunakan untuk merawat angina, seperti diltiazem
- beberapa antibiotik, seperti erythromycin atau rifampicin
- beberapa antijamur, seperti ketoconazole atau itraconazole
- anti-protease, ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan HIV, seperti ritonavir
- St John's Wort
- limau gedang atau jus limau gedang

Ubat-ubatan ini boleh menjejaskan fungsi Covasc. Anda mungkin memerlukan sukatan ubat yang berbeza atau perlu mengambil ubat-ubatan yang lain.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat yang perlu diberi perhatian atau dielakkan ketika mengambil Covasc.

Cara menggunakan Covasc

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menetapkan berapa banyak Covasc yang perlu anda ambil.

Dos tersebut bergantung kepada keadaan penyakit dan tindak balas anda terhadap ubat ini. Dos permulaan yang anda ambil

akan dikekalkan atau diubah sehingga kesan rawatan yang memuaskan didapati.

Dos biasa dewasa:

5 mg setiap hari atau doktor anda boleh meningkatkan ini kepada 10 mg setiap hari.

Doktor anda mungkin menetapkan dos lain Covasc bergantung kepada keadaan anda dan bagaimana anda bertindak balas terhadap ubat ini.

Dos biasa kanak-kanak:

Tidak ada maklumat yang mencukupi untuk mengesyorkan penggunaan ubat ini pada kanak-kanak.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda pada waktu yang sama setiap hari, sama ada pagi atau petang.

Mengambilnya pada masa yang sama setiap hari akan mempunyai kesan terbaik. Ia juga akan membantu anda mengingati masa untuk mengambilnya. Covasc boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Covasc setiap hari selagi doktor anda mengarahkannya.

Covasc membantu mengawal keadaan anda tetapi tidak menyembuhkannya. Oleh itu, Covasc mesti diambil setiap hari.

Jangan terlepas sebarang dos dan jangan berhenti mengambil ubat walaupun anda berasa lebih baik.

Dos yang terlepas boleh menyebabkan gejala anda lebih teruk.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu anda lakukan jika anda lupa menggunakannya.

Ambil dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya kurang dari 12 jam sebelum dos seterusnya anda, tunggu sehingga mengambil ubat itu dan langkai dos yang tidak dijawab. Jangan mengambil dos berganda untuk membuat dos yang tidak dijawab.

Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diingini.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda mengalami masalah untuk mengingati mengambil ubat anda, tanya ahli farmasi anda untuk beberapa petunjuk.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Jika anda mengambil terlalu banyak tablet, anda mungkin akan berasa pening, ringan atau lemah dan mempunyai denyutan jantung yang tidak teratur.

Semasa menggunakan Covasc

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Covasc seperti yang telah diarahkan oleh doktor.

Beritahu doktor anda jika keadaan anda pulih atau menjadi lebih teruk selepas dos anda Covasc telah dikurangkan atau rawatan telah dihentikan.

Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi lain yang merawat anda bahawa anda mengambil Covasc, terutama jika anda sedang dimulakan pada sebarang ubat baru.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri Covasc kepada orang lain walaupun penyakit mereka sama seperti anda.

Jangan berhenti mengambil Covasc atau menurunkan dos, tanpa memeriksa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum minum alkohol semasa mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Covasc boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Berikut ini adalah kesan sampingan biasa Covasc:

- bengkak kaki, kaki, muka atau tangan
- sakit kepala
- pening
- pembilasan
- berdebar-debar
- keletihan
- mengantuk atau mengantuk
- sakit perut atau loya

Berikut ini adalah kesan sampingan yang serius Covasc. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera:

- perubahan dengupan jantung sama ada pantas atau lambat
- sakit dada
- pening atau keletihan pada berdiri dari posisi duduk atau berbaring
- sesak nafas
- gejala alergi seperti ruam kulit dan / atau gatal-gatal
- gejala penyakit hati seperti gatal-gatal, menguning kulit dan mata, dan kencing berwarna hitam

Sekiranya anda berumur 65 tahun ke atas, anda harus berhati-hati ketika mengambil Covasc. Laporkan sebarang kesan sampingan dengan segera kepada doktor anda.

Sesetengah orang dalam kumpulan umur ini lebih mungkin mengalami kesan sampingan seperti pembengkakan kaki dan pergelangan kaki, kekejangan otot dan pening.

Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web www.npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Covasc

- Penyimpanan

Simpan Covasc di tempat yang dingin dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Simpan pil anda dalam peknyanya sehingga tiba masa untuk mengambilnya. Jika anda mengeluarkan pil daripada peknyanya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Jangan simpan Covasc atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Covasc boleh didapati dalam dua jenis pil:

Covasc Tablet 5 mg:

Pil berwarna putih hingga putih kekuningan, berbentuk perisai dengan perkataan “COV” pada satu permukaan dan bergores pada sebelah permukaan yang lain.

Covasc Tablet 10 mg:

Pil berwarna putih hingga kekuningan, berbentuk perisai dengan perkataan “COV” pada satu permukaan dan perkataan “10” bergores pada sebelah permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Covasc Tablet 5 mg:

- 5 mg *amlodipine besylate*

Covasc Tablet 10 mg:

- 10 mg *amlodipine besylate*

- Bahan tidak aktif

- *Microcrystalline Cellulose*
- *Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous*
- *Sodium Starch Glycolate*
- *Magnesium Stearate*

- Nombor MAL

Covasc Tablet 5 mg:

MAL 06061327AZ

Covasc Tablet 10 mg:

MAL 08080395AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd.

Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd

Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/12/2021

Nombor Siri

NPRA(R2/2)211221/812