

UPHADYL PAED EXPECTORANT

Diphenhydramine hydrochloride/Ammonium chloride (7mg/67.5mg setiap 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Uphadyl Paed Expectorant
2. Bagaimana Uphadyl Paed Expectorant berfungsi
3. Sebelum menggunakan Uphadyl Paed Expectorant
4. Cara menggunakan Uphadyl Paed Expectorant
5. Semasa menggunakan Uphadyl Paed Expectorant
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Uphadyl Paed Expectorant
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Uphadyl Paed Expectorant

Uphadyl Paed Expectorant digunakan untuk batuk dan alergi yang melibatkan penyakit pernafasan seperti selsema dan radang saluran pernafasan.

Bagaimana Uphadyl Paed Expectorant berfungsi

Diphenhydramine hydrochloride adalah antihistamin yang mengurangkan keinginan untuk batuk dan mengeringkan rembesan di hidung dan dada. Ammonium chloride mencairkan kahak supaya mudah batuk keluar.

Sebelum menggunakan Uphadyl Paed Expectorant

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Uphadyl Paed Expectorant jika anak anda alah terhadap Diphenhydramine Hydrochloride atau Ammonium Chloride atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

Jangan menggunakan Uphadyl Paed Expectorant jika anak anda sedang mengambil monoamine oxidase inhibitors (MAOI) (rawatan anti kemurungan).

- Sebelum menggunakan Uphadyl Paed Expectorant

Sebelum mengambil Uphadyl Paed Expectorant anda mesti beritahu doktor atau ahli farmasi jika anak anda ada atau mengalami sebarang masalah kesihatan.

Jika anda tidak pasti anak anda mempunyai atau ada salah satu keadaan berikut, anda perlu mendapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Uphadyl Paed Expectorant.

Sebelum menggunakan Uphadyl Paed Expectorant adalah penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anak anda mengambil apa-apa ubat lain, yang diperoleh dengan atau tanpa preskripsi doktor.

Uphadyl Paed Expectorant boleh meningkatkan kesan alkohol dan ubat-ubatan yang digunakan untuk membantu anak anda berehat, tidur atau melegakan keresahan seperti barbiturat, hipnotik, sedatif dan penenang.

Cara menggunakan Uphadyl Paed Expectorant

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan dengan teliti. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor, atau ahli farmasi untuk mendapatkan bantuan.

Kanak-kanak atas 2 tahun: 5 hingga 10 ml, 3 hingga 4 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

3 hingga 4 kali sehari. Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Uphadyl Paed Expectorant seperti yang doktor anda syorkan. Sekiranya simptom berterusan, sila berjumpa dengan doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anak anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebagai sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anak anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anak anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Uphadyl Paed Expectorant

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anak anda bahawa anak anda sedang mengambil Uphadyl Paed Expectorant.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali jika disyorkan oleh ahli farmasi atau doktor anda.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Uphadyl Paed Expectorant kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anak anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Bila diguna untuk merawat batuk dan selsema:

- Tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur bawah 2 tahun.
- Gunakan dengan berhati-hati bersama nasihat doktor atau ahli farmasi untuk penggunaan kanak-kanak 2 – 6 tahun.

Kesan-Kesan sampingan

Seperti semua ubat, Uphadyl Paed Expectorant boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan sila rujuk kepada doktor.

Beritahu doktor anda jika anda perasan sebarang kesan sampingan berikut atau perasan apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Kesan sampingan biasa: kesan ubat penenang.
- Gangguan perut seperti mual, muntah, cirit-birit atau sembelit dan sakit epigastrik.
- Sakit kepala
- Pandangan kabur
- Bunyi berdering di telinga
- Kegembiraan yang melampau atau kemurungan
- Mudah marah
- Mimpi buruk
- Hilang selera makan
- Kesukaran kencing
- Mulut kering

- Ketegangan di dada dan berdebar-debar
- Tangan berasa berat dan lemah

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda merasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web np.ra.moh.gov.my

[Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Uphadyl Paed Expectorant

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering dibawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi dari kanak-kanak. Guncang sebelum digunakan. Tutup botol dengan ketat.

- Pelupusan

Ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau sisa isi rumah di rumah. Tanya ahli farmasi anda cara pelupusan ubatan yang betul. Langkah ini boleh membantu menjaga alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap berwarna coklat, berperisa dan sekata.

- Bahan Aktif

Bahan aktif:

- Diphenhydramine Hydrochloride
- Ammonium chloride

Bahan tidak aktif:

- Menthol
- Sorbitol 70% solution
- Saccharin sodium
- Asid sitrik
- Cecair karamel
- Gula
- Natrium Benzoate
- Purified water
- Perisa raspberi

- Perisa strawberi
- Trisodium citrate

- Nombor MAL

MAL08061596AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd,
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.
Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RIMUP

07/07/2021

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)120220/00024