

CALSONATE 500MG CAPSULE®

Calcium Carbonate (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Calsonate 500mg Capsule
2. Bagaimana Calsonate 500mg Capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Calsonate 500mg Capsule
4. Cara menggunakan Calsonate 500mg Capsule
5. Semasa menggunakan Calsonate 500mg Capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Calsonate 500mg Capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Calsonate 500mg Capsule

Calsonate 500mg Capsule digunakan untuk mengurangkan kesakitan yang disebabkan ulser perut atau duodenum (pangkal usus kecil). Ia juga digunakan sebagai suplemen kalsium dan rawatan keadaan kekurangan kalsium badan.

Bagaimana Calsonate 500mg Capsule

Ia berfungsi dengan meningkatkan tahap kalsium badan anda.

Kalsium karbonat juga berfungsi sebagai antacid. Ia bertindak balas secara kimia untuk meneutralkan atau menampun kuantiti asid perut yang sedia ada, seterusnya dapat memberikan kelegaan kepada simptom rembesan acid perut berlebihan.

Sebelum menggunakan Calsonate 500mg Capsule

- Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan mengambil Calsonate 500mg Capsule jika anda mempunyai alahan terhadap Calcium Carbonate atau mana-mana bahan lain yang terdapat dalam kandungan ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Calsonate 500mg Capsule jika anda mengandung, sedang merancang

untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Calsonate 500mg Capsule jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan Calsonate 500mg Capsule

Beritahu doktor anda jika anda mengalami

- Gangguan fungsi buah pinggang
- Penyakit jantung
- Penyakit radang yang dipanggil sarcoidosis

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Calsonate 500mg Capsule boleh bertindak balas satu sama lain. Anda mungkin perlu mengambil ubat anda dalam jumlah yang berlainan atau anda mungkin perlu mengambil ubat yang berlainan.

Senarai ubat yang terlibat:

Terutamanya:

- Jika anda mengambil ubat seperti tetracycline atau antibiotik lain, sila pastikan anda memberitahu doktor anda.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat lain yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda mengambil Calsonate 500mg Capsule.

Cara menggunakan Calsonate 500mg Capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1 – 3 kapsul sehari atau seperti diarahkan doktor.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat

anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Calsonate 500mg Capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Calsonate 500mg Capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput pada pek ini atau bungkusannya.

koyak atau terdapat tanda bungkusannya dibuka.

Jangan berkongsi Calsonate 500mg Capsule dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Calsonate 500mg Capsule boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Ini mungkin termasuk:

- sembelit,
- kerengsaan perut

Jika kesan sampingan semakin teruk atau anda mendapat kesan-kesan selain daripada tersenarai, minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web www.npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Calsonate 500mg Capsule

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di tempat kering dibawah suhu 30°C. Sila tutup bekas dengan rapat. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

• Rupa dan warna produk

Saiz 0, merah/hitam kapsul

• Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap kapsul mengandungi 500mg Calcium Carbonate.

- Bahan tidak aktif

- Sodium Lauryl Sulfate
- Talcum
- Sodium Starch Glycolate
- Colloidol Silicon Dioxide
- Dextrose Anhydrous

- Nombor MAL

MAL19912674X

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd.

Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd.

Lot No. 2,4,6,8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

13/08/2019

Nombor Siri:

NPRA (R4/1)291018/00315