

ALUCID TABLET / SUSPENSION

Dried Aluminium hydroxide Gel/Magnesium hydroxide/Simethicone (250mg/250mg/50mg per tablet and 400mg/400mg/30mg per 5mL)

What is in the leaflet

1. What Alucid is used for
2. How Alucid works
3. Before you use Alucid
4. How to use Alucid
5. While you are using it
6. Side effects
7. Storage and Disposal of Alucid
8. Product Description
9. Manufacturer and Product Registration Holder
10. Date of Revision

What Alucid is used for

Alucid is used for relief of gastric pain, hyperacidity, heartburn and flatulence.

How Alucid works

Alucid contains Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide and Polymethylsiloxane activated (simethicone) as active ingredients. This medicine increases the pH value in the stomach, thus providing relief to hyperacidity symptoms.

Alucid also reduces the acid concentration within the cavity of the oesophagus. This increases the pH and decreases the activity of pepsin.

Aluminium hydroxide stimulates the secretion of prostaglandin and this protects the gastric mucosa.

Ask your doctor if you have any questions about why this medicine has been prescribed for you. Your doctor may have prescribed it for another reason.

Before you use Alucid

- When you must not take it

Do not take this medicine if you have an allergy to Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide, Polymethylsiloxane activated (simethicone) or any of the other ingredients listed at the end of this leaflet.

Do not take Alucid if you have severe kidney function impairment.

Do not take this medicine after the expiry date printed on the pack or if the packaging is torn or shows signs of tampering. If it has expired or is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

If you are not sure whether you should start taking this medicine, talk to your doctor.

- Before you start to use it

Tell your doctor if you have allergies to any other medicines, foods, preservatives or dyes.

Tell your doctor if you have kidney problem and symptom of appendicitis (inflamed and painful appendix).

- Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any other medicines, including any that you get without a prescription from your pharmacy, supermarket or health food shop.

Your doctor and pharmacist have more information on medicines to be careful with or avoid while taking this medicine.

How to use Alucid

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully. They may differ from the information contained in this leaflet. If you do not understand the instructions, ask your doctor or pharmacist for help.

- How much to use

Alucid Tablet:

Adult and children above 12 years:
Chew 1 to 2 tablets or as directed by doctor.

Alucid Suspension:

Adult and children above 12 years:

Take 5 to 10ml (1 to 2 teaspoonful) or as directed by doctor.

Children below 12 years:

Take 2.5 to 5ml (1/2 to 1 teaspoonful) or as directed by doctor.

- When to use it

Alucid Tablet:

Take Alucid Tablet before meals.

Alucid Suspension:

Take Alucid Suspension between meals and at bed time or as directed by physician.

Do not take Alucid within 1 to 2 hours of other medication as it may impair the absorption.

- How long to use it

Take your medicine for as long as your doctor tells you.

If the pain continues, tell your doctor.

- If you forget to use it

Take your dose as soon as you remember, and continue to take it as you would normally.

Do not take a double dose to make up for the dose that you missed.

If you have trouble remembering to take your medicine, ask your pharmacist for some hints.

- If you use too much (overdose)

Immediately telephone your doctor for advice, or go to Accident and Emergency at the nearest hospital, if you think that you or anyone else may have taken too much Alucid.

Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. You may need urgent medical attention.

While you are using it

- Things you must do

Always follow your doctor's instructions carefully.

Tell all the doctors, dentists and pharmacists who are treating you that you are taking Alucid.

If you are about to start on any new medicine, remind your doctor and pharmacist that you are taking Alucid.

- Things you must not do

Do not take Alucid to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

Do not give your medicine to anyone else, even if they have the same condition as you.

- Things to be careful of

Be careful in driving or operating machinery until you know how Alucid affects you.

Side effects

All medicines can have side effects. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical attention if you get some of the side effects.

Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

The following side effects may occur if taken at higher dose:

- Constipation
- Diarrhoea
- Intestine blockage

Tell your doctor or pharmacist if you notice anything else that is making you feel unwell.

You may report any side effects or adverse drug reactions directly to the National Centre for Adverse Drug Monitoring by

visiting the website np.ra.moh.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI).

Storage and Disposal of Alucid

- Storage

Keep your medicine in the original container. If you take it out of its original container it may not keep well.

Keep your medicine in a dry place where the temperature stays below 30°C. Protect from light.

Do not store Alucid or any other medicine in the bathroom or near a sink.

Do not leave it on a window sill or in the car.

Heat and dampness can destroy some medicines.

Keep it where children cannot reach it.

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

- Disposal

If your doctor tells you to stop taking this medicine or the expiry date has passed, ask your pharmacist what to do with any medicine that is left over.

Product Description

- What it looks like

Alucid Tablet:
A 16mm in diameter, round, flat, marked 'ALUCID' on both side, yellow tablet.

Alucid Suspension:
A white peppermint flavoured homogenous suspension.

- Ingredients

Active ingredients:

- Dried Aluminium Hydroxide Gel
- Magnesium Hydroxide
- Simethicone

Inactive ingredients:

Alucid Tablet:

- Povidone
- Talcum
- Icing sugar
- Colour Ariavit Quinoline Yellow
- Peppermint Flavour
- Magnesium stearate
- Aspartame

Alucid Suspension:

- Sodium saccharin
- Peppermint Oil
- Xanthan Gum
- Sorbitol 70% Solution
- Microcrystalline Cellulose 101
- Cetylpyridinium Chloride
- Purified water

- MAL number

Alucid Tablet:
MAL19990610X

Alucid Suspension:
MAL19912715X

Manufacturer

DUOPHARMA
MANUFACTURING (BANGI)
SDN. BHD.
Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor
Darul Ehsan.

Product Registration Holder

DUOPHARMA
MANUFACTURING (BANGI)
SDN. BHD.
Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7,
Section 13, Bangi Industrial
Estate, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.

Date of Revision

28/07/2021

Serial number

NPRA(R2/1)190513/138

ALUCID TABLET / SUSPENSION

Dried Aluminium hydroxide Gel/Magnesium hydroxide/Simethicone (250mg/250mg/50mg per tablet and 400mg/400mg/30mg per 5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alucid
2. Bagaimana Alucid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Alucid
4. Cara menggunakan Alucid
5. Semasa menggunakan Alucid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alucid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Alucid

Alucid digunakan untuk melegakan sakit perut, keadaan asid berlebihan, pedih ulu hati dan perut kembung.

Bagaimana Alucid berfungsi

Alucid mengandungi *Aluminium hydroxide*, *Magnesium hydroxide* dan *Polymethylsiloxane activated (simethicone)* sebagai bahan aktif. Ia meningkatkan nilai pH dalam perut, dengan itu melegakan simptom asid berlebihan.

Alucid juga mengurangkan kepekatan asid di dalam esofagus. Ini meningkatkan pH dan mengurangkan aktiviti pepsin.

Aluminium hydroxide merangsang rembesan prostaglandin dan ini melindungi mukosa gastrik.

Hubungi doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang tujuan Alucid Tablet dibekalkan kepada anda. Doktor anda mungkin membekalkan Alucid Tablet untuk tujuan lain.

Sebelum menggunakan Alucid

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda mempunyai alahan terhadap Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide, Polymethylsiloxane activated (simethicone) atau sebarang

bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

Jangan ambil Alucid jika anda mempunyai gangguan fungsi buah pinggang yang serius.

Jangan ambil Alucid selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda salahguna pada pembungkusan.

Jika ia sudah luput atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, sila tanya doktor anda.

- Sebelum menggunakan Alucid

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai masalah buah pinggang dan simptom radang apendik (inflamasi dan sakit di apendik).

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat-ubat yang perlu diberi perhatian semasa mengambil Alucid Tablet atau yang perlu dielakkan.

Cara menggunakan Alucid Tablet

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Alucid Tablet:

Dewasa dan kanak-kanak umur lebih 12 tahun:

Kunyah 1 hingga 2 biji atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

Alucid Suspension:

Dewasa dan kanak-kanak umur lebih 12 tahun:

Ambil 5 hingga 10ml (1 hingga 2 sudu teh) atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

Kanak-kanak umur bawah 12 tahun:

Ambil 2.5ml hingga 5ml (1/2 hingga 1 sudu teh) atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Bila perlu digunakan

Alucid Tablet:

Ambil Alucid Tablet sebelum waktu makan.

Alucid Suspension:

Ambil Alucid Suspension di antara waktu makan dan pada waktu tidur atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

Jangan ambil Alucid dalam 1 hingga 2 jam selepas mengambil ubat lain kerana ia akan mengganggu penyerapan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Alucid selagi diarahkan oleh doktor anda.

Jika kesakitan berlanjutan, beritahu doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa dengan mengambil lebih daripada satu dos pada masa yang sama.

Jika anda mempunyai masalah untuk mengingat masa pengambilan ubat, tanya ahli farmasi anda untuk dapatkan petua.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dengan segera telefon doktor anda atau pergi ke bahagian Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Alucid.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Alucid

- Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mematuhi arahan doktor anda dengan teliti.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Alucid.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Alucid.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Alucid untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Alucid mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mengalami sesetengah kesan sampingan.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang persoalan.

Kesan sampingan yang berikut mungkin berlaku jika ubat ini diambil pada dos yang tinggi:

- Sembelit
- Cirit-birit
- Usus tersumbat

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, or atau laman npra.moh.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Alucid

- Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam peknya. Jika anda mengeluarkan ubat daripada pek, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Simpan ubat anda di tempat kering suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan simpan Alucid atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil Alucid Tablet atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Alucid Tablet:

Pil berdiameter 16mm, berbentuk bulat, rata, bertanda 'ALUCID' pada kedua-dua permukaan, berwarna kuning.

Alucid Suspension:

Larutan berwarna putih dan berasa pudina.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Dried Aluminium Hydroxide Gel
- Magnesium hydroxide
- Simethicone

Bahan tidak aktif:

Alucid Tablet:

- Povidone
- Talcum
- Icing sugar
- Colour Ariavit Quinoline Yellow
- Peppermint Flavour
- Magnesium stearate
- Aspartame

Alucid Suspension:

- Sodium saccharin
- Peppermint Oil
- Xanthan Gum
- Sorbitol 70% Solution
- Microcrystalline Cellulose 101
- Cetylpyridinium Chloride
- Purified Water

- Nombor MAL

Alucid Tablet:

MAL19990610X

Alucid Suspension:

MAL19912715X

Pengilang

DUOPHARMA MANUFACTURING
(BANGI) SDN. BHD.

Lot 2 & 4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor
Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

DUOPHARMA MANUFACTURING
(BANGI) SDN. BHD.

Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7,
Section 13, Bangi Industrial
Estate, 43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RIMUP

28/07/2021

Nombor siri

NPRA(R2/1)190513/138