

POTCIT MIXTURE

Potassium Citrate / Citric Acid (1g/5mL and 200mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Potcit Mixture
2. Bagaimana Potcit Mixture berfungsi
3. Sebelum pengambilan Potcit Mixture
4. Cara pengambilan Potcit Mixture
5. Semasa pengambilan Potcit Mixture
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan Pelupusan Potcit Mixture
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Potcit Mixture

Potcit Mixture adalah dengan tindakan alkalisering yang boleh melegakan ketidakselesaan cystitis disebabkan oleh jangkitan saluran kencing yang rendah.

Bagaimana Potcit Mixture berfungsi

Kalium sitrat teroksida dalam badan untuk membentuk bikarbonat kalium atau natrium bikarbonat. Kesan dasarnya klorida sebelum penyerapan dan bikarbonat selepas penyerapan.

Sebelum menggunakan Potcit Mixture

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Potcit Mixture sekiranya anda:

- alah kepada ubat-ubatan yang mengandungi asid sitrik atau kalium nitrat.

Jangan mengambil ubat selepas dari tarikh luputnya seperti tertulis di pek bungkusannya atau sekiranya bungkusannya sudah koyak atau terdapat tanda sudah dibuka.

Sekiranya sudah tamat tempoh atau rosak, kembalikan pada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Sekiranya anda tidak pasti untuk mengambil ubat ini, berbincanglah dengan ahli farmasi atau doktor anda.

- Sebelum menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda ada alahan terhadap sebarang ubat, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

Beritahulah doktor anda sekiranya anda hamil atau merancang untuk hamil atau menyusukan bayi semasa dalam rawatan.

Doktor atau ahli farmasi anda akan membincangkan risiko dan faedah yang terlibat dengan pengambilan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuk semua ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan lain.

Sesetengah ubat lain dan Potcit Mixture boleh mengganggu antara satu sama lain. Ubat-ubatan tersebut termasuk:

- ubat-ubatan digunakan untuk merawat penyakit jantung
- ubat-ubatan digunakan untuk merawat kerosakan buah pinggang.

Ubat ini boleh mengganggu kesan Potcit Mixture atau mempengaruhi bagaimana ianya bertindak.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai maklumat tentang ubat-ubatan yang perlu diambil perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Potcit Mixture

Ikut arahan yang diberikan oleh ahli farmasi atau doktor anda. Arahan tersebut mungkin berbeza dari maklumat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan yang tertera pada label botol, bertanya dengan ahli farmasi, jururawat atau doktor anda untuk menerangkan kepada anda arahan tersebut.

- Berapa banyak harus digunakan

Bagi dos dewasa: 10 - 15 mL, diambil 4 kali setiap hari serta dicairkan dengan air atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Bagi dos kanak-kanak: 5 - 15 mL diambil 4 kali setiap hari serta dicairkan dengan air atau seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Bila perlu digunakan

Ambil Potcit Mixture pada waktu yang sama setiap hari.

Ambil Potcit Mixture seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil satu dos yang terlupa dengan segera sebaik sahaja teringat. Bagaimanapun, jika sudah menghampiri waktu untuk dos berikutnya, biarkan sahaja dos yang terlupa tadi dan teruskan dengan dos yang berikutnya mengikut jadual pengambilan ubat. Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa dimakan itu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Dapatkan rawatan perubatan kecemasan jika anda berfikir anda telah menggunakan terlalu banyak ubat ini.

Semasa pengambilan Potcit Mixture

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahulah ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan.

Ahli farmasi atau doktor anda akan memeriksa keadaan anda dan akan memberitahu sama ada anda perlu meneruskan atau tidak pengambilan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan kecuali ahli farmasi atau doktor anda memberitahu anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati jika anda memandu, mengendalikan mesin atau berbuat apa-apa yang memerlukan anda dalam keadaan sedar dan berjaga-jaga.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Potcit Mixture. Ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang.

Semua ubat-ubatan mempunyai kesan sampingan. Kadang-kadang ianya serius tetapi kebanyakan masa ianya tidak. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Jangan bimbang dengan senarai berikut kesan sampingan. Anda mungkin tidak mengalami apa-apa daripada mereka.

Tanya doctor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang soalan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- kalium dalam darah tinggi (hyperkalemia)

- diuresis ringan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan Malaysia melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web www.npra.gov.my (*Consumers → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Penyimpanan dan Pelupusan Potcit Mixture

- Penyimpanan

Simpan ubat ini di tempat yang sejuk dan kering di mana suhunya sentiasa dibawah 30°C. Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap jernih kekuningan berperisa lemon.

- Bahan-bahan kandungan:

Bahan aktif:

- i. Citric Acid
- ii. Potassium Citrate

Bahan Tidak aktif:

- i. Sodium Benzoate
- ii. Sugar Refined
- iii. Saccharin Sodium
- iv. Lemon Essence
- v. Purified water

- Nombor MAL :
MAL19912626X

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd. (53667-M)
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd. (53667-M)
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh dikemaskini:

04/11/2025

Nombor siri:

NPRA(R4/1)300119/00022