

UPHAMOL 650 TABLET

Paracetamol (650mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Uphamol
2. Bagaimana Uphamol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Uphamol
4. Cara menggunakan Uphamol
5. Semasa menggunakan Uphamol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Uphamol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Uphamol

Uphamol digunakan untuk melegakan simptom sakit-sakit kepala termasuk migrain dan sakit kepala akibat ketegangan.

Ia juga boleh digunakan untuk melegakan kesakitan akibat selsema dan demam selsema dan mengurangkan demam.

Bagaimana Uphamol berfungsi

Uphamol mengandungi paracetamol sebagai bahan aktif. Paracetamol melegakan kesakitan dan mengurangkan suhu badan tinggi..

Sebelum menggunakan Uphamol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan ubat ini jika anda alah terhadap

- paracetamol
- sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam.

Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Jangan menggunakan Uphamol jika anda mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol.

Jangan menggunakan ubat ini selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda dibuka atau koyakan, atau tanda salahgunaan pada pembungkusan. Jika ia sudah luput atau rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula menggunakan ubat ini, sila tanya doktor anda.

- Sebelum menggunakan Uphamol

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain, makanan pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan.

Jika simptom-simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuklah sebarang ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Uphamol boleh bertindak balas antara satu sama lain.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat lain yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda mengambil Uphamol.

Cara menggunakan Uphamol

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Arahan-arahan ini mungkin berbeza daripada informasi yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak faham arahan pada pek, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk pertolongan.

- Berapa banyak harus digunakan

Orang dewasa dan kanak-kanak umur lebih 12 tahun:

Ambil satu biji setiap 4 hingga 6 jam. Jangan ambil lebih daripada 6 biji dalam satu hari.

- Bila perlu digunakan

Ambil Uphamol seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Uphamol seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Jika simptom berlanjutan, jumpa doktor anda.

Untuk rawatan jangka panjang, jangan ambil lebih daripada 4 biji dalam 24 jam.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa. Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Uphamol, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Uphamol

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang

sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Uphamol.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Uphamol.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Uphamol untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diarah oleh doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak.

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai kesan mengambil ubat ini.

Apabila diambil dalam dos yang disyorkan, kesan sampingan daripada Uphamol jarang berlaku dan biasanya

ringan. Tindak balas hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, bengkak bawah kulit, sindrom Stevens Johnson/Toxic Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang membuatkan anda rasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman website nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Uphamol

- Penyimpanan

Simpan ubat anda dalam pek asalnya sehingga tiba masa untuk mengambilnya.

Jika anda mengeluarkan ubat daripada peknya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Simpan ubat anda di tempat kering bersuhu bawah 30°C.

Jangan simpan Uphamol atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Tarikh kemaskini RIMUP
10/04/2020

Nombor Siri:
NPRA(R4/1)300418/00133

- Pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda berhenti mengambil Uphamol atau ubat ini sudah melepasi tarikh luputnya, sila tanya ahli farmasi anda apa yang patut dilakukan dengan sebarang ubat yang tinggal.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Pil berdiameter 13.5mm, berbentuk bulat, rata berwarna biru muda, simbol 'mahkota dengan UPHAMOL' dan '650'.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

- Paracetamol

- Bahan tidak aktif:-

- Pregelatinized Starch
- Stearic acid
- Povidone (K-30)
- Colour Certolake Indigo Carmine
- Crospovidone

- Nombor MAL
MAL19940735XZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing
(Bangi) Sdn Bhd.
Lot No. 2 & 4, Jalan
P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, Malaysia.

**Pemegang Pendaftaran
Produk**

Duopharma Manufacturing
(Bangi) Sdn. Bhd.
Lot No. 2,4,6,8 & 10,
Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor, Malaysia.