

GLYPRIN TABLET

Aspirin/Glycine (100mg/45mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Glyprin
2. Bagaimana Glyprin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Glyprin
4. Cara menggunakan Glyprin
5. Semasa menggunakan Glyprin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Glyprin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Glyprin

Glyprin selalunya digunakan oleh pesakit yang mengalami ketidakstabilan angina, pesakit yang pernah terkena serangan jantung dan juga pesakit yang mempunyai risiko mendapat strok.

Bagaimana Glyprin berfungsi

Aspirin membantu mengelakkan pembekuan darah.

Kegunaan ubat ini adalah untuk mengurangkan risiko serangan jantung atau strok atau masalah lain yang mungkin berlaku sekiranya saluran darah tersumbat oleh darah beku.

Tanya doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang tujuan Glyprin dibekalkan kepada anda. Doktor anda mungkin membekalkan Glyprin untuk tujuan lain.

Sebelum menggunakan Glyprin

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan guna ubat ini sekiranya anda alah terhadap aspirin
- Beritahu doktor anda sekiranya anda pernah mengalami ulser pada perut atau usus, dimana ianya berisiko senang berdarah.

- Jangan mengambil ubat ini jika anda mengambil ubat lain untuk mencegah penggumpalan darah atau perengsa gastrik.
- Jangan menggunakan ubat ini jika anda hamil atau menyusu bayi.
- Jangan berikan aspirin pada kanak-kanak atau remaja kecuali atas arahan doktor

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang tercetak pada pek ini.

Jika anda mengambil ubat ini selepas tarikh luputnya, ia mungkin tidak berkesan.

Jangan mengambil ubat ini jika pembungkusan koyak atau terdapat tanda bungkusan dibuka.

Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum menggunakan Glyprin

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi mengenai ubat atau alkohol yang anda ambil, terutamanya ejen penipisan darah dan ubat-ubatan untuk mengawal paras gula, penahan sakit atau ubat-ubatan lain yang digunakan untuk kesakitan sendi (fenbufen, indomethacin, piroxicam).

Ubat untuk merawat kanser (methotrexate), ubat-ubatan untuk merawat epilepsi (phenytoin, asid valproic) dan ubat-ubatan yang menggalakkan penguraian asid urik dalam air kencing (probenecid dan sulphinyprazone)

Cara menggunakan Glyprin

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

- Berapa banyak harus digunakan

Ambil satu biji tablet sekali sehari pada waktu yang sama setiap hari.

Tablet boleh dilarutkan di dalam air sebelum diambil atau ditelan keseluruhan.

- Bila perlu digunakan

Ambil satu biji tablet sekali sehari pada waktu yang sama setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Glyprin selagi diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jika tidak, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diingini.

Jika anda tidak pasti apa yang perlu dibuat, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda sukar mengingat masa untuk mengambil pil anda, minta petua daripada ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Glyprin, hubungi

doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera.

Ini mesti dilakukan walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Gejala-gejala terlebih dos mungkin termasuk rasa panas, berpeluh, gelisah, pening, lemah, pernafasan yang laju dan kekeliruan.

Semasa menggunakan Glyprin

- Perkara yang perlu dilakukan

Selalu ikuti arahan doktor anda dengan teliti.

Beritahu doktor anda, sebab anda tidak mengambil ubat anda dengan tepat seperti yang diarahkan.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Glyprin.

Beritahu doktor anda jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Glyprin.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat anda atau mengurangkan dos tanpa berbincang dengan doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Glyprin mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan ini mungkin akan berkurangan bila anda mula serasi dengan ubat ini. Sekiranya, ia berterusan, menjadi lebih teruk dan

mengganggu anda, sila beritahu kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Sakit perut, ketidakhadaman atau pedih ulu hati.
- Mual atau muntah muntah

Walaupun kesan sampingan berikut adalah jarang, jika berlaku, ianya memerlukan perhatian perubatan. Hubungi doktor anda secepat mungkin jika anda mengalami:

- Pendarahan atau lebam yang luar biasa
- Najis berwarna hitam
- Sesak nafas, muntah darah dan kesukaran bernafas, dan boleh mencetuskan serangan asma pada individu yang mudah mendapat serangan.

Berhenti mengambil Glyprin dan hubungi doktor anda dengan segera sekiranya anda perasan:

- Ruam kulit atau gatal gatal
- Susah bernafas
- Mata, muka dan bibir menjadi bengkak

Bukan semua kesan sampingan yang dilaporkan untuk ubat ini disenaraikan dalam risalah ini. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Jangan khuatir dengan senarai kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang masalah.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Glyprin

- Penyimpanan

Simpan ubat anda di tempat kering dibawah suhu 25°C dan

tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Pil berbentuk bulat, berwarna putih, bertanda 'GLY' pada satu permukaan and tiada tanda pada permukaan sebaliknya.

- Bahan-bahan kandungan Bahan aktif:

- Aspirin 100mg
- Glycine 45mg

Bahan tidak aktif:

- Sodium Croscarmellose
- Sodium Stearyl Fumarate
- Sodium Lauryl Sulphate
- Microcrystalline Cellulose

- Nombor MAL MAL20001570XZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd
Lot 2& 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran

Produk

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd
Lot 2,4,6,8&10 Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RIMUP 30/11/2021

Nombor siri:
NPRA(R2/1)211115/787