

CALVINATEV500MG TABLET

Kalsium Karbonat 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan CALVINATE
2. Bagaimana CALVINATE berfungsi
3. Sebelum mengambil CALVINATE
4. Cara mengambil CALVINATE
5. Semasa menggunakan CALVINATE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan CALVINATE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan CALVINATE

CALVINATE digunakan untuk melegakan gejala gangguan pencernaan, pedih ulu hati, kembung perut, loya, sebagai sumber suplemen, terapi osteoporosis, dan sebagai pengikat fosfat untuk merawat pesakit dengan penyakit ginjal kronik, kegagalan buah pinggang dan osteodistrofi ginjal (penyakit tulang ginjal).

Bagaimana CALVINATE berfungsi

Antasid:

Ia mengandungi kalsium karbonat yang membantu meneutralkan jumlah asid perut sedia ada untuk memberikan kelegaan

terhadap gejala hyperasiditi.

Suplemen:

Ia mengandungi kalsium karbonat yang membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan mengurangkan penyerapan fosfat.

Sebelum mengambil CALVINATE

-Bila tidak boleh mengambil

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan CALVINATE jika anda:

- adalah individu yang mengamalkan diet fosfat rendah, atau menerima rawatan glikosida jantung atau dengan fungsi hati atau ginjal yang merosot.
- mempunyai hipersensitiviti kepada mana-mana bahan.
- mempunyai *hypercalcaemia* (peningkatan tahap kalsium dalam darah), *hypercalciuria* (kalsium yang berlebihan dalam air kencing) dan *calcium renal calculi* (batu karang).

-Mengandung dan penyusuan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung, merancang untuk hamil atau sedang hamil atau menyusukan. Data ke atas kesan kehamilan tidak menunjukkan kesan buruk daripada tablet kalsium karbonat 500 mg pada kehamilan atau pada kesihatan janin / bayi yang baru lahir. Kalsium karbonat boleh digunakan semasa menyusu jika diambil seperti yang diarahkan.

Sebelum mula mengambilnya

Gunakan dengan berhati-hati untuk penyakit yang berkaitan dengan *hypercalcaemia* (peningkatan tahap kalsium darah) dan beberapa kesan pada pesakit dengan sejarah batu karang.

Bagi kekurangan buah pinggang, ubat harus diberikan hanya dalam keadaan terkawal untuk hiperfosfatemia (tahap fosfat tinggi dalam darah). Perhatian harus diberikan pada pesakit dengan sejarah batu karang

Bagi rawatan jangka panjang, disarankan untuk memantau serum, tahap kalsium dalam air kencing dan fungsi buah pinggang. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan atau menghentikan rawatan buat sementara sekiranya kalsium dalam air kencing melebihi 7.5mmol / 24 jam (300mg / 24 jam).

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan CALVINATE mungkin berinteraksi antara satu sama lain seperti:

- meningkatkan kesan glikosida digital

Calvinate 500mg Tablet

Kalsium Karbonat (500mg) (bersamaan dengan Kalsium (200mg))

- *tetracycline*
- *phenytoin* (ubat untuk mencegah sawan)
- ubat diuretik *thiazide*

Bagaimana cara mengambil CALVINATE

Berapa banyak yang perlu diambil

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Untuk diambil secara oral, dengan segelas air penuh semasa atau sebelum makan.

Dewasa, kanak-kanak berusia lebih 12 tahun dan warga tua:

Antasid:

500 mg atau 1000mg (1 atau 2 tablet) 3 hingga 4 kali sehari selepas makan.

Hipokalsemia: 1.25g (2½ tablet, iaitu bersamaan 500mg kalsium) dua hingga empat kali sehari selepas makan.

Hiperfosfatemia:

5 -13g (10 -26 tablet, iaitu bersamaan dengan 2 hingga 5.2g kalsium) sehari dalam dos yang dibahagikan dengan makanan.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil
Teruskan pengambilan seperti

yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Gejala seperti anoreksia, mual, muntah, sembelit, sakit perut, kelemahan otot, gangguan mental, polydipsia (dahaga berlebihan), poliuria (kencing kerap), nefrocalcinosis (tahap tinggi kalsium di dalam ginjal), batu karang dan, dalam kes yang teruk, aritmia jantung (degupan jantung yang tidak teratur). Rehidrasi mungkin diperlukan dan loop diuretic

boleh diberikan untuk meningkatkan perkumuhan kalsium dalam air kencing.

Semasa anda menggunakan CALVINATE

Perkara yang perlu anda lakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan CALVINATE
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh anda lakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila dapatkan nasihat perubatan sebelum digunakan

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubat yang lain, CALVINATE juga boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan walaupun tidak semua orang akan mengalaminya

Jika simptom berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- sembelit dan kembung perut.
- meningkatkan tahap kalsium dalam darah
- *milk-alkali syndrome*
- *Acid Rebound*

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Public Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Penyimpanan dan pelupusan CALVINATE
Penyimpanan.

Simpan di tempat kering pada suhu bawah 30°C.
Jauh daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa

isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih ke putih pucat, dengan lambang “d” pada kedua bahagian tablet.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap tablet mengandungi Kalsium Karbonate 500mg

Bahan tidak aktif:

Microcrystalline cellulose, Lactose, Sodium Starch Glycolate, Sodium Lauryl Sulphate and Magnesium Stearate.

Nombor MAL

Pemegang Pendaftaran Produk
Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.

Lot No. 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia

Pengilang
Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn. Bhd.

Lot No. 2 & 4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial

Estate, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP
29/09/2023

Nombor Siri
NPRA (R2) 23/061