

# SALMAX CR<sup>®</sup>

Salbutamol Sulphate (4 mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Salmax CR
2. Bagaimana Salmax CR berfungsi
3. Sebelum menggunakan Salmax CR
4. Cara menggunakan Salmax CR
5. Semasa menggunakan Salmax CR
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Salmax CR
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Salmax CR

Salmax CR membantu anda bernafas dengan lebih mudah. Ia melebarkan saluran pernafasan dalam paru-paru anda apabila dada anda menyempit atau semasa anda berdehit.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengapa Salmax CR dipreskrip untuk anda. Doktor anda mungkin telah mempreskripsinya atas sebab-sebab lain.

## Bagaimana Salmax CR berfungsi

Salmax CR tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai bronkodilator. Ubat ini melegakan simptom dada dan turut dinamakan sebagai ubat 'pelega'.

Terdapat ubat lain yang boleh mencegah pernafasan berbunyi (berdehit) atau dada rasa sempit. Ubat-ubat ini dinamakan sebagai 'pencegah' dan mesti diambil setiap hari. Doktor anda akan memberitahu anda untuk menggunakan ubat 'pencegah' bersama ubat Salmax CR.

## Sebelum menggunakan Salmax CR

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Salmax CR jika anda alah terhadap:

- salbutamol sulphate
- sebarang bahan kandungan yang disenaraikan pada penghujung risalah ini.

Jangan mengambil Salmax CR selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda bungkusan terkoyak atau dibuka. Jika ubat ini sudah luput atau

rosak, kembalikan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

### - Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor anda jika anda alah terhadap sebarang ubat-ubatan, makanan, bahan pewarna atau pengawet.

Beritahu doktor jika anda sedang mengalami atau pernah mengalami keadaan seperti berikut:

- Berhenti mengambil Salmax CR atau ubat asma lain untuk sebarang sebab
  - Tahap tiroid tinggi
  - Penyakit jantung
  - Penyakit hati
  - Penyakit kencing manis
- Sekiranya anda tidak memberitahu doktor tentang perkara-perkara ini, beritahu mereka sebelum mengambil Salmax CR.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang boleh diperolehi tanpa preskripsi di kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh bertindakbalas dengan Salmax CR. Ini termasuk:

- Beta adrenergic blockers (metoprolol)
- Tricyclic antidepressants
- Digitalis glycosides (digoxin)
- Inhibitor monoamine oxidase (untuk kemurungan)
- Diuretik
- Kortikosteroid
- Theophylline (untuk asthma)

Ubat-ubatan ini mungkin dijejaskan oleh Salmax CR atau boleh menjejaskan cara Salmax CR berfungsi. Anda mungkin perlu mengambil ubat yang berbeza atau mungkin memerlukan ubat yang berbeza.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai senarai lengkap ubat untuk berhati-hati dengan atau mengelakkan semasa mengambil Salmax CR.

## Cara menggunakan Salmax CR

### - Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda berapa banyak Salmax CR yang diambil.

Menelan tablet dengan air. Jangan mengunyah atau menghancurkan tablet. Jika anda melihat tablet tidak berfungsi dan juga sebelum ini, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat.

### *Dos dewasa biasa:*

4mg Salmax CR 3-4 kali sehari. Doktor anda boleh meningkatkan ini secara beransur-ansur sehingga maksimum 8mg 3-4 kali sehari. Sesetengah pesakit boleh dirawat dengan jayanya dengan 2mg 3-4 kali sehari.

Warga tua atau pesakit yang diketahui sensitif terhadap produk ini atau ubat lain yang serupa: Pada mulanya 2mg 3-4 kali sehari harus diberikan.

### *Dos Kanak-kanak Biasa:*

- 2-6 tahun: 1-2mg
- 6-12 tahun: 2mg
- Lebih 12 tahun: 2-4mg
- Di bawah 2 tahun: Tidak disyorkan

### - Bila perlu digunakan

Ambil Salmax CR 3-4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

### - Berapa lama perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan berapa kerap dan berapa lama anda perlu mengambil Salmax CR.

Jangan berhenti mengambil Salmax CR, atau tukar dos tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dengan doktor anda.

### - Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan

ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

**- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

**Semasa menggunakan Salmax CR**

**- Perkara yang perlu dilakukan**

Ambil Salmax CR tepat seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika Salmax CR anda tidak membantu pernafasan anda seperti biasa, beritahu doktor anda secepat mungkin. Ini mungkin tanda-tanda bahawa keadaan dada anda semakin buruk.

Jika Salmax CR anda tidak mempunyai kesan yang sama seperti sebelum ini, doktor anda mungkin membuat keputusan untuk menetapkan ubat lain untuk digunakan.

Ubat ini hanya satu bahagian daripada pelan am untuk membantu menguruskan asma anda atau keadaan dada yang lain. Pergi ke doktor anda dengan kerap untuk pemeriksaan.

**- Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berikan Salmax CR kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama dengan anda.

Jangan gunakan Salmax CR untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika anda mengatakan kepada doktor.

**- Perkara yang perlu diberi perhatian**

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil Salmax CR jika anda menyusu, hamil atau cuba hamil. Bayi anda mungkin menyerap ubat ini dalam rahim atau dari susu ibu dan oleh itu terdapat kemungkinan membahayakan bayi.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti ubat-ubatan lain, Salmax CR boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Laporkan segera kepada doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil Salmax CR.

Berikut ini adalah kesan sampingan biasa Salmax CR:

- Sakit kepala
- Loya
- Rasa goyah atau tegang
- Jantung berdegup lebih cepat daripada biasa
- Kegelisahan

Berikut adalah kesan sampingan yang jarang berlaku:

- Ketidakselesaan dada atau kesakitan dada
- Hilang selera makan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda tetapi jangan berhenti mengambil ubat anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda melihat mana-mana yang berikut:

- Ruam
- Rasa pengsan atau pening
- Mengering, bengkak bibir / mulut, kesukaran bernafas atau pengsan. Ini boleh menjadi gejala tindak balas alahan.
- Sentuhan jantung tidak teratur

Anda harus berhenti mengambil Salmax CR dengan segera.

Dalam beberapa orang, ubat dalam Salmax CR mungkin mempengaruhi paras kalium darah mereka. Doktor anda boleh melakukan ujian untuk memeriksa ini.

Ini bukan senarai lengkap semua kesan sampingan yang mungkin. Yang lain mungkin berlaku pada sesetengah orang dan mungkin terdapat beberapa kesan sampingan yang belum diketahui.

Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web [www.npra.gov.my](http://www.npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara Penyimpanan dan Pelupusan Salmax CR**

**- Penyimpanan**

Simpan Salmax CR di tempat yang dingin dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Simpan pil anda dalam peknyanya sehingga tiba masa untuk mengambilnya. Jika anda mengeluarkan pil daripada peknyanya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Jangan simpan Salmax CR atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

**- Pelupusan**

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

**- Rupa dan warna produk**

Tablet berwarna putih, berbentuk heksagon dan bertanda timbul '4' pada salah satu permukaannya.

**- Bahan-bahan kandungan**

- Bahan aktif
  - Salbutamol sulphate 4 mg
- Bahan tidak aktif
  - Xanthan Gum

- Glyceryl Behenate
- Lactose Monohydrate
- Magnesium Stearate

- Nombor MAL

MAL05041855ACSZ

**Pengilang**

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn.  
Bhd. (53667-M)  
Lot 2& 4, Jalan P/7, Seksyen 13, Bangi  
Industrial Estate, 43650 Bandar Baru  
Bangi, Selangor, Malaysia.

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Duopharma Marketing Sdn Bhd (27754-  
W)  
Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13,  
Bangi Industrial Estate,  
43650 Bandar Baru Bangi Selangor,  
Malaysia.

**Tarikh kemaskini RiMUP**

26/08/2019

**Nombor Siri**

NPRA(R2/1)190819/227