

SOBENZ LOZENGE®

Benzylamine hydrochloride, Cetylpyridinium chloride (3mg/1.33mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sobenz Lozenge
2. Bagaimana Sobenz Lozenge berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sobenz Lozenge
4. Cara menggunakan Sobenz Lozenge
5. Semasa menggunakan Sobenz Lozenge
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sobenz Lozenge
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sobenz Lozenge

Benzylamine hydrochloride di Sobenz Lozenge digunakan untuk melegakan keradangan dan sakit di tekak.

Cetylpyridinium chloride mempunyai aktiviti antiseptik dan digunakan dalam rawatan jangkitan mulut dan tekak.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengapa Sobenz Lozenge dipreskrip untuk anda. Doktor anda mungkin telah mempreskripsinya atas sebab-sebab lain.

Bagaimana Sobenz Lozenge berfungsi

Sobenz Lozenge mengandungi bahan aktif utama, Benzylamine hydrochloride untuk bertindak cepat.

Sobenz Lozenges secara langsung menyasarkan tapak keradangan untuk mengurangkan bengkak dan kesakitan. Ia perlahan-lahan mengebas tekak dalam beberapa saat.

Sebelum menggunakan Sobenz Lozenge

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Sobenz Lozenge jika anda alah terhadap:

- Sebarang ubat yang mengandungi Benzylamine hydrochloride or Cetylpyridinium chloride.

- Sebarang bahan kandungan yang disenaraikan pada penghujung risalah ini.

Gejala tindakbalas alahan termasuk:

- Sesak nafas
- Kesukaran bernafas atau nafas berdehit
- Bengkak muka, bibir, lidah atau lain-lain bahagian badan
- Ruam atau gatal-gatal pada kulit.

Jangan mengambil Sobenz Lozenge jika anda menghidap:

- Asma yang teruk, bronchitis atau penyakit pernafasan yang serius.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput pada pek ini atau jika terdapat tanda bungkusan terkoyak atau dibuka.

Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti sama ada harus mengambil ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan mengambil Sobenz Lozenge jika anda hamil, atau merancang untuk hamil. Ia boleh menjejaskan perkembangan bayi anda jika anda mengambil semasa mengandung.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil Sobenz Lozenge jika anda menyusukan. Ia diketahui jika Benzylamine hydrochloride dan Cetylpyridinium chloride akan masuk ke dalam susu ibu.

Ahli farmasi atau doktor anda akan membincangkan potensi manfaat dan risiko mengambil ubat tersebut jika anda hamil atau menyusukan.

- Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor anda jika anda alah terhadap sebarang ubat-ubatan, makanan, bahan pewarna atau pengawet.

Beritahu doktor jika anda sedang mengalami atau pernah mengalami keadaan seperti berikut:

- Asma atau penyakit pernafasan lain

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan sebelum mula mengambil Sobenz Lozenge.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang boleh diperolehi tanpa preskripsi di kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Setengah ubat boleh bertindakbalas dengan Sobenz Lozenge. Ini termasuk:

- Ubat yang diambil untuk membantu anda berehat atau tidur
- Ubat yang diambil untuk mengawal emosi kebimbangan
- Alkohol

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat yang perlu diberi perhatian atau dielakkan ketika mengambil Sobenz Lozenge.

Cara menggunakan Sobenz Lozenge

- Berapa banyak harus digunakan

Ikutilah semua arahan di dalam kotak atau yang diarahkan oleh ahli farmasi atau doktor anda dengan teliti.

Sekiranya anda tidak memahami arahan di dalam kotak, tanyakan ahli farmasi atau doktor anda untuk mendapatkan bantuan.

Dewasa dan kanak-kanak lebih 12 tahun:
2 lozenges

Kanak-kanak 6-12 tahun (Sebelum guna, dapatkan nasihat daripada profesional penjagaan kesihatan):
1 lozenge

Children under 6 years:
Jangan guna

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda setiap 3 jam, atau seperti yang diperlukan.

Maksimum dos dewasa ialah 12 lozenges sehari dan dos maksimum kanak-kanak adalah 8 lozenges sehari.

- Berapa lama perlu digunakan

Rawatan tanpa gangguan tidak boleh melebihi tujuh hari.

- Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlepas dos, makan Sobenz Lozenge sebaik sahaja anda ingat, kemudian teruskan jadual dos biasa anda.

Anda tidak boleh mengambil Sobenz Lozenge dalam dos yang lebih tinggi.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Sobenz Lozenge

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda jika keadaan anda tidak bertambah baik.

Pakar farmasi atau doktor anda akan menilai keadaan anda dan membuat keputusan sama ada anda perlu mengambil ubat tersebut.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil Sobenz Lozenge untuk merawat sebarang aduan lain kecuali ahli farmasi atau doktor memberitahu anda.

Jangan berikan Sobenz Lozenge kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama dengan anda.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang dicadangkan kecuali ahli farmasi atau doktor memberitahu anda.

Jangan gunakan ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda berasa pening dan mengantuk, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Laporkan segera kepada doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil Sobenz Lozenge.

Ubat ini membantu kebanyakan orang, namun ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini dalam beberapa orang. Semua ubat-ubatan boleh mempunyai kesan sampingan. Kadang-kadang mereka serius, kebanyakan masa mereka tidak. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan jika anda mendapat beberapa kesan sampingan.

Berikut adalah kesan sampingan biasa dan ringan yang mungkin berlaku:

- Pening
- Mengantuk
- Loya dan Muntah
- Sakit perut
- Sembelit
- Sakit kepala
- Cirit-birit
- Sensasi membakar atau menyengat

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda secepat mungkin jika anda berasa apa-apa yang berikut. Kesan sampingan yang serius jarang berlaku dan mungkin memerlukan perhatian perubatan:

- Kekurangan koordinasi dan ketidakstabilan semasa berjalan
- Ayunan mood yang luar biasa

Beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat jika terdapat kesan sampingan yang sangat serius:

- Sesak nafas
 - Mengeluh atau kesukaran bernafas
 - Bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian badan yang lain
 - Ruam, gatal-gatal pada kulit
- Kesan sampingan ini sangat jarang berlaku untuk dos yang rendah dalam

ubat ini dan apabila digunakan untuk tempoh masa yang singkat.

Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Sobenz Lozenge

- Penyimpanan

Simpan Sobenz Lozenge di tempat yang dingin dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan simpan Sobenz Lozenge atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sobenz Lozenge (Orange)

Lozenge berwarna oren yang bulat, rata, berukuran 16mm dengan hujung yang serong.

Sobenz Lozenge (Melon)

Lozenge berwarna hijau yang bulat, rata, berukuran 16mm dengan hujung yang serong.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- *Benzydamine hydrochloride 3mg*
- *Cetylpyridinium chloride 1.33mg*

- Bahan tidak aktif

Sobenz Lozenge (Melon)

- *Kollidon 30*
- *Sorbitol*
- *Citric acid/ Anhydrous citric acid*
- *Aspartame*
- *Levomenthol*
- *Colloidal silicon dioxide*
- *Magnesium stearate*
- *Apple green lake*
- *Melon encapsulates PSD 109*

Sobenz Lozenge (Orange)

- *Kollidon 30*
- *Sorbitol*
- *Citric acid/ Anhydrous citric acid*
- *Aspartame*
- *Levomenthol*
- *Colloidal silicon dioxide*
- *Magnesium stearate*
- *D&C Yellow No.6*
- *Orange Flavour*

- Nombor MAL

Sobenz Lozenge (Melon)

MAL11115007AZ

Sobenz Lozenge (Orange)

MAL11115006AZ

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn.
Bhd.

Lot 2& 4, Jalan P/7, Seksyen 13, Bangi
Industrial Estate, 43650 Bandar Baru
Bangi, Selangor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Marketing Sdn Bhd
Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13,
Bangi Industrial Estate,
43650 Bandar Baru Bangi Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/05/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)191213/304
