

CARTRIL-S 250MG CAPSULE

Glucosamine Sulfate (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cartril-S
2. Bagaimana Cartril-S berfungsi
3. Sebelum mengambil Cartril-S
4. Cara penggunaan Cartril-S
5. Semasa menggunakan Cartril-S
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cartril-S
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Cartril-S

Cartril-S digunakan sebagai terapi tambahan yang membantu penyakit osteoarthritis, keadaan di mana tulang rawan yang berfungsi sebagai kusyen hujung tulang dalam sendi merosot dari masa ke masa, akhirnya menyebabkan kesakitan dan menjejaskan pergerakan.

Bagaimana Cartril-S berfungsi

Glucosamine adalah satu komponen semula jadi untuk tulang rawan – yang ditemui dalam sendi di antara tulang. Ia dihasilkan oleh badan, tetapi keupayaan untuk berbuat demikian merosot dengan usia. Penyelidik merasakan bahawa pengambilan suplemen Glucosamine boleh membantu meningkatkan kandungan tulang rawan dalam sendi.

Sebelum menggunakan Cartril-S

- Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh mengambil Cartril-S:

- jika anda alergi terhadap Glucosamine atau mana-mana bahan-bahan lain di dalam Cartril-S
- jika anda alergi terhadap makanan laut, kerana Glucosamine diperolehi dari makanan laut.

- Sebelum menggunakan Cartril-S

Jika hamil atau menyusukan bayi, rujuk kepada doktor anda sebelum penggunaan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Cartril-S

- Berapa banyak harus digunakan

Osteoarthritis ringan atau sederhana:

Ambil dua (2) kapsul dua kali sehari untuk sekurang-kurangnya 6 minggu (atau seperti dalam preskripsi perubatan)

Osteoarthritis yang serius

Terapi awal:

Ambil dua (2) kapsul tiga kali sehari untuk sekurang-kurangnya 8 minggu

Terapi seterusnya:

Terapi pengawalan diikuti untuk 3 hingga 4 bulan (atau seperti dalam preskripsi perubatan) dengan mengambil dua (2) kapsul dua kali sehari

- Bila perlu digunakan

Ambil Cartril-S 15 minit setiap kali sebelum makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Rawatan harus diulangi setiap 6 bulan atau kurang mengikut preskripsi perubatan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos seterusnya seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih Cartril-S dari yang sepatutnya, jumpa doktor atau ahli farmasi anda atau pergi ke hospital.

Semasa menggunakan Cartril-S

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Cartril-S

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Cartril-S dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Jika anda mengalami sakit kepala atau mengantuk ketika mengambil Cartril-S, anda tidak boleh memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Cartril-S boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang paling biasa adalah masalah pencernaan yang ringan. Ini termasuk:

- Sakit perut
- Pedih ulu hati
- Cirit birit
- Loya

Kardiovaskular: bengkak air pada tangan dan kaki, kadar degupan jantung lebih cepat daripada biasa telah dilaporkan dalam beberapa orang.

Sistem saraf pusat: Megantuk, sakit kepala dan kesukaran tidur jarang berlaku. (Kurang dari 1%).

Gastrosus: Loya, muntah, cirit birit, senak perut, sakit perut, sembelit, pedih ulu hati dan anoreksia (gangguan makan) jarang berlaku.

Kulit: kulit kemerah-merahan dan gatal telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Tarikh kemaskini RiMUP
16/07/2020

Nombor siri:
NPRA (R4/1)191118/00337

Cara penyimpanan dan pelupusan Cartril-S

- Penyimpanan

Pastikan bekas tertutup rapat.
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
Simpan di tempat yang kering dan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Lupuskan selepas tarikh luput yang tertera pada produk. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cartril-S 250mg Capsule adalah kapsul mempunyai "CARTRIL S" yang dicetak atas penutup dan badan kapsul. Ia mengandungi serbuk putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
 - Glucosamine S-Sulphate 250mg
- Bahan tidak aktif
 - Crospovidone
 - Silicon dioxide
 - Magnesium stearate
 - Lactose monohydrate

- Nombor MAL

MAL20021425X

Pengilang

Duopharma Manufacturing (Bangi) Sdn Bhd
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan

Pemegang Pendaftaran Produk

Duopharma Marketing Sdn Bhd
Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan