

UPHALEXIN GRANULES 125mg/5ml

Cephalexin (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Uphalexin Granules 125mg/5ml.
2. Bagaimana Uphalexin Granules 125 mg/5ml berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Uphalexin Granules 125 mg/5ml.
4. Cara menggunakan Uphalexin Granules 125 mg/5ml.
5. Semasa menggunakan Uphalexin Granules 125 mg/5ml.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Uphalexin Granules 125 mg/5ml.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini.

Apakah kegunaan Uphalexin Granules 125 mg/5ml

Uphalexin Granules digunakan dalam rawatan jangkitan yang disebabkan oleh pendedahan kepada mikroorganisms berikut

- Jangkitan saluran penafasan
- *Otitis Media* (jangkitan pada telinga)
- Jangkitan tulang
- Jangkitan saluran kencing, termasuk Prostat akut
- Jangkitan gigi

Bagaimana Uphalexin Granules 125mg/5ml berfungsi

Uphalexin Granules 125mg/5ml mengandungi bahan aktif Cephalexin. Cephalexin adalah antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil Cephalosporin. Ubat-ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml

Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi atau hipersensitif kepada cephalosporin. Beberapa simptom reaksi alergi mungkin termasuk ruam kulit, gatal, sukar bernafas, bengkak pada muka, bibir atau lidah.
- Jika ia tidak dipreskripsikan oleh doktor atau ahli farmasi bertauliah kepada anda.

– Sebelum menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml

Sebelum anda mengambil Uphalexin Granules 125mg/5ml anda perlu memaklumkan kepada doktor anda:

- Jika anda alergi pada mana-mana ubat-ubatan, makanan dan pewarna.
- Jika anda mengambil ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).
- Jika anda pernah mengalami reaksi alergi terhadap penicillin. Mungkin terdapat peningkatan risiko anda menjadi alergi kepada Uphalexin Granules 125mg/5ml jika anda alergi terhadap penicillin.
- Jika anda menghadapi masalah kerosakan ginjal.
- Hamil dan menyusukan bayi.
- Jika anda perlu menjalani ujian air kencing atau darah.
- Jika anda mempunyai sejarah cirit-birit yang dikaitkan dengan antibiotik yang digunakan.

Sila dapatkan nasihat doktor sebelum mula menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, menyusukan anak atau bercadang untuk menyusukan anak. Doktor anda akan mempertimbangkan risiko untuk anda mengambil Uphalexin Granules 125mg/5ml berbanding dengan faedah yang mereka harapkan untuk anda.

– Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

– Sesetengah ubat, apabila diambil dengan Uphalexin Granules 125mg/5ml, ia boleh mengganggu antara satu sama lain. Ini termasuk:

- Cephalexin.
- Pil perancang
- *Probenecid*, ubat gout
- *Aminoglycosides*,

untuk jangkitan

- Gentamicin, sejenis antibiotik
- Diuretik, pil air seperti *furosemide*

Doktor atau ahli farmasi anda mungkin mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan yang perlu diberikan perhatian atau dielakkan semasa mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml

– Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Dos dewasa adalah di antara 1 – 4g setiap hari dengan pembahagian dos.

Dos biasa dewasa: Oral, 500mg setiap 8 jam.

Untuk jangkitan berikut, dos 250mg setiap 6 jam atau 500mg setiap 12 jam boleh diberikan: *streptococcal pharyngitis* (jangkitan pada belakang tekak termasuk tonsil), jangkitan kulit dan struktur kulit dan cystitis (jangkitan saluran kencing) tidak rumit.

Untuk jangkitan yang lebih teruk atau yang disebabkan oleh organisma kurang terdedah, dos yang lebih besar mungkin diperlukan

Kanak-kanak: Dos harian yang biasa disyorkan adalah 25-50mg/kg dengan pembahagian dos.

Untuk sakit tekak pada kanak-kanak, jangkitan saluran kencing yang ringan, dan untuk jangkitan kulit dan struktur kulit, jumlah dos harian boleh dibahagikan dan diberikan setiap 12 jam. Dalam terapi otitis media, kajian klinikal telah menunjukkan bahawa dos 75 – 100mg/kg/hari dalam pembahagian 4 dos diperlukan. Dalam rawatan jangkitan B-hemolytic streptococcal (jangkitan bakteria yang menyebabkan kemusnahan menyeluruh pada sel-sel darah merah (hemolysis), dos terapeutik perlu diberikan sekurang-kurangnya 10 hari.

– Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengambil Uphalexin Granules 125mg/5ml.

UPHALEXIN GRANULES 125mg/5ml

Cephalexin (125mg/5ml)

– Berapa lama perlu digunakan

Teruskan menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Jangan berhenti mengambil ubat ini, walaupun anda berasa lebih baik selepas beberapa hari, kecuali dinasihatkan oleh doktor anda. Jangkitan anda mungkin tidak dirawat sepenuhnya jika anda berhenti mengambil ubat ini terlalu awal.

– Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

– Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Anda perlu hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke bahagian kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mengambil ubat ini secara berlebihan. Lakukan ini walaupun jika tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml

– Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Uphalexin Granules 125mg/5ml.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Jika anda mengalami cirit-birit yang teruk, maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

– Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Uphalexin Granules 125mg/5ml dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

– Perkara yang perlu diberi perhatian

- Dos berterusan mungkin mengakibatkan pertumbuhan bakteria atau kulat yang sukar dikawal.
- Ketika hamil atau menyusukan bayi.
- Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu kesan pengambilan Uphalexin Granules 125mg/5ml kepada anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Uphalexin Granules 125mg/5ml boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan biasa berikut telah dilaporkan:

- Gangguan gastrointestinal.
- Reaksi hipersensitiviti termasuk ruam, urtikaria (ruam yang timbul dan gatal pada kulit), eosinophilia (jumlah eosinofil yang luar biasa tinggi), demam, reaksi menunjukkan *serum sickness* (reaksi alergi) dan anafilaksis (reaksi alergi yang teruk).

Uphalexin Capsule boleh menyebabkan alergi dan reaksi kulit yang serius. Hentikan penggunaan Uphalexin Capsule dan dapatkan sokongan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami sebarang gejala berikut

- Kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau mata gatal. Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menyedari sesuatu yang membuat anda berasa tidak sihat. Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas juga boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines(AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Uphalexin Granules 125mg/5ml

– Penyimpanan

Jauhkan Uphalexin Granules 125mg/5ml dari jangkauan kanak-kanak.

Pastikan bekas ubat ditutup rapat. Simpan dalam suhu bilik yang tidak mencapai 30°C sehingga dilarutkan. Selepas dilarutkan, simpan pada suhu 2-8°C dan gunakan dalam tempoh 7 hari.

– Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

– Rupa dan warna produk

Uphalexin Granules 125mg/5ml ialah granul berwarna putih yang menghasilkan larutan berwarna kuning air dengan perisa buah-buahan setelah dicampur dengan air.

– Bahan-bahan

kandungan

– Bahan Aktif:

Cephalexin Monohydrate

UPHALEXIN GRANULES 125mg/5ml

Cephalexin (125mg/5ml)

- *Bahan Tidak Aktif:*

*Refined Sugar, Sodium Dihydrogen
Phosphate Anhydrous, Xanthan Gum,
PVP K30 dan Exotic Blend Flavour.*

Nombor MAL

MAL20076028ACZ

Pengilang

KOTRA PHARMA (M) SDN BHD

No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,

Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka,
Malaysia.

Pemegang pendaftaran produk

DUOPHARMA MARKETING SDN
BHD

Lot 2, 4, 6, 8 & 10, Jalan P/7, Section
13, Bangi Industrial Estate, 43650
Bandar Baru Bangi, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

11/07/2020

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/177