

# MEDIGESIC TABLET 450 MG / 35 MG

Paracetamol 450 mg, Orphenadrine Citrate 35 mg

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MediGESIC
2. Bagaimana MediGESIC berfungsi
3. Sebelum menggunakan MediGESIC
4. Cara menggunakan MediGESIC
5. Semasa menggunakan MediGESIC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MediGESIC
8. Pengilang
9. Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini
11. Nombor siri

## Apakah kegunaan MediGESIC

MediGESIC digunakan untuk melegakan sakit kepala ketegangan dan sakit kepala yang disebabkan oleh kekejangan otot di belakang kepala dan leher.

Ia juga digunakan untuk membantu melegakan otot di badan dan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan yang disebabkan oleh terseliuh, ketegangan atau kecederaan lain seperti kecederaan leher (whiplash injury), leher terkehel, sakit akibat kecederaan *slipped disc* di bahagian tulang belakang.

Doktor anda mungkin akan memberi MediGESIC bagi rawatan lain. Sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang soalan tentang ubat ini.

## Bagaimana MediGESIC berfungsi

*Paracetamol* mempunyai kesan analgesik dan bertindak sebagai antipiretik yang digunakan untuk mengurangkan kesakitan dan demam.

*Orphenadrine Citrate* bertindak sebagai pengendur otot.

## Sebelum menggunakan MediGESIC

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda mungkin alah kepada *Paracetamol*, atau *Orphenadrine*

*Citrate* atau mana-mana bahan-bahan lain dalam ubat ini.

- anda mempunyai glaucoma (tekanan tinggi dalam mata)
- Pembesaran prostat atau penyumbatan pada pundi kencing
- *Myasthenia gravis* (masalah sendi atau otot yang menyebabkan pengenduran kelopak mata, penglihatan berganda, kesukaran untuk bercakap atau menelan dan kadang-kadang boleh menyebabkan kelemahan otot di bahagian lengan dan kaki).

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini, berbincanglah dengan pegawai farmasi atau doktor anda.

### - Sebelum mula menggunakan MediGESIC

Beritahu doktor / pegawai farmasi anda jika:

- Jika mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, bahan pengawet atau bahan pewarna.
- anda mempunyai masalah jantung
- anda mempunyai masalah penyakit hati dan buah pinggang.
- Anda mempunyai masalah dengan ketagihan alkohol.

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan ambil sebarang ubat lain yang mengandungi paracetamol dalam masa yang sama.

Penggunaan MediGESIC tidak digalakkan ketika hamil atau menyusukan badan. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil atau sedang menyusukan atau merancang untuk hamil dan menyusukan.

Jika anda tidak pasti tentang penggunaan ubat ini, sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi.

### - Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain dalam masa jua bentuk

termasuk apa-apa yang anda beli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetangan ubat lain akan menjejaskan kesan MediGESIC, termasuk ubat:

- *Amantadine* (ubat bagi rawatan penyakit Parkinson)
- *Butyrophenones* (ubat bagi rawatan masalah mental)
- *Phenothiazines* (ubat bagi rawatan masalah mental)
- *Tricyclic antidepressants* (ubat bagi rawatan kemurungan)

Interaksi lain yang tidak dinyatakan mungkin berlaku. Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang kebimbangan lain

## Cara menggunakan MediGESIC

Doktor akan memberitahu anda berapa banyak dan bila untuk mengambil MediGESIC. Sentiasa mengambil MediGESIC seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Rujuk dengan doktor atau pegawai farmasi jika anda tidak pasti.

### - Berapa banyak harus digunakan

MediGESIC perlu diambil secara oral. Dos biasa bagi MediGESIC bagi dewasa adalah dua tablet, tiga kali sehari. Doktor anda akan memberikan dos yang tepat untuk anda.

Ambil MediGESIC seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jangan ubah dos melainkan anda telah mendapat nasihat dari doktor atau ahli farmasi.

### - Bila perlu digunakan

Ubat ini perlu diambil bersama segelas air.

### -Berapa lama perlu digunakan

Anda dinasihatkan untuk terus mengambil ubat ini selagi ia diberikan kepada anda oleh doktor anda.

# MEDIGESIC TABLET 450 MG / 35 MG

Paracetamol 450 mg, Orphenadrine Citrate 35 mg

## - Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa, ambil ubat dengan secepat mungkin setelah anda ingat. Tinggalkan dos tersebut jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda bagi memenuhi dos yang terlepas.

## - Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini

## **Semasa menggunakan MediGESIC**

### - Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil MediGESIC.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil ketika sedang menggunakan ubat ini.

Sila berhati-hati ketika sedang memandu atau mengendalikan mesin kerana MediGESIC boleh menyebabkan kabur penglihatan atau pening bagi sesetengah orang. Jika anda mempunyai gejala ini, jangan memandu atau mengendalikan mesin atau melakukan sebarang aktiviti yang berbahaya.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan anda telah diberitahu oleh doktor atau pegawai farmasi.

Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami tanda-tanda yang sama seperti anda.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila berhati-hati ketika sedang memandu atau mengendalikan mesin kerana MediGESIC boleh menyebabkan kabur penglihatan atau pening bagi sesetengah orang. Jika

anda mempunyai gejala ini, jangan memandu atau mengendalikan mesin atau melakukan sebarang aktiviti yang berbahaya.

**Amaran alahan:** Paracetamol boleh menyebabkan masalah kulit yang serius. Gejala termasuk kemerahan kulit, kulit melepuh atau ruam. Gejala ini merupakan tanda yang serius. Jika keadaan ini berlaku, berhenti menggunakan ubat ini dan dapatkan rawatan dalam kadar yang segera.

## **Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat-ubatan lain, MediGESIC boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Kesan sampingan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya ia adalah ringan dan untuk tempoh sementara sahaja.

Kesan sampingan biasanya disebabkan oleh aktiviti *anticholinergic* yang mengakibatkan mual, kering mulut, kabur penglihatan. Kesan seperti ruam atau pening sangat jarang berlaku. Gejala ini akan hilang segera dengan pengurangan dos ubat atau ketika ubat ini berhenti diambil.

Jika anda perasan sebarang kesan sampingan yang tidak dinyatakan, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Beritahu juga sekiranya anda rasa tidak selesa ketika pengambilan ubat ini.

Kesan sampingan lain yang tidak diingini dan tidak disenaraikan mungkin berlaku. Dapatkan nasihat doktor / pegawai farmasi untuk maklumat lanjut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npa.gov.my](http://npa.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## **Cara penyimpanan dan pelupusan MediGESIC**

### - Penyimpanan

Jauhi daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada pegawai farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## **Maklumat lanjut**

### - Rupa dan warna produk

Berbentuk bulat, tablet putih tidak bersalut, pinggir serong, muka rata, "HD" dan break-bar timbul di muka yang sama.

### - Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif  
Setiap tablet mengandungi Paracetamol 450mg dan Orphenadrine Citrate 35mg.

Bahan tidak aktif  
Colloidal Silicon Dioxide  
Partially Pregelatinised Starch  
Microcrystalline Cellulose M200D+  
Crospovidone  
Stearic Acid

### - Nombor MAL

MALxxxxxxxA

## **Pengilang**

HOVID Bhd.  
Lot 56442, 7 ½ Miles, Jalan Ipoh/  
Chemor, 31200 Chemor, Malaysia.

## **Pemegang Pendaftaran Produk**

Allpac Solutions Sdn. Bhd.  
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,  
30010 Ipoh, Malaysia.

# MEDIGESIC TABLET 450 MG / 35 MG

Paracetamol 450 mg, Orphenadrine Citrate 35 mg

---

**Pengedar**

World Medicare Supplies Sdn. Bhd.)  
PT 5740 (1st Floor), Jalan TS 2/1E,  
Taman Semarak 2, 71800 Nilai,  
Negeri Sembilan, Malaysia.

**Tarikh kemaskini**

07/10/2021

**Nombor siri**

NPRA (R2) 21/107