

HYTRIN

Terazosin hydrochloride

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini menjawab pertanyaan am mengenai HYTRIN. Ia tidak meliputi keseluruhan maklumat. Ia juga tidak mengambil alih tugas para doktor dan ahli farmasi.

Semua ubat mempunyai risiko dan feadahnya yang tersendiri. Doktor telah pun meneliti faedah yang dapat diperolehi oleh anda berbanding risikonya.

Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan semasa mengambil ubat ini, sila rujuk pada doktor dan ahli farmasi anda.

Simpan risalah ini bersama ubatnya. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan HYTRIN

HYTRIN hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor.

HYTRIN mungkin diberikan oleh para doktor berdasarkan satu atau dua kondisi yang berbeza.

1. HYTRIN dapat merawat kondisi yang dipanggil *benign prostatic hyperplasia* di mana terdapat kelenjar prostat yang membengkak yang menjurus kepada kesukaran membuang air kencing. Kebiasaannya pengaliran air kencing akan menjadi lemah dan anda mungkin rasa kerap ingin membuang air kencing (pada malam dan siang hari).

2. HYTRIN juga boleh merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) pada wanita dan lelaki.

Tanyalah pada doktor sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan HYTRIN.

Doktor anda mungkin memberi HYTRIN atas pandangan yang berbeza.

Bagaimana HYTRIN berfungsi

HYTRIN boleh meregangkan ketegangan otot pada kelear prostate dan pundi kencing untuk melegakan simptom seperti gangguan pada pengaliran air kencing.

Sebelum mengambil HYTRIN

● ***Bila tidak boleh mengambil*** Jangan ambil HYTRIN sekiranya anda mempunyai alahan pada:

- ubatan yang seakan seperti prazosin (minipress)
- sebarang bahan yang tercatat pada akhir risalah maklumat ini.

Tanya doktor sekiranya anda kurang pasti.

Sesetengah simptom tindak balas alahan merangkumi nafas pendek, berdehit, kesukaran bernafas, bengkak pada muka, bibir, lidah atau bahagian lain pada badan; ruam atau kegatalan pada kulit.

Beritahulah doktor anda sekiranya anda mengandung atau merancang untuk mengandung atau penyusuan badan. Doktor anda dapat memberitahu mengenai risiko dan faedah yang mungkin terjadi.

Kesan dos pertama HYTRIN.

HYTRIN mungkin menyebabkan tekanan darah rendah setelah pengambilan dos pertama. Sesetengah pesakit mungkin merasa pening dan pitam. Untuk mengelak daripada kejadian ini, terdapat pek permulaan yang boleh membantu anda meningkatkan dos secara perlahan-lahan. Kebiasaannya pening kepala adalah kesan sampingan yang tidak berterusan. Oleh itu, bagi 4 hari pertama digalakkan pesakit mengambil 1mg (putih) pil perlu sebelum tidur. Selepas jangkamasa ini, pesakit digalakkan untuk mengambil pil ini pada setiap pagi bagi memanjangkan kesan faedahnya.

Sebarang dengupan jantung yang tidak stabil, pening kepala atau kepala berasa ringan yang dialami boleh

dikurangkan dengan berdiri secara perlahan selepas duduk atau baring dan tunggu sehingga kesan sampingan tersebut hilang sebelum berjalan. Kesan ini akan berkurangan setelah badan anda menjadi biasa dengan pengambilan ubat ini.

Jangan menggunakan HYTRIN selepas tarikh luput yang tercetak pada bungkusan. Sekiranya anda tetap mengambilnya juga, ia mungkin tidak berkesan.

Jangan menggunakan HYTRIN sekiranya bungkusan tersebut didapati koyak atau kemek. Sekiranya anda kurang pasti untuk mengambil HYTRIN, sila hubungi doktor anda.

● ***Sebelum mula mengambil*** Beritahu doktor sekiranya anda alah pada

- sebarang ubat lain
- sebarang bahan lain seperti makanan, pewarna dan bahan pengawet.

Beritahu doktor sekiranya anda pernah mengalami sebarang kondisi yang melibatkan

- masalah jantung
- tekanan darah rendah

Sekiranya anda tidak pernah memberitahu doktor anda mengenai perkara di atas, beritahulah sebelum mengambil HYTRIN

● ***Jika mengambil ubat-ubat lain*** Beritahu doktor anda sekiranya anda mengambil ubatan lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa perskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan sihat.

Doktor dan ahli farmasi mungkin mempunyai lebih maklumat berkenaan ubat yang perlu dititik berat atau dielakkan semasa mengambil HYTRIN.

HYTRIN

Terazosin hydrochloride

Cara menggunakan HYTRIN

- **Berapa banyak harus diambil** Ikut setiap langkah yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi kepada anda secara teliti.

Ia mungkin berbeza dari maklumat yang terkandung dalam sisip bungkusan. Sekiranya anda kurang memahami langkah yang tertera pada kotak/ botol, tanyalah pada doktor atau ahli farmasi anda untuk sebarang bantuan.

Telan pil tersebut bersama segelas air.

- **Bila perlu diambil**

Kebiasaannya pesakit akan mengambil HYTRIN sebelum waktu tidur untuk 4 malam pertama bagi mengurangkan rasa pening. Setelah itu, ubat biasanya diambil sekali sehari pada setiap pagi. Pengambilan ubat secara tetap pada setiap hari adalah efektif di samping membantu anda untuk mengingati waktu pengambilan ubat.

HYTRIN boleh diambil bersama atau tanpa sebarang makanan.

Doktor akan memberikan dos yang sesuai bergantung pada keadaan serta kesan anda terhadap ubat ini. HYTRIN hanya melegakan keadaan anda. Ia tidak menyembuhkan. HYTRIN selalunya diambil secara berterusan bagi mengelakkan sebarang simptom.

- **Berapa lama perlu diambil** Teruskan mengambil ubat ini sehingga diberitahu doktor.

Rawatan dengan HYTRIN selalunya mengambil jangka masa yang panjang. Teruskan mengambil HYTRIN selagi dicadangkan doktor.

- **Jika terlupa mengambil** Sekiranya anda terlupa mengambil dos pada masa yang ditetapkan, ambil dos seterusnya bagi masa yang berikutnya atau ambil apabila anda ingat dan kemudian teruskan seperti biasa.

Jangan tambahkan dos anda untuk melengkapkan dos yang telah tertinggal. Ini mungkin memberi kesan sampingan yang tidak dikehendaki.

Sekiranya anda terlupa lebih dari satu dos atau tidak pasti apa perlu dilakukan, tanyalah pada doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda mempunyai masalah untuk mengingati waktu pengambilan ubat, sila hubungi ahli farmasi anda untuk mendapatkan petunjuk.

- **Jika mengambil berlebihan** (terlebih dos)

Sekiranya mengambil berlebihan dos, atau HYTRIN dimakan oleh kanak-kanak, segera telefon doktor atau Pusat Maklumat Racun (telefon 13 11 26) untuk mendapatkan nasihat, atau pergi ke hospital berdekatan sekiranya anda merasakan bahawa anda atau terdapat orang lain yang mengambil HYTRIN secara berlebihan. Lakukan juga walaupun tiada sebarang keselesaan atau keracunan terjadi. Anda mungkin memerlukan rawatan rapi.

Sekiranya anda mengambil berlebihan HYTRIN, ia mungkin mengakibatkan penurunan tekanan darah yang drastik dan mendorong kepada simptom seperti pening kepala, pitam dan kadar degupan jantung yang laju.

Semasa menggunakan HYTRIN

- **Perkara yang perlu dilakukan** Sekiranya anda mengandung semasa mengambil HYTRIN, beritahulah doktor anda.

Beritahulah semua para doktor, doktor pergigian dan ahli farmasi yang ingin merawat anda dengan HYTRIN.

Sekiranya anda akan melalui pembedahan termasuk pembedahan pergigian, beritahulah

doktor atau doktor pergigian yang anda sedang mengambil HYTRIN. Berjumpalah doktor anda secara kerap agar mereka boleh memeriksa perkembangan anda.

- **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan mengambil HYTRIN untuk merawat sebarang masalah lain melainkan diberitahu oleh doktor.

Jangan berhenti mengambil HYTRIN atau menurunkan dos yang sepatutnya tanpa menyemak dengan doktor anda.

- **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Berhati-hati apabila bangun dari posisi duduk. Pening kepala, pitam dan kepala berasa ringan mungkin terjadi terutamanya apabila berdiri terlalu pantas. Bangun secara perlahan dapat membantu.

Berhati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu apa kesan HYTRIN pada diri anda.

Dengan pengambilan ubatan lain, HYTRIN mungkin menyebabkan pening kepala, kepenatan serta kepala berasa ringan pada sesetengah pesakit. Sekiranya ini berlaku, jangan memandu, mengendalikan mesin atau kerja lain yang boleh membahayakan sekiranya anda penat, pening kepala atau kepala berasa ringan. Adalah dinasihatkan supaya tidak memandu atau melakukan kerja berat selama 12 jam selepas pengambilan dos yang pertama atau meneruskan terapi setelah beberapa lama meninggalkannya.

Sekiranya anda minum alkohol semasa mengambil HYTRIN, pening kepala atau kepala berasa ringan akan bertambah teruk.

Kesan-kesan sampingan

HYTRIN

Terazosin hydrochloride

Beritahulah doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin sekiranya anda rasa kurang sihat semasa mengambil HYTRIN.

Seperti ubat-ubatan lain, HYTRIN mungkin menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini kepada sesetengah pesakit. Kadang-kala kesan ini mungkin serius namun kebanyakan kesan adalah tidak sebegitu serius. Anda mungkin perlu melalui rawatan perubatan sekiranya terdapat sebarang kesan sampingan.

Seperti ubat-ubatan lain, sekiranya umur anda melebihi 65 tahun, anda mungkin mudah untuk mendapat kesan sampingan. Sebarang laporan mengenai kesan sampingan hendaklah segera memberitahu doktor.

Tanyalah pada doktor dan ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Beritahulah pada doktor sekiranya anda perasan terdapat kesan sampingan yang merisaukan anda

- pening kepala
- kepenatan
- degupan jantung yang tak stabil
- loya
- hidung tersumbat
- pandangan kabur
- mati pucuk

Sesetengah kesan sampingan ini mungkin berkurangan mengikut masa. Semua ini boleh disongsangkan dengan terapi yang sesuai.

Kesan sampingan yang lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin terjadi bagi sesetengah pesakit. Beritahulah pada doktor anda sekiranya anda perasan sesuatu yang mungkin menyebabkan anda kurang sihat. Jangan khuatir dengan segala kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalaminya.

Cara penyimpanan dan pelupusan HYTRIN

● Penyimpanan

Simpan pil dalam bungkusan sehingga masa yang diperlukan.

Sekiranya anda mengambil pil keluar dari bungkusan, ia mungkin tidak disimpan dengan baik.

Simpan HYTRIN di tempat yang sejuk dan kering di bawah suhu 25°C,

Jangan simpan HYTRIN atau ubatan lain dalam bilik mandi atau berdekatan dandan sinki.

Jangan biarkan ubat di dalam kereta atau pada tempat panas atau berdekatan dengan tingkap.

Panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat.

Simpan pil di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak.

Almari berkunci yang berketinggian sekurang-kurangnya satu setengah meter dari dasar adalah sesuai untuk menyimpan ubat.

● Pelupusan

Sekiranya doktor anda memberitahu supaya berhenti dari mengambil HYTRIN atau pil telah pun melebihi tarikh luput, tanyalah pada ahli farmasi anda mengenai lebihan pil tersebut.

Maklumat lanjut

● Rupa dan warna produk

HYTRIN terdapat dalam beberapa jenis iaitu;

HYTRIN 1mg: Pil bulat berwarna putih

HYTRIN 2mg: Pil bulat berwarna kuning

HYTRIN 5mg: Pil bulat berwarna tan

HYTRIN Pek Permulaan mengandungi 7 X 1mg pil dan 7 x 2mg pil dalam pek blister pada kotak kad manila.

HYTRIN 2mg pil dan 5mg pil dibekalkan dalam bentuk pek blister yang mengandungi 28 pil pada kotak kad manila.

● Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif yang terkandung dalam HYTRIN adalah terazosin hydrochloride. Setial pil mengandungi lactose, maize starch, pregelatinised maize starch, purified talc and magnesium stearate.

HYTRIN 1mg pil tidak mengandungi sebarang perwarna

HYTRIN 2mg pil mengandungi Dye Quinoline Yellow CI47005-Aluminium Lake

HYTRIN 5mg pil mengandungi Dye Iron Oxide Red CI77491, Iron Oxide Yellow CI77492, Iron Oxide Black CI77499.

- Nombor MAL
HYTRIN 1mg Tablet –
MAL20014488AC
HYTRIN 2mg Tablet –
MAL20014489AC
HYTRIN 5mg Tablet –
MAL20014490AC

Pengilang

Aesica Queenborough Limited
Queenborough, Kent ME11 5EL,
United Kingdom

Tarikh kemaskini RiMUP:

7 Disember 2011

HYTRINTM

terazosin hydrochloride

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about HYTRIN. It does not contain all the available information. It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor has weighed the risks of you taking HYTRIN against the benefits they expect it will have for you.

If you have any concerns about taking this medicine, talk to your doctor or pharmacist.

Keep this leaflet with the medicine. You may need to read it again.

What HYTRIN is used for

HYTRIN is available only with a doctor's prescription.

HYTRIN may be given to you by your doctor for one of two very different conditions.

1. HYTRIN may be given to treat a condition called benign prostatic hyperplasia. In this condition there is enlargement of the prostate gland, which leads to difficulty passing urine. The urine flow is often weak and you may have the feeling that you need to pass urine frequently (during both day and night). HYTRIN helps to relieve the obstruction in the prostate gland and improves the flow of urine.
2. HYTRIN may also be used to treat high blood pressure (hyper-tension) in men and women.

Ask your doctor if you have any questions about why HYTRIN has been prescribed for you.

Your doctor may have prescribed HYTRIN for another reason.

Before you take HYTRIN

When you must not take it

Do not take HYTRIN if you have an allergy to:

- any similar medications such as prazosin (Minipress).
- any of the ingredients listed at the end of this leaflet.

Ask your doctor if you are not sure.

Some of the symptoms of an allergic reaction may include shortness of breath, wheezing or difficulty breathing; swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body; rash, itching or hives on the skin.

Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant or breastfeeding.

Your doctor can discuss with you the risks and benefits involved.

The 'first dose effect' of HYTRIN.

HYTRIN may cause a marked fall in blood pressure after the first dose. This may cause dizziness or fainting in some patients. To help avoid this, there is a starter pack, so that you may build up your dose slowly. Dizziness is not usually a continuing side effect. In order to prevent fainting or dizziness, it is suggested that for the first four days the 1 mg (white) tablets be taken at bedtime. After this period, it is suggested the tablets be taken each morning to maximise their benefits.

Any dizziness, lightheadedness or uneven heartbeats you may experience will be reduced by always standing up slowly from sitting or lying down and waiting for any side-effects to disappear before walking. This effect usually

lessens as your body adjusts to the medication over time.

Do not use HYTRIN after the expiry date (EXP) printed on the pack. If you take this medicine after the expiry date has passed, it may not work as well.

Do not use HYTRIN if the packaging is torn or shows signs of tampering.

If you are not sure whether you should start taking HYTRIN contact your doctor.

Before you start to take HYTRIN:

Tell your doctor if you have allergies to:

- any other medicines
- any other substances, such as foods, dyes or preservatives.

Tell your doctor if you have or have ever had any medical conditions especially the following:

- any heart problems
- low blood pressure

If you have not told your doctor about any of the above, tell them before you start taking HYTRIN.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medicines, including medicines that you buy without a prescription from a pharmacy, supermarket or health food shop.

Your doctor and pharmacist may have more information on medicines to be careful with or to avoid while taking HYTRIN.

How to take HYTRIN

How much to take

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully.

They may differ from the information contained in this leaflet. If you do not understand the instructions on the box/bottle, ask your doctor or pharmacist for help.

How to take it

Swallow the tablets with a glass of water.

When to take it

Patients usually take HYTRIN at bedtime for the first 4 nights to reduce the chances of dizziness. After this the tablets are usually taken once a day, each morning. Taking your medicine at the same time each day will have the best effect. It will also help you to remember when to take it.

HYTRIN may be taken with or without food.

Your doctor will adjust your dose depending on your condition and response to the medicine. HYTRIN relieves your condition. It will not cure it. HYTRIN is usually taken continuously to prevent your symptoms.

How long to take it

Continue taking your medicine for as long as your doctor tells you.

Treatment with HYTRIN is usually long term. Keep taking HYTRIN for as long as your doctor recommends.

If you forget to take it

If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to. Otherwise, take it as soon as you remember, and then go back to taking your medicine as you would normally.

Do not take a double dose to make up for the dose that you missed.

This may increase the chance of you getting an unwanted side effect.

If you miss more than one dose, or are not sure what to do, check with your doctor or pharmacist.

If you have trouble remembering to take your medicine, ask your pharmacist for some hints.

If you take too much (overdose)

If an overdose occurs, or HYTRIN is taken by a child, immediately telephone your doctor or the Poisons Information Centre (telephone 13 11 26) for advice, or go to Accident and Emergency at your nearest hospital, if you think that you or anyone else may have taken too much HYTRIN. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. You may need urgent medical attention.

If you take too much HYTRIN, it may cause a large fall in blood pressure and this may cause symptoms such as dizziness, fainting and fast heart rate.

While you are taking HYTRIN

Things you must do

If you become pregnant while taking HYTRIN, tell your doctor.

Tell all doctors, dentists and pharmacists who are treating you that you are taking HYTRIN.

If you are going to have surgery including dental surgery, tell your doctor or dentist that you are taking HYTRIN. Visit your doctor regularly so that they can check on your progress.

Things you must not do

Do not take HYTRIN to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

Do not stop taking HYTRIN, or lower the dosage without checking with your doctor.

Things to be careful of

Be careful getting up from a sitting position. Dizziness, lightheadedness or fainting may occur, especially when you get up quickly. Getting up slowly may help.

Be careful driving or operating machinery until you know how HYTRIN affects you.

As with other medicines, HYTRIN may cause dizziness, lightheadedness or tiredness in some people. If this occurs, do not drive, operate machinery or do anything else that could be dangerous if you are tired, dizzy or lightheaded. It is advised not to drive or perform hazardous tasks for 12 hours after the first dose or when resuming therapy after a break.

If you drink alcohol while taking HYTRIN, dizziness or lightheadedness may be worse.

Side effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking HYTRIN.

Like all other medicines, HYTRIN may have unwanted side effects in some people. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical treatment if you get some of the side effects.

As with most medicines, if you are over 65 years of age you may have an increased chance of getting side effects. Report any side effects to your doctor promptly.

Ask your doctor or pharmacist any questions you may have.

Tell your doctor if you notice any of the following more common side effects and they worry you:

- dizziness
- tiredness
- uneven heart beat
- nausea
- stuffy nose
- blurred vision
- impotence

Some of these effects may lessen with time. All of these effects are reversible with stopping therapy.

Other side effects not listed above may occur in some patients. Tell your doctor if you notice anything that is making you feel unwell.

Do not be alarmed by this list of possible side effects. You may not experience any of them.

After using HYTRIN

Storage

Keep your tablets in the pack until it is time to take them.

If you take the tablets out of the pack they will not keep well.

Keep HYTRIN in a cool dry place where the temperature stays below 25°C.

Do not store HYTRIN or any other medicine in the bathroom or near a sink.

Do not leave it in the car on hot days or on windowsills.

Heat and dampness can destroy some medicines.

Keep your tablets where children cannot reach them.

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

Disposal

If your doctor tells you to stop taking HYTRIN or the tablets have passed their expiry date, ask your pharmacist what to do with any tablets left over.

Hytrin Tablets CMI

Product description

What it looks like

HYTRIN is available as:

HYTRIN 1mg: White round tablet.
HYTRIN 2mg: Yellow round tablet.
HYTRIN 5mg: Tan round tablet.
HYTRIN 10mg: Blue round tablet.

HYTRIN Starter Pack contains 7 x 1mg tablets and 7 x 2mg tablets in a blister pack in a cardboard carton.

HYTRIN 2mg tablets, 5mg tablets and 10mg tablets are presented in blister packs of 28 tablets inside a cardboard carton.

Ingredients

The active ingredient in HYTRIN tablets is terazosin hydrochloride. Each tablet also contains lactose, maize starch, pregelatinised maize starch, purified talc and magnesium stearate.

HYTRIN 1mg tablets contain no colouring.

HYTRIN 2mg tablets contain Dye Quinoline Yellow CI47005 - Aluminium Lake

HYTRIN 5mg tablets contain Dye Iron Oxide Red CI77491, Iron Oxide Yellow CI77492, Iron Oxide Black CI77499.

HYTRIN 10mg tablets contain Dye Indigo Carmine CI73015 - Aluminium Lake.

A Ubi ZWfi fYf

A^•BaaU^ ^^} à[!| ~ * @Šā ā aĀ
Ū^ ^} à[!| ~ * @Šā ^} á Á ÖFFÁ ÖŠ
W, ā aŠā * a[{

T AŠ numbers:

HYTRIN FmgÁvää|c-
T ÖŠÖÖFI I I I ÖÖ
HYTRIN Gmg Vää|cÁ
T ÖŠÖÖFGG JÖÖ
HYTRIN Í mg Vää|cÁ
MAL20014490AC

Date of this text: 7 December 2011